

Exos maths

2026-2027

Exercice 0.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, trouver les couples $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tels que $k < l$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

Exercice 0.2

Soit $A \subset \mathbb{R}^+$ non majorée. On pose $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que B est dense dans $\mathbb{R}^+$

Exercice 0.3

Soit $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$.
Montrer que $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ et $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathbb{R}$.
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sum_{k=1}^n p_k \cos(\omega_k x)$.
Démontrer que $f^2(x) \leq \frac{1+f(2x)}{2}$.

Exercice 0.5 – Inégalité de Weierstrass

Soit $n > 0$ un entier et, $u_1, \dots, u_n$ et $v_1, \dots, v_n$ deux familles de complexes tels que $|u_k|, |v_k| \leq 1$ pour tout entier $1 \leq k \leq n$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| \prod_{k=1}^n u_k - \prod_{k=1}^n v_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |u_k - v_k|.$$

Exercice 0.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 0.7

Soient 5 points sur la surface d'une sphère. Montrer qu'il existe un hémisphère contenant au moins 4 de ces points.

Exercice 0.8

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^5 + \sum_{k=1}^n k^7 = 2 \left(\sum_{k=1}^n k \right)^4$$

Exercice 0.9

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor \sqrt{n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1} \rfloor = n^2 + n$.
2. Déterminer l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1$ est un carré parfait.

Exercice 0.10

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide.
 - a) Justifier pour $x \in \mathbb{R}$ l'existence du réel $d(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a|$.
 - b) Calculer $d(x, A)$ pour tout $x \in A$.
 - c) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$.
2. On suppose ici que $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1[$. Déterminer $d(x, A)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tracer le graphe de la fonction $x \mapsto d(x, A)$.

Exercice 0.11

Soit $n \geq 2$ un entier et $a \in]0, 1[$. Montrer que $(1 - a)^n \leq \frac{1}{1 + na}$.

Exercice 0.12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \cos^3(k\theta)$.

Exercice 0.13

Soit $z \in \mathbb{U} - \{1\}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $|z^n - 1| \geq \sqrt{3}$.

Exercice 0.14

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$.

Exercice 0.15

Soit $z \in \mathbb{C}$. Notons θ un argument de z dans $] -\pi; \pi]$. Montrer que $|z - 1| \leq ||z| - 1| + |z\theta|$.

Exercice 0.16

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe d'uniques x_n et y_n entiers strictement positifs tels que $(3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + \sqrt{2}y_n$.

2. Exprimer x_{n+1} et y_{n+1} à partir de x_n et y_n . En déduire que les deux suites sont strictement croissantes.
3. Montrer que $(3 - 2\sqrt{2})^n = x_n - \sqrt{2}y_n$.
4. En déduire que l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$ admet une infinité de solutions entières.

Exercice 0.17

1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels telle que :

$$\forall n \geq 0, \sum_{k=0}^n x_k^3 = \left(\sum_{k=0}^n x_k \right)^2$$

Montrer que pour tout $n \geq 0$, il existe un entier naturel m tel que :

$$\sum_{k=0}^n x_k = \frac{m(m+1)}{2}$$

2. On pose $S_{n,p} = \sum_{k=0}^n k^p$. Déterminer les entiers naturels non nuls p tels que, pour tout $n \geq 0$, $S_{n,p}$ soit le carré d'un entier naturel.