

行列  $\hat{F}$  がエルミート演算子（すなわち  $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ ）である場合、任意の状態  $|\lambda\rangle$  に対して、次の等式が成り立つことを示します。

$$\lambda^* = \left( \langle \lambda | \hat{F} | \lambda \rangle \right)^* = \langle \lambda | \hat{F}^\dagger | \lambda \rangle = \langle \lambda | \hat{F} | \lambda \rangle = \lambda$$

ここで、3 番目の式はエルミート共役の定義から導かれ、4 番目の式は  $\hat{F}$  がエルミート演算子であることを利用しています。

## 1. エルミート共役演算子の定義

一般に、演算子  $\hat{A}$  のエルミート共役  $\hat{A}^\dagger$  は、任意の状態  $|\psi\rangle$  と  $|\phi\rangle$  に対して、次の関係を満たす。  
 footnote この定義は、量子力学における内積空間の性質に基づいています。

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle = \left( \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \phi \rangle \right)^*$$

## 2. 定義式の変形

上記の定義式の両辺の複素共役を取る。

$$\left( \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle \right)^* = \left( \left( \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \phi \rangle \right)^* \right)^*$$

複素共役の複素共役は元に戻るので、右辺は次のようになる。

$$\left( \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle \right)^* = \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \phi \rangle$$

## 3. 最初の式への適用

$|\phi\rangle \rightarrow |\lambda\rangle$ ,  $|\psi\rangle \rightarrow |\lambda\rangle$ ,  $\hat{A} \rightarrow \hat{F}$  と置き換える。

$$\left( \langle \lambda | \hat{F} | \lambda \rangle \right)^* = \langle \lambda | \hat{F}^\dagger | \lambda \rangle$$

## 4. エルミート演算子との関係

$\hat{F}$  がエルミート演算子（ $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ ）の場合、3 番目の式は 4 番目の式に進む。

$$\underbrace{\langle \lambda | \hat{F}^\dagger | \lambda \rangle}_{\text{3 番目の式}} \xrightarrow{\text{エルミート演算子の性質}} \underbrace{\langle \lambda | \hat{F} | \lambda \rangle}_{\text{4 番目の式}}$$

## 5. まとめ

$$\left(\langle\lambda|\hat{F}|\lambda\rangle\right)^* = \langle\lambda|\hat{F}^\dagger|\lambda\rangle \quad (\text{常に成立})$$

$$\langle\lambda|\hat{F}^\dagger|\lambda\rangle = \langle\lambda|\hat{F}|\lambda\rangle \quad (\hat{F} \text{ がエルミート演算子の場合に成立})$$