



دانشگاه اصفهان  
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

## جبر خطی کاربردی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

# فهرست مطالب

۳	۱.۰	مقدمه
۳	۲.۰	اهداف جبر خطی عددی
۳	۳.۰	کاربردهای جبر خطی عددی
۵	۱	بردارها و ماتریس‌ها
۵	۱.۱	تعاریف و مفاهیم پایه‌ای
۵	۱.۱.۱	بردارها
۹	۲.۱.۱	نرم بردار
۱۳	۳.۱.۱	ماتریس‌ها
۱۴	۴.۱.۱	ماتریس‌های خاص
۱۶	۵.۱.۱	نرم ماتریس
۱۷	۶.۱.۱	انواع نرم‌های ماتریس
۱۹	۲.۱	دترمینان
۲۰	۱.۲.۱	ماتریس نامنفرد
۲۱	۳.۱	خواص دترمینان
۲۲	۴.۱	کدهای پایتون
۲۴	۵.۱	تمرین‌ها

# مقدمه

## ۱.۰ مقدمه

جبر خطی عددی شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی و محاسباتی است که به مطالعه و توسعه الگوریتم‌های عددی برای حل مسائل جبر خطی می‌پردازد. این درس در بسیاری از حوزه‌های علمی و مهندسی نقش کلیدی دارد.

## ۲.۰ اهداف جبر خطی عددی

- توسعه الگوریتم‌های کارا برای حل دستگاه‌های معادلات خطی.
- تقریب و محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه ماتریس‌ها.
- بررسی پایداری و دقت روش‌های عددی در جبر خطی.
- ارائه روش‌هایی برای تجزیه و تحلیل ماتریس‌ها مانند تجزیه LU، تجزیه QR و تجزیه SVD.
- کاربرد روش‌های عددی در حل مسائل مهندسی و علمی.

## ۳.۰ کاربردهای جبر خطی عددی

- مهندسی: تحلیل سازه‌ها، پردازش سیگنال و شبیه‌سازی‌های مهندسی.
- علوم داده و یادگیری ماشین: کاهش ابعاد داده، الگوریتم‌های بهینه‌سازی و تحلیل داده‌های بزرگ.
- گرافیک کامپیوتری: پردازش تصاویر، رندرینگ سه‌بعدی و فشرده‌سازی داده‌ها.
- اقتصاد و مالی: مدل‌سازی مالی، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و تحلیل داده‌های اقتصادی.
- فیزیک و شیمی محاسباتی: شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و تحلیل سیستم‌های پیچیده.



# فصل ۱

## بردارها و ماتریس‌ها

### ۱.۱ تعاریف و مفاهیم پایه‌ای

#### ۱.۱.۱ بردارها

##### تعریف ۱.۱.۱: بردار

یک بردار در فضای  $\mathbb{R}^n$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

##### مثال ۱.۱.۱:

مثال: بردار  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$  در  $\mathbb{R}^3$ .

##### تعریف ۲.۱.۱: جمع بردارها

اگر  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  باشند، جمع آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

## تعریف ۳.۱.۱: ضرب اسکالر در بردار

برای یک بردار  $\mathbf{v}$  و اسکالر  $c$  داریم:

$$c\mathbf{v} = \begin{bmatrix} cv_1 \\ cv_2 \\ \vdots \\ cv_n \end{bmatrix}$$

## تعریف ۴.۱.۱: ترکیب خطی بردارها

یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

## مثال ۲.۱.۱:

فرض کنید دو بردار زیر را داشته باشیم:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

اگر ضرایب  $c_1 = 2$  و  $c_2 = -1$  باشند، ترکیب خطی آن‌ها برابر است با:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## مثال ۳.۱.۱: نوشتن یک بردار به صورت ترکیب خطی چند بردار دیگر

برداری که به صورت ترکیب خطی دو بردار دیگر نوشته می‌شود:  
فرض کنیم سه بردار زیر را داشته باشیم:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$$

می‌خواهیم ضرایبی مانند  $c_1, c_2$  پیدا کنیم که:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{w}$$

با جایگذاری مقدار بردارها، دستگاه معادلات خطی زیر را داریم:

$$c_1(1) + c_2(3) = 7$$

$$c_1(2) + c_2(4) = 10$$

با حل این دستگاه، مقدار  $c_1 = 1$  و  $c_2 = 2$  به دست می‌آید، پس بردار  $\mathbf{w}$  را می‌توان به صورت ترکیب خطی دو بردار دیگر نوشت.

مثال ۴.۱.۱: برداری که به صورت ترکیب خطی دو بردار دیگر نوشته نمی‌شود

فرض کنیم سه بردار زیر را داشته باشیم:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

اگر بخواهیم ضرایبی مانند  $c_1, c_2$  پیدا کنیم که:

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{w}$$

با جایگذاری مقدار بردارها، دستگاه معادلات خطی زیر را داریم:

$$c_1(1) + c_2(2) = 3$$

$$c_1(1) + c_2(2) = 4$$

این دو معادله با هم در تناقض‌اند (چون سمت چپ دو معادله برابر است اما سمت راست متفاوت)، بنابراین چنین ضرایبی وجود ندارد و بردار  $\mathbf{w}$  را نمی‌توان به صورت ترکیب خطی دو بردار دیگر نوشت.

تعریف ۵.۱.۱: ضرب داخلی بردارها

اگر  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  باشند، ضرب داخلی آن‌ها به صورت زیر است:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

مثال ۵.۱.۱:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(4) + (2)(-5) + (3)(6) = 4 - 10 + 18 = 12$$

## تعریف ۶.۱.۱: تعمیم ضرب داخلی به بردارهای مختلط

برای دو بردار مختلط  $u, v \in \mathbb{C}^n$ ، ضرب داخلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$u \cdot v = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i}$$

که در آن  $\overline{v_i}$  مزدوج مختلط  $v_i$  است.

## مثال ۶.۱.۱:

فرض کنیم دو بردار مختلط زیر را داشته باشیم:

$$u = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-i \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 3-i \\ 1+2i \end{bmatrix}$$

ضرب داخلی آن‌ها برابر است با:

$$\begin{aligned} u \cdot v &= (1+i)\overline{(3-i)} + (2-i)\overline{(1+2i)} \\ &= (1+i)(3+i) + (2-i)(1-2i) \\ &= (1 \cdot 3 + 1 \cdot i + i \cdot 3 + i \cdot i) + (2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2i) - i \cdot 1 - i \cdot (-2i)) \\ &= (3+i+3i-1) + (2-4i-i+2) \\ &= (2+4i) + (4-5i) = 6-i \end{aligned}$$



## نکته :

ضرب داخلی بردارها دارای ویژگی‌های مهم زیر است:

۱. خطی بودن در اولین مؤلفه: برای هر بردارهای  $u, v, w \in \mathbb{C}^n$  و ضرایب مختلط  $\alpha, \beta$  داریم:

$$(\alpha u + \beta v) \cdot w = \alpha(u \cdot w) + \beta(v \cdot w)$$

۲. خاصیت مزدوج‌گیری: برای هر دو بردار  $u, v \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$u \cdot v = \overline{v \cdot u}$$

یعنی اگر جای دو بردار را عوض کنیم، مزدوج مختلط نتیجه تغییر می‌کند.

۳. مثبت معین بودن: برای هر بردار  $u \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$u \cdot u \geq 0$$

و برابری زمانی رخ می‌دهد که  $u = 0$  باشد.

۴. نرم بردار: از ضرب داخلی می‌توان برای تعریف نرم (یا طول) یک بردار استفاده کرد:

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$$

۵. نامساوی شوارتز: برای هر دو بردار  $u, v \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$$

که تعمیم نامساوی کوشی-شوارتز برای بردارهای مختلط است.

## ۲.۱.۱ نرم بردار

نرم یک بردار، یک تابع است که مقدار عددی غیرمنفی را به هر بردار نسبت می‌دهد و نشان‌دهنده اندازه یا طول آن بردار است. به‌طور کلی، نرم یک بردار  $v \in \mathbb{R}^n$  یا  $\mathbb{C}^n$  تابعی است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|v\| : \mathbb{R}^n \text{ یا } \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$$

و باید سه خاصیت اصلی زیر را داشته باشد:

## نکته: خواص نُرم بردار

نرم یک بردار باید دارای ویژگی‌های مهم زیر باشد:  
 ۱. نامنفی بودن و خاصیت صفر: برای هر بردار  $v \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$\|v\| \geq 0, \quad \text{و} \quad \|v\| = 0 \iff v = 0$$

۲. همگنی: برای هر عدد مختلط  $\alpha$  و بردار  $v \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$$

یعنی ضرب یک بردار در یک عدد مختلط، مقدار نُرم را به اندازه قدرمطلق آن عدد تغییر می‌دهد.  
 ۳. نامساوی مثلثی: برای هر دو بردار  $u, v \in \mathbb{C}^n$  داریم:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

این خاصیت بیان می‌کند که طول مجموع دو بردار از مجموع طول‌های آن‌ها بیشتر نیست.

## تعریف ۷.۱.۱: نُرم اقلیدسی

نُرم اقلیدسی یک بردار  $v \in \mathbb{C}^n$  که با  $\|v\|$  نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$$

که در آن  $|v_i|$  مقدار قدرمطلق (یا اندازه) مؤلفه‌های مختلط بردار است. به نرم اقلیدسی نُرم ۲ هم گفته می‌شود و بیشتر اوقات آن را با نماد  $\|v\|_2$  نیز نشان می‌دهند.

## مثال ۷.۱.۱: محاسبه نُرم ۲ یک بردار دو بعدی مختلط مقدار

فرض کنیم بردار  $v \in \mathbb{C}^2$  به صورت زیر داده شده باشد:

$$v = \begin{bmatrix} 3 + 4i \\ 1 - i \end{bmatrix}$$

نرم این بردار برابر است با:

$$\begin{aligned} \|v\|_2 &= \sqrt{|3 + 4i|^2 + |1 - i|^2} \\ &= \sqrt{(3^2 + 4^2) + (1^2 + (-1)^2)} \\ &= \sqrt{(9 + 16) + (1 + 1)} \\ &= \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

## تعریف ۸.۱.۱: نُرم بی‌نهایت

نرم بی‌نهایت یک بردار  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  یا  $\mathbb{C}^n$  که با  $\|\mathbf{v}\|_\infty$  نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$$

یعنی بزرگ‌ترین مقدار مطلق در بین مؤلفه‌های بردار را نشان می‌دهد.

## مثال ۸.۱.۱: محاسبه نُرم بی‌نهایت

فرض کنیم بردار زیر را داشته باشیم:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

در این صورت:

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max\{|-3|, |7|, |2|\} = 7$$

برای بردار مختلط:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 + i \\ -4 - 3i \\ 5 + 2i \end{bmatrix}$$

داریم:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}\|_\infty &= \max\{|2 + i|, |-4 - 3i|, |5 + 2i|\} \\ &= \max\{\sqrt{2^2 + 1^2}, \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}, \sqrt{5^2 + 2^2}\} \\ &= \max\{\sqrt{5}, \sqrt{25}, \sqrt{29}\} = \sqrt{29} \end{aligned}$$

تعریف ۹.۱.۱: نُرم  $p$ -ام (p-Norm)

نُرم  $p$ -ام یک بردار  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  یا  $\mathbb{C}^n$  که با  $\|\mathbf{v}\|_p$  نمایش داده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|\mathbf{v}\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

که در آن  $p \geq 1$  یک عدد حقیقی است.

## تعریف ۱۰.۱.۱: نُرم ۱ (Manhattan Norm)

نُرم ۱ که به نام نُرم مانهتن یا نُرم تاکسی‌متری نیز شناخته می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|\mathbf{v}\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

یعنی مجموع مقادیر قدرمطلق مؤلفه‌های بردار را نشان می‌دهد.

## مثال ۹.۱.۱: محاسبه نُرم p

فرض کنیم بردار  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  به صورت زیر داده شده باشد:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

نُرم ۲ (نُرم اقلیدسی) برابر است با:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = (|3|^2 + |-4|^2 + |1|^2)^{\frac{1}{2}} = (9 + 16 + 1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{26}$$

برای نُرم ۳ داریم:

$$\|\mathbf{v}\|_3 = (|3|^3 + |-4|^3 + |1|^3)^{\frac{1}{3}} = (27 + 64 + 1)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{92}$$

## مثال ۱۰.۱.۱: محاسبه نُرم ۱

برای بردار:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

داریم:

$$\|\mathbf{v}\|_1 = |3| + |-4| + |1| = 3 + 4 + 1 = 8$$

## مثال ۱۱.۱.۱: محاسبه نرم ۱ بردار مختلط مقدار

فرض کنیم بردار  $w \in \mathbb{C}^3$  به صورت زیر داده شده باشد:

$$w = \begin{bmatrix} 2+i \\ -3-2i \\ 4i \end{bmatrix}$$

ابتدا قدرمطلق هر مؤلفه را محاسبه می‌کنیم:

$$|2+i| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$$

$$|-3-2i| = \sqrt{(-3)^2+(-2)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$$

$$|4i| = \sqrt{(0)^2+4^2} = \sqrt{16} = 4$$

بنابراین، مقدار نرم ۱ این بردار برابر است با:

$$\|w\|_1 = |2+i| + |-3-2i| + |4i| = \sqrt{5} + \sqrt{13} + 4$$

## تعریف ۱۱.۱.۱: نرم ضرب داخلی

از ضرب داخلی می‌توان نرم یک بردار را محاسبه کرد:

$$\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$$

## ۳.۱.۱ ماتریس‌ها

## تعریف ۱۲.۱.۱: ماتریس

یک ماتریس  $m \times n$  مجموعه‌ای مستطیلی از اعداد است:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

## مثال ۱۲.۱.۱:

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

## ۴.۱.۱ ماتریس‌های خاص

## تعریف ۱۳.۱.۱: ماتریس مربعی

یک ماتریس مربعی، ماتریسی است که تعداد سطرها و ستون‌های آن برابر است:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۴.۱.۱: ماتریس مستطیلی

یک ماتریس مستطیلی دارای تعداد سطر و ستون نامساوی است:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$$

مثال:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۵.۱.۱: ماتریس صفر

ماتریسی که تمام درایه‌های آن صفر باشند:

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۶.۱.۱: ماتریس همانی

یک ماتریس مربعی که درایه‌های قطر اصلی آن ۱ و سایر درایه‌ها صفر باشند:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۷.۱.۱: ماتریس قطری

یک ماتریس مربعی که درایه‌های خارج از قطر اصلی آن صفر هستند:

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix}$$

مثال:

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۸.۱.۱: ماتریس بالا مثلثی

یک ماتریس مربعی که درایه‌های پایین‌تر از قطر اصلی آن صفر هستند:

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

مثال:

$$U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۱۹.۱.۱: ماتریس پایین مثلثی

یک ماتریس مربعی که درایه‌های بالاتر از قطر اصلی آن صفر هستند:

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

مثال:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۲۰.۱.۱: ماتریس متقارن

یک ماتریس مربعی که در آن  $A^T = A$  باشد:

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{12} & s_{22} & s_{23} \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} \end{bmatrix}$$

مثال:

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

## تعریف ۲۱.۱.۱: جمع ماتریس‌ها

اگر  $A, B$  دو ماتریس هم‌اندازه باشند، جمع آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$$

## تعریف ۲۲.۱.۱: ضرب اسکالر در ماتریس

برای یک ماتریس  $A$  و اسکالر  $c$  داریم:

$$(cA)_{ij} = cA_{ij}$$

## تعریف ۲۳.۱.۱: ضرب ماتریس‌ها

اگر  $A$  یک ماتریس  $m \times n$  و  $B$  یک ماتریس  $n \times p$  باشد، حاصل ضرب  $AB$  یک ماتریس  $m \times p$  است که درایه‌های آن به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}$$

## ۵.۱.۱ نُرم ماتریس

نُرم یک ماتریس، تعمیمی از نُرم بردار است که اندازه یا بزرگی یک ماتریس را نشان می‌دهد. به طور کلی، نُرم ماتریس یک تابع  $\|A\|$  است که مقدار عددی غیرمنفی را به هر ماتریس  $A$  نسبت می‌دهد و باید خواص زیر را داشته باشد:



## نکته: خواص نُرم بردار

۱. نامنفی بودن و خاصیت صفر:

$$\|A\| \geq 0, \quad \text{و} \quad \|A\| = 0 \iff A = 0$$

۲. همگنی (همریختی مثبت):

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ یا } \mathbb{C}$$

۳. نامساوی مثلثی:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

۴. سازگاری با ضرب بردار (در نُرم‌های القایی):

$$\|A\mathbf{v}\| \leq \|A\| \|\mathbf{v}\|, \quad \forall \mathbf{v} \neq 0$$

## ۶.۱.۱ انواع نُرم‌های ماتریس

چندین نُرم برای ماتریس‌ها تعریف می‌شود که بسته به کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرند:

## تعریف ۲۴.۱.۱: نُرم فروبنیوس (Frobenius Norm)

نُرم فروبنیوس، مشابه نُرم اقلیدسی برای بردارها، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

مثال: اگر

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

باشد، نُرم فروبنیوس برابر است با:

$$\|A\|_F = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}$$

تعریف ۲۵.۱.۱: نُرم  $p$ -ام القایی (Induced Norm)

نُرم  $p$ -ام القایی، برای یک ماتریس  $A$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|A\|_p = \sup_{\mathbf{v} \neq 0} \frac{\|A\mathbf{v}\|_p}{\|\mathbf{v}\|_p}$$

دو حالت خاص آن رایج‌تر هستند:

نُرم ۱ (نُرم ستون‌محور):

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

که بیشترین مجموع ستون‌های قدرمطلق را نشان می‌دهد.

نُرم  $\infty$  (نُرم سطر‌محور):

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

که بیشترین مجموع سطرهای قدرمطلق را نشان می‌دهد.

مثال: برای ماتریس:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

نُرم ۱ برابر است با:

$$\|A\|_1 = \max\{|-2| + |4|, |3| + |-1|\} = \max\{6, 4\} = 6$$

و نُرم بی‌نهایت برابر است با:

$$\|A\|_\infty = \max\{|-2| + |3|, |4| + |-1|\} = \max\{5, 5\} = 5$$

## تعریف ۲۶.۱.۱: نُرم طیفی (Spectral Norm)

نُرم طیفی ماتریس  $A$  که با  $\|A\|_2$  نمایش داده می‌شود، برابر با بزرگترین مقدار ویژه (مقدار تکین) ماتریس است:

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$$

که  $\sigma_{\max}(A)$  بزرگ‌ترین مقدار تکین ماتریس  $A$  است.

مثال: اگر

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

باشد، مقادیر ویژه آن  $\lambda = \pm 1$  هستند. بنابراین:

$$\|A\|_2 = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|\} = \max\{1, 1\} = 1$$

## ۲.۱ دترمینان

## تعریف ۱.۲.۱: تعریف دترمینان

دترمینان یک ماتریس مربعی را می‌توان به صورت بازگشتی با استفاده از بسط روی یک سطر یا ستون محاسبه کرد. دترمینان ماتریس  $A = [a_{ij}]$  مرتبه  $n$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

که در آن  $M_{ij}$  دترمینان ماتریس حاصل از حذف سطر  $i$  و ستون  $j$  از  $A$  است.

## نکته:

- معمولاً انتخاب \*\*سطر یا ستونی که بیشترین تعداد صفر دارد\*\* محاسبات را ساده‌تر می‌کند.

مثال ۱.۲.۱: دترمینان ماتریس  $2 \times 2$ 

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

دترمینان این ماتریس به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\det(A) = ad - bc$$

مثال عددی:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (3)(7) - (5)(2) = 21 - 10 = 11$$

مثال ۲.۲.۱: دترمینان ماتریس  $3 \times 3$ 

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

بسط روی سطر اول:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\ &= 1(5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) \\ &= 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + 3(32 - 35) \\ &= 1(-3) - 2(-6) + 3(-3) = -3 + 12 - 9 = 0 \end{aligned}$$

پس این ماتریس \*\*دترمینان صفر دارد\*\* و \*\*وابسته خطی\*\* است.

مثال ۳.۲.۱: دترمینان ماتریس  $4 \times 4$ 

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

بسط روی سطر اول:

$$\det(C) = 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

با محاسبه‌ی دترمینان هر کدام از این ماتریس‌های  $3 \times 3$ ، مقدار نهایی به دست می‌آید:

$$\det(C) = 2(4) - 1(-3) + 3(5) - 4(2) = 8 + 3 + 15 - 8 = 18$$

## ۱.۲.۱ ماتریس نامنفرد

## تعریف ۲.۲.۱: تعریف ماتریس نامنفرد

یک ماتریس مربعی  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  را نامنفرد یا معکوس‌پذیر گویند، اگر و تنها اگر دترمینان آن مخالف صفر باشد، یعنی:

$$\det(A) \neq 0$$

در این حالت، ماتریس  $A$  دارای یک ماتریس معکوس  $A^{-1}$  است که در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

که در آن  $I_n$  ماتریس همانی مرتبه  $n$  است.

مثال ۴.۲.۱: ماتریس نامنفرد  $2 \times 2$ 

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

ابتدا دترمینان آن را محاسبه می‌کنیم:

$$\det(A) = (2 \times 4) - (3 \times 1) = 8 - 3 = 5$$

چون  $\det(A) \neq 0$ ، این ماتریس نامنفرد است و معکوس‌پذیر می‌باشد.

مثال ۵.۲.۱: ماتریس منفرد  $2 \times 2$ 

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

دترمینان این ماتریس برابر است با:

$$\det(B) = (2 \times 2) - (4 \times 1) = 4 - 4 = 0$$

چون  $\det(B) = 0$ ، این ماتریس **منفرد\*\*** است و معکوس ندارد.مثال ۶.۲.۱: ماتریس نامنفرد  $3 \times 3$ 

در نظر بگیرید:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

دترمینان این ماتریس را به کمک بسط محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \det(C) &= 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (1 \times 0 - 4 \times 6) - 2 \times (0 \times 0 - 4 \times 5) + 3 \times (0 \times 6 - 1 \times 5) \end{aligned}$$

$$= 1 \times (-24) - 2 \times (-20) + 3 \times (-5) = -24 + 40 - 15 = 1$$

چون  $\det(C) \neq 0$ ، ماتریس  $C$  نامنفرد و معکوس‌پذیر است.

## ۳.۱ خواص دترمینان

دترمینان یک ماتریس دارای ویژگی‌های مهمی است که در ادامه به برخی از این خواص اشاره می‌کنیم:

۱. دترمینان ماتریس همانی:

$$\det(I_n) = 1$$

که در آن  $I_n$  ماتریس همانی مرتبه  $n$  است.

۲. دترمینان ماتریس ناصفر فقط برای ماتریس نامنفرد:

$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \text{معکوس‌پذیر است } A.$$

۳. دترمینان ماتریس منفرد برابر صفر است:

$$\det(A) = 0 \Rightarrow \text{ماتریس منفرد است و معکوس ندارد } A.$$

۴. خاصیت ضرب دترمینان: برای دو ماتریس مربعی هم‌مرتبه  $A$  و  $B$  داریم:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

۵. دترمینان ماتریس معکوس: اگر  $A$  یک ماتریس نامنفرد باشد، آنگاه:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

۶. دترمینان ماتریس بالامثلثی یا پایین‌مثلثی: اگر  $A$  یک ماتریس مثلثی (بالامثلثی یا پایین‌مثلثی) باشد، دترمینان آن برابر است با حاصل ضرب درایه‌های قطری:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

۷. اثر ضرب یک سطر یا ستون در یک عدد ثابت: اگر تمام درایه‌های یک سطر یا ستون ماتریس  $A$  در عدد ثابت  $c$  ضرب شوند، دترمینان نیز در همان مقدار ضرب می‌شود:

$$\det(B) = c \det(A).$$

۸. جابجایی دو سطر یا دو ستون: اگر در یک ماتریس دو سطر یا دو ستون را با هم جابجا کنیم، دترمینان علامت عوض می‌کند:

$$\det(A') = -\det(A).$$

۹. سطرها یا ستون‌های مساوی یا مضرب یکدیگر: اگر دو سطر یا دو ستون یک ماتریس مساوی باشند یا مضرب یکدیگر باشند، آنگاه:

$$\det(A) = 0.$$

۱۰. دترمینان ترانهادی ماتریس: برای هر ماتریس مربعی  $A$  داریم:

$$\det(A^T) = \det(A).$$

## ۴.۱ کدهای پایتون

### کد پایتون ۱۰.۴.۱: تعریف بردار و ماتریس در پایتون

در سطر سوم برنامه زیر یک بردار و در سطر پنجم یک ماتریس در محیط پایتون تعریف شده‌اند. برای تعریف این دو نیاز به کتابخانه `numpy` وجود دارد که در سطر اول این کتابخانه وارد و از `np` به عنوان اختصار آن استفاده شده است.

```
1 import numpy as np
2 vector = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
3 print("vector:")
4 print(vector)
5 matrix = np.array([[1, 2, 3],
6                    [4, 5, 6],
7                    [7, 8, 9]])
8 print("\n matrix:")
9 print(matrix)
```

## کد پایتون ۲.۴.۱: محاسبه نُرم‌های مختلف یک ماتریس در پایتون

```

1 import numpy as np
2 A = np.array([[1, -2, 3],[4, 0, -1],[-2, 1, 5]])
3 norm_1 = np.linalg.norm(A, 1)
4 norm_inf = np.linalg.norm(A, np.inf)
5 norm_fro = np.linalg.norm(A, 'fro')
6 norm_2 = np.linalg.norm(A, 2)
7 print(f"Norm 1 (Column Norm): {norm_1}")
8 print(f"Infinity Norm (Row Norm): {norm_inf}")
9 print(f"Frobenius Norm: {norm_fro}")
10 print(f"Spectral Norm (Largest Singular Value): {norm_2}")

```

```

Norm 1 (Column Norm): 9.0
Infinity Norm (Row Norm): 8.0
Frobenius Norm: 7.810249675906654
Spectral Norm (Largest Singular Value): 6.40854048954407

```

## کد پایتون ۳.۴.۱: محاسبه تقریبی نُرم ۱ یک ماتریس با استفاده از هزار بردار تصادفی غیر صفر

```

1 import numpy as np
2 A = np.array([[1, -2, 3],
3               [4, 0, -1],
4               [-2, 1, 5]])
5 num_samples = 1000
6 approx_norm_1 = 0
7 for _ in range(num_samples):
8     v = np.random.randn(A.shape[1])
9     v /= np.linalg.norm(v, 1)
10    norm_ratio = np.linalg.norm(A @ v, 1)
11    approx_norm_1 = max(approx_norm_1, norm_ratio)
12
13 print(f"Approximate Norm 1: {approx_norm_1}")

```

```

Approximate Norm 1: 8.396903386801652

```

## کد پایتون ۴.۴.۱: محاسبه دترمینان یک ماتریس

```

1 import numpy as np
2 # Define a 5x5 matrix
3 A = np.array([
4     [2, 1, 3, 4, 5],
5     [1, 0, 2, 1, 3],
6     [3, 2, 1, 0, 4],
7     [4, 1, 0, 2, 1],
8     [5, 3, 4, 1, 2]
9 ])
10 # Compute the determinant
11 det_A = np.linalg.det(A)
12 # Display the determinant (rounded to 4 decimal places)
13 print("\nDeterminant of matrix A:")
14 print(round(det_A, 4))

```

Determinant of matrix A:  
-286.0

## ۵.۱ تمرین‌ها

## تمرین ۱.۵.۱

- برای ماتریس‌های صفر و ماتریس‌های همانی انواع نُرم‌های ماتریسی را بدست آورید. چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
- ماتریس زیر را در نظر بگیرید هر یک از نُرم‌های ماتریس روی آن را محاسبه کنید.

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}$$