

# Exercise 1

Caio Couto Batatinha (caiocbatatinha@gmail.com)

13. November 2021

## Exercise 1

---

Let  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  be a set of sample. Show that for all  $a \in \mathbb{R}$  :

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + n(\bar{x}_n - a)^2$$

## Solution

---

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n ((x_i - \bar{x}_n) + (\bar{x}_n - a))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)(\bar{x}_n - a) + \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + 2(\bar{x}_n - a) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) + n(\bar{x}_n - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + 2(\bar{x}_n - a) \cancel{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)} + n(\bar{x}_n - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + n(\bar{x}_n - a)^2 \end{aligned}$$

## References

---

[https://www.math.arizona.edu/~jwatkins/N\\_unbiased.pdf](https://www.math.arizona.edu/~jwatkins/N_unbiased.pdf)