

Exercise 2:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad \text{and} \quad \sigma_{ad}^2 = \frac{1}{n-p-1} \hat{\epsilon}^T \hat{\epsilon}.$$

$$\begin{aligned} 1. \quad \hat{\beta} &= (X^T X)^{-1} X^T y \\ &= (X^T X)^{-1} X^T (X\beta + \epsilon) \quad [\because y_i = \beta_0 + \dots + x_i \beta_1 + \epsilon_i] \\ &= (X^T X)^{-1} (X^T X) \beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon \\ &= \beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Now } E[\hat{\beta}] &= \beta + (X^T X)^{-1} X^T E[\epsilon] \\ &= \beta \quad [\because E[\epsilon] = 0] \end{aligned}$$

We know,

$$\begin{aligned} \text{cov}(\hat{\beta}) &= E[(\hat{\beta} - E[\hat{\beta}])(\hat{\beta} - E[\hat{\beta}])^T] \\ &= E[(\hat{\beta} - \beta)(\hat{\beta} - \beta)^T] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Now, } \hat{\beta} - \beta &= (X^T X)^{-1} X^T y - \beta \\ &= (X^T X)^{-1} X^T (X\beta + \epsilon) - \beta \\ &= \beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon - \beta \\ &= (X^T X)^{-1} X^T \epsilon. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{So, } \text{cov}(\hat{\beta}) &= E[(X^T X)^{-1} X^T \epsilon ((X^T X)^{-1} X^T \epsilon)^T] \\ &= E[(X^T X)^{-1} (X^T X) \epsilon \epsilon^T (X^T X)^{-1}] \\ &= E[\epsilon \epsilon^T (X^T X)^{-1}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (X^T X)^{-1} \underbrace{E[\varepsilon \varepsilon^T]} \\
&= (X^T X)^{-1} \cdot \underbrace{\sigma^2 I_n} \\
&= \sigma^2 (X^T X)^{-1}.
\end{aligned}$$

$$\text{So, } \text{cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}.$$

2. $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}$

So,

$$E[\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}] = E[(y - X\hat{\beta})^T (y - X\hat{\beta})]$$

$$= E[(y - X(X^T X)^{-1} X^T y)^T (y - X(X^T X)^{-1} X^T y)]$$

$$= E[(y - Hy)^T (y - Hy)]$$

$$[\text{Take } X(X^T X)^{-1} X^T = H]$$

$$= E[y^T (I_n - H)^T (I_n - H) y]$$

$$= E[y^T (I_n - H) y]$$

$$= \text{tr}((I_n - H) \sigma^2 I_n) + \beta^T X^T (I_n - H) X \beta$$

$$[E[X^T A X] = \text{tr}(A \Sigma) + M^T A M]$$

$$= \sigma^2 (n - p - 1) + \beta^T X^T (I_n - X(X^T X)^{-1} X^T) X \beta$$

[The matrix $I_n - H$ is also symmetric and Idempotent with $\text{rank}(I_n - H) = n - p - 1$.]

$$= \sigma^2(n-p-1) + \beta^T X^T X \beta - \beta^T X^T X (X^T X)^{-1} X^T X \beta$$

$$= \sigma^2(n-p-1) + \beta^T X^T X \beta - \beta^T X^T X \beta$$

$$= \sigma^2(n-p-1)$$

Now, $E[\sigma_{ad}^2] = \frac{1}{n-p-1} E[\hat{\epsilon}^T \hat{\epsilon}]$

$$\Rightarrow E[\sigma_{ad}^2] = \frac{1}{n-p-1} \cdot \sigma^2(n-p-1)$$

$$\Rightarrow E[\sigma_{ad}^2] = \sigma^2.$$