

# Introdução a Métodos Computacionais em EDOs

Notas de aula - Processos Iterativos Escalares

Prof. Yuri Dumaresq Sobral

Departamento de Matemática  
Universidade de Brasília

2025

Ao longo deste curso, vamos falar diversas vezes sobre **iterações** e de **convergência**, mas ainda não interpretamos estas palavras do ponto de vista matemático. Vamos dar uma olhada nisto agora!

Considere uma função  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que possamos construir, com base nela, a seguinte **equação recursiva**:

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Teremos, claramente:

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2),$$

$$x_4 = g(x_3), \quad x_5 = g(x_4), \quad x_6 = g(x_5),$$

$$\vdots$$

Para inicializarmos o processo iterativo precisamos de uma condição inicial  $x_0$ .

De fato, o processo iterativo depende fortemente desta condição inicial, pois:

$$x_1 = g(x_0)$$

$$x_2 = g(x_1) = g(g(x_0)) = g \circ g(x_0)$$

$$x_3 = g(x_2) = g(g(g(x_0))) = g \circ g \circ g(x_0)$$

$$x_4 = g(x_3) = \dots = g(g(g(g(x_0)))) = g \circ g \circ g \circ g(x_0)$$

$$x_{n+1} = g(x_n) = \dots = \underbrace{g \circ g \circ g \circ \dots \circ g}_{n+1 \text{ vezes}}(x_0)$$

Isto é, o valor da função na iteração  $n$  é determinado pelo valor da aplicação da função composta  $\underbrace{g \circ g \circ g \circ \dots \circ g}_{n \text{ vezes}}$  em  $x_0$ .

Exemplo 1: Considere o processo iterativo “da calculadora”

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n}, \quad x_0 = 100.$$

Realizando as iterações, obtemos os seguintes resultados:

$$x_1 = \sqrt{x_0} = \sqrt{100} = 10$$

$$x_2 = \sqrt{x_1} = \sqrt{10} = 3,16227 \dots$$

$$x_3 = \sqrt{x_2} = \sqrt{3,16227 \dots} = 1,77827 \dots$$

$$x_4 = \sqrt{x_3} = \sqrt{1,77827 \dots} = 1,33352 \dots$$

$$\vdots$$

$$x_{10} = \sqrt{x_9} = \sqrt{1,00903 \dots} = 1,00450 \dots$$

$$\vdots$$

$$x_{20} = \sqrt{x_{19}} = 1,00000439 \dots$$

$$\vdots$$

$$x_{30} = \sqrt{x_{29}} = 1,000000004289 \dots$$

$$\vdots$$

Com este exemplo bem simples, já podemos aprender algumas características importantes de processos iterativos:

- Conhecendo-se a função  $g$  que define o processo iterativo, é muito fácil calculá-lo!
- Haverá um potencial problema se a **imagem da função  $g$  não estiver contida no seu domínio**! Se isto acontecer, a função  $g$  pode assumir algum valor numa iteração  $n$  que não poderá ser usado para calcular o passo seguinte  $n + 1$ .

Exemplo 2: Considere  $g(x) = \sqrt{x - 5}$ . O domínio desta função é o intervalo  $\mathcal{D} = [5, \infty)$ . Se começarmos o processo iterativo com  $x_0 = 9$ , teremos  $x_1 = \sqrt{9 - 5} = \sqrt{4} = 2$ . O próximo passo seria  $x_2 = \sqrt{x_1} = \sqrt{2 - 5} = \sqrt{-3}$ , que não é real. O processo não está mais definido para  $n \geq 1$ ! Note que a imagem deste processo é o intervalo  $\mathcal{I} = [0, \infty)$ , que não está contido em seu domínio  $\mathcal{D}$ .

- Apesar de ser muito fácil (trivial!) calcular um processo iterativo (ótimo para **projetarmos** nossos algoritmos de cálculo numérico!), compreender o que está acontecendo com ele é mais complicado... No Exemplo 1, **parece** que o processo está **tendendo** a 1... Será verdade? Responder a este tipo de pergunta pode ser realmente complicado!
- Matematicamente, o que estamos perguntando é: o que acontece com o processo iterativo quando  $n \rightarrow \infty$ ?

Exemplo 3: Vamos ver três comportamentos distintos que podem acontecer num processo iterativo. Considere  $x_{n+1} = g(x_n)$ , com um  $x_0 > 1$  e

$$(i) \ g(x) = \sqrt{x}$$

$$(ii) \ g(x) = x$$

$$(iii) \ g(x) = x^2.$$

- Caso (i): Neste caso,  $x_{n+1} = \sqrt{x_n}$  e o valor do processo na iteração  $n$  é trivialmente dado por  $x_n = \sqrt[2^n]{x_0} = x_0^{\frac{1}{2^n}}$ . De Cálculo 2, sabemos que a sequência  $\{x_0^{\frac{1}{2^n}}\}$  **converge** para 1 com  $n \rightarrow \infty$ . Note que isto é válido para **qualquer** valor de  $x_0 > 1$  com o qual o processo seja iniciado. O processo converge para um valor distinto do qual ele começou.
- Caso (ii): Neste caso,  $x_{n+1} = x_n$  e o valor do processo na iteração  $n$  é trivialmente dado por  $x_n = x_0$ . Este processo **converge trivialmente** para o valor de  $x_0$ .
- Caso (iii): Neste caso,  $x_{n+1} = x_n^2$  e o valor do processo na iteração  $n$  é trivialmente dado por  $x_n = x_0^{2^n}$ . De Cálculo 2, sabemos que a sequência  $\{x_0^{2^n}\}$  **diverge** para qualquer valor  $x_0 > 1$  com o qual o processo seja iniciado.

- O nosso interesse está em processos iterativos como o processo (i) do Exemplo 3 e nossos **algoritmos** devem ser construídos com isto em mente! Eles devem gerar resultados que **converjam** para algum lugar!
- O que podemos dizer sobre este **algum lugar**? Vamos considerar que o processo iterativo  $x_{n+1} = g(x_n)$  convirja para uma valor  $x^*$ . Então, supondo que a função  $g(x)$  seja contínua, temos:

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = g(x^*)$$

- Portanto, a solução **convergida** do processo iterativo satisfaz a equação  $x^* = g(x^*)$ . Quanto isto acontece, dizemos que  $x^*$  é um **ponto fixo** do processo iterativo.



### Observações:

- **ATENÇÃO**: quando quisermos encontrar o ponto fixo de um processo iterativo, devemos resolver a equação (algébrica)

$$x^* = g(x^*).$$

- Note que a continuidade de  $g(x)$  é essencial para que o ponto fixo  $x^*$  satisfaça a equação  $x^* = g(x^*)$ . Sem ela, não é possível **passar o limite para dentro** da  $g(x)$ .
- Como  $g(x)$  é uma função genérica, é possível que a equação  $x^* = g(x^*)$  admita mais de uma solução! Precisamos, portanto, entender não apenas se o processo iterativo converge, mas também para onde ele converge!

- **Classificação dos pontos fixos.** De acordo com o Exemplo 3, temos três tipos de pontos fixos:
  - **Assintoticamente estáveis:** o processo iterativo é atraído por estes pontos, isto é, se o processo iterativo começar suficientemente perto destes pontos, ele será atraído para este ponto.
  - **Estáveis:** os processos iterativos que começarem suficientemente perto destes pontos, permanecerão próximos destes pontos, mas não tenderão para estes pontos.
  - **Instáveis:** os processos iterativos que começarem suficientemente perto destes pontos tenderão a se afastar destes pontos.
- Nossa meta no curso de Cálculo Numérico: **queremos construir métodos (algoritmos) iterativos que tenham pontos fixos assintoticamente estáveis nas soluções dos problemas que queremos resolver.**

Exemplo 4: Considere o processo iterativo linear

$$x_{n+1} = ax_n, \quad a > 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

- Cálculo do ponto fixo: Devemos resolver a equação do ponto fixo

$$x^* = ax^* \Leftrightarrow (a - 1)x^* = 0,$$

Temos duas possibilidades. Se  $a = 1$ , então qualquer  $x^* \in \mathbb{R}$  é ponto fixo do sistema (infinitos pontos fixos). Se  $a \neq 1$ , então  $x^* = 0$  é o único ponto fixo do sistema. Apenas o segundo caso é relevante. Então, neste caso, o processo iterativo é dado por:

$$x_{n+1} = ax_n = a(ax_{n-1}) = a^2(ax_{n-2}) = \cdots = a^{n+1}x_0.$$

- Se  $a < 1$ , então temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} x_0 = x_0 \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} = 0.$$

Assim,  $x^* = 0$  é **ponto fixo assintoticamente estável** do processo iterativo linear quando  $a < 1$ .

- Se  $a > 1$ , então temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} x_0 = x_0 \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} = \infty.$$

Assim,  $x^* = 0$  é **ponto fixo instável** do processo iterativo linear quando  $a > 1$ .

- Este exemplo será importante para os passos seguintes.
- Dever de casa: estude o caso  $a < 0$ .

- No Exemplo 4, conseguimos resolver o processo iterativo e calcular na mão a estabilidade dos pontos fixos. Mas nem sempre isto é possível ou prático. Será que existe alguma maneira mais elegante de determinarmos a estabilidade dos pontos fixos de um processo iterativo?
- Vamos considerar um processo iterativo  $x_{n+1} = g(x_n)$  e, assumindo que  $g$  é uma função bem comportada (isto é, é contínua e tem todas as derivadas que precisamos), podemos **linearizar** o processo nas vizinhanças do ponto fixo  $x^*$ :

$$x_{n+1} = g(x_n) = g(x^*) + g'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{1}{2!}g''(x^*)(x_n - x^*)^2 + \dots$$

- Vamos desprezar os **termos de alta ordem** da expressão acima, isto é:

$$x_{n+1} = g(x^*) + g'(x^*)(x_n - x^*) = \alpha + \beta x_n,$$

$$\alpha = g(x^*) - g'(x^*)x^* \qquad \beta = g'(x^*).$$

- Note que a linearização não altera o ponto fixo do processo, pois

$$x^* = \alpha + \beta x^* = g(x^*) + g'(x^*)(x^* - x^*) \Leftrightarrow x^* = g(x^*).$$

- Podemos definir o **erro** do processo iterativo na iteração  $n$  como sendo  $e_n = x_n - x^*$  (distância da iteração  $n$  para o ponto fixo). Assim, voltando ao processo iterativo linearizado, podemos subtrair dos dois lados da equação  $x^*$ :

$$x_{n+1} = \alpha + \beta x_n \Leftrightarrow x_{n+1} - x^* = \alpha + \beta x_n - x^* \Leftrightarrow$$

$$x_{n+1} - x^* = \alpha + \beta x_n - (\alpha + \beta x^*) \Leftrightarrow x_{n+1} - x^* = \beta(x_n - x^*) \Leftrightarrow$$

$$e_{n+1} = \beta e_n$$

- O erro  $e_n$  é governado por um processo iterativo linear (como no Exemplo 4 e dever de casa)!
- Portanto, já sabemos que o ponto fixo deste processo é  $e^* = 0$  e ele será assintoticamente estável se e somente se  $|\beta| = |g'(x^*)| < 1$ . Neste caso,  $e_n \rightarrow 0$  quando  $n \rightarrow \infty$ .
- **CONCLUSÃO:** para  $x^*$  ser ponto fixo assintoticamente estável, precisamos que  $|g'(x^*)| < 1$ . Já sabemos caracterizar o ponto fixo sem precisarmos calcular o processo iterativo!
- **PROBLEMA:** em situações reais, não conhecemos o ponto fixo  $x^*$ ! Na verdade, queremos construir um método para encontrá-lo! Então, precisamos usar este resultado com cautela!

- Note que a análise linear nos diz que, **nas vizinhanças do ponto fixo**, o processo iterativo tem um erro que decai com uma taxa  $|g'(x^*)|$ . Portanto, a taxa mais rápida de decaimento seria quando  $g'(x^*) = 0$ , que é o menor valor que  $|g'(x^*)|$  pode assumir!
- Neste caso, a estimativa linear deixa de valer e precisamos considerar o próximo termo na expansão do processo iterativo em torno do ponto fixo. Usando o termo do erro de Lagrange (Cálculo 2), existe um  $\xi \in (x_n, x^*)$  tal que

$$x_{n+1} = g(x_n) = g(x^*) + g'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{1}{2!}g''(\xi)(x_n - x^*)^2$$

Como  $g(x^*) = x^*$  e  $g'(x^*) = 0$ , podemos reescrever o processo como:



$$x_{n+1} - x^* = \frac{1}{2!} g''(\xi)(x_n - x^*)^2$$

- O teorema do resto de Lagrange para séries de Taylor não fornece exatamente qual é o valor de  $\xi$ . Então, podemos tomar

$$\tau = \max_{x \in (x_n, x^*)} \left| \frac{1}{2!} g''(x) \right| \geq \frac{1}{2!} g''(\xi)$$

e, então,

$$x_{n+1} - x^* = e_{n+1} = \frac{1}{2!} g''(\xi)(x_n - x^*)^2 \leq \tau(x_n - x^*)^2 = \tau e_n^2$$

$$\Leftrightarrow e_{n+1} \leq \tau e_n^2$$

- Quando isto acontece, dizemos que o processo iterativo tem **convergência quadrática**! Quando  $x_n$  estiver muito próximo de  $x^*$ , o erro do processo vai decair para zero **MUITO mais rapidamente** do que no processo linear!
- Esta é uma propriedade desejável para nossos futuros métodos!

- Os processos iterativos que estudamos até agora são do tipo

$$x_{n+1} = g(x_n),$$

ou seja, dado um **único** valor inicial  $x_0$ , podemos começar o **processo iterativo** e os **próximos valores** do processo já estarão **definidos**...

- Este tipo de processo iterativo é chamado de **processo iterativo de primeira ordem**. **CUIDADO**: a palavra **ordem** terá **diversos** significados ao longo do curso!
- É possível definir processos iterativos **mais gerais**! Por exemplo, podemos pensar num processo iterativo do tipo

$$x_{n+1} = g(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-(m-2)}, x_{n-(m-1)}), \quad m \in \mathbb{N}.$$

Equivalentemente, podemos escrever este processo como:

$$x_{n+m} = g(x_{n+m-1}, x_{n+m-2}, x_{n+m-3}, \dots, x_{n+1}, x_n), \quad m \in \mathbb{N}.$$

- Chamamos este tipo de processo de **processo iterativo de ordem  $m$** .

$$x_{n+m} = g(x_{n+m-1}, x_{n+m-2}, x_{n+m-3}, \dots, x_{n+1}, x_n), \quad m \in \mathbb{N}.$$

- Para estes processos, a função  $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  e precisamos de  $m$  valores iniciais para iniciar o processo, isto é, precisamos conhecer:

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$$

para poder calcular  $x_{n+m}$ .

- Processos gerais deste tipo são muito difíceis de estudar de forma genérica. Vamos estudar apenas os processos iterativos lineares de ordem  $m$ :

$$\begin{aligned} x_{n+m} + a_{m-1}x_{n+m-1} + a_{m-2}x_{n+m-2} + \\ + a_{m-3}x_{n+m-3} + \dots + a_1x_{n+1} + a_0x_n = f(n), \end{aligned}$$

em que  $a_{m-1}, a_{m-2}, a_{m-3}, \dots, a_1, a_0$  são constantes reais e  $f(n)$  uma função qualquer de  $n$  (não-homogeneidade).

- Para simplificar a apresentação, vamos considerar apenas o caso geral de processo iterativo de ordem 2, isto é:

$$x_{n+2} + a_1 x_{n+1} + a_0 x_n = f(n),$$

com  $a_1$  e  $a_0$  conhecidos e  $f(n)$  qualquer, e tomando  $x_0$  e  $x_1$  valores iniciais conhecidos.

- Vamos tomar, inicialmente, o caso homogêneo, isto é,  $f(n) = 0$ . Para encontrarmos a solução geral deste processo iterativo, olhamos para a solução do processo iterativo linear de primeira ordem,  $x_{n+1} = a x_n$ , dada por  $x_n = a^n x_0$ . Podemos propor uma solução geral do tipo

$$x_n = r^n, \quad r \text{ constante}, \quad r \neq 0, \quad n \geq 1$$

com o valor de  $r$  a ser determinado.

- Desta forma, temos que:

$$r^{n+2} + a_1 r^{n+1} + a_0 r^n = 0 \quad \Leftrightarrow \quad r^2 + a_1 r + a_0 = 0.$$

Sabemos resolver esta equação característica para encontrar o valor  $r$ !!

- Do resultado clássico para equações algébricas quadráticas:

$$r = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2}.$$

- Teremos três possibilidades:

- 1  $a_1^2 - 4a_0 > 0$ : duas soluções reais distintas, dando origem à solução geral do processo iterativo

$$x_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n, \quad n \geq 1$$

com  $C_1$  e  $C_2$  constantes que dependem das condições iniciais  $x_0$  e  $x_1$ .

- 2  $a_1^2 - 4a_0 < 0$ : duas soluções complexas conjugadas, dando origem à solução geral do processo iterativo

$$x_n = \rho^n \left( C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta) \right), \quad n \geq 1,$$

$$\rho = \sqrt{a_0}, \quad \theta = \operatorname{atan}\left(-\frac{\sqrt{4a_0 - a_1^2}}{a_1}\right).$$

- 3  $a_1^2 - 4a_0 < 0$ : duas soluções reais idênticas, dando origem à solução geral do processo iterativo

$$x_n = C_1 r^n + C_2 n r_2^n, \quad n \geq 1$$

- Neste terceiro caso, a construção de duas soluções **linearmente independentes** a partir de uma solução para a **equação característica** se parece ao que conhecemos para **EDOs de segunda ordem**.
- E o que podemos falar sobre a **estabilidade** deste ponto fixo? É fácil mostrar que ponto fixo será **assintoticamente estável** quando
  - ①  $a_1^2 - 4a_0 > 0$ :  $|r_1|, |r_2| < 1$
  - ②  $a_1^2 - 4a_0 < 0$ :  $\rho < 1$
  - ③  $a_1^2 - 4a_0 = 0$ :  $|r| < 1$
- Esta análise pode ser estendida a processos iterativos de **ordem superior** a dois! Porém, as contas ficam **muito mais tediosas!**

- Para os processos de **ordem superior homogêneos**, claramente temos que  $x^* = 0$  será o único **ponto fixo** possível, pois

$$x^* = g(x^*, x^*, \dots, x^*) \Leftrightarrow$$

$$x^* + a_{m-1}x^* + a_{m-2}x^* + a_{m-3}x^* + \dots + a_1x^* + a_0x^* = 0 \Leftrightarrow$$

$$x^*(1 + a_{m-1} + a_{m-2} + a_{m-3} + \dots + a_1 + a_0) = 0 \Leftrightarrow$$

$$x^* = 0, \text{ para } 1 + a_{m-1} + a_{m-2} + a_{m-3} + \dots + a_1 + a_0 \neq 0.$$

- O mesmo descrito anteriormente se aplica para encontrarmos **soluções gerais** para processos iterativos **não-homogêneos**! Usaremos o **método dos coeficientes indeterminados** para encontrar uma **solução particular** para o processo iterativo. A **solução geral** será a combinação linear da solução do processo **homogêneo** com a solução **particular** obtida.
- Note que o **ponto fixo** neste caso **só existe** quando  $f(n) = b$  (**constante**) e é dado por

$$x^* = \frac{b}{1 + a_{m-1} + a_{m-2} + a_{m-3} + \cdots + a_1 + a_0},$$

novamente com  $1 + a_{m-1} + a_{m-2} + a_{m-3} + \cdots + a_1 + a_0 \neq 0$ .

- A **estabilidade assintótica** deste ponto fixo será obtida quando **critérios semelhantes** aos propostos acima para processos de ordem 2 valerem para a **solução homogênea** do processo iterativo!