# ESQUEMA DE VACUNACIÓN

| GRUPO ETARIO | EDAD | VACUNAS |
|---|---|---|
|  MENORES DE UN AÑO | Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única. | **BCG:** Meningitis Tuberculosa y Tuberculosis pulmonar diseminada |
| | Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única. | **HB:** Hepatitis B por transmisión vertical (madre con antecedente de HB) |
| | 2 meses | **ROTAVIRUS:** Enfermedad diarréica aguda por rotavirus. |
| | | **HEXAVALENTE*:** Previene 6 enfermedades: Toxoide diftérico, Toxoide tetánico, B Pertussis (tos ferina) de célula entera, HbsAg (hepatitis B), Vacuna inactivada de Polio Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 Y Haemophilus influenzae tipo B |
| | | **NEUMOCOCO 13**:** Neumonías, meningitis, otitis por streptococcus pneumoniae |
| | 4 meses | ROTAVIRUS • HEXAVALENTE* • NEUMOCOCO 13** |
| | 6 meses | **bOPV:** Poliomielitis |
| | | HEXAVALENTE* • NEUMOCOCO 13** |
| | INFLUENZA ESTACIONAL | |
|  12 MESES A 23 MESES | 12 meses | **FA:** Fiebre amarilla |
| | | **SRP 1:** Sarampión, Rubeola y Parotiditis (Paperas) |
| | 15 meses | Varicela |
| | 18 meses | HEXAVALENTE* • bOPV • SRP 2 |
|  NIÑEZ | 5 años | **DPT:** (Difteria, Tosferina, Tétanos) |
| | | **bOPV:** Poliomielitis |
| | 9 años (Niñas y niños) | **HPV:** Virus del Papiloma Humano (Dosis única)*** |
|  ADOLESCENCIA | 15 años | **dT:** Difteria y tétanos |
|  ADULTOS Vacunación en grupos de riesgo | Embarazadas | **dT** • **HB** (De acuerdo al antecedente |
| | | **Tdap****:** Antipertussis acelular (Tosferina), Toxoides tetánico, Diftérico. |
| | Mujeres en edad fértil. Hombres | **dT** (Cinco dosis de acuerdo al antecedente vacunal) |
| | Personal de Salud, trabajadoras sexuales, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas que viven con VIH. | **HB** (De acuerdo al antecedente vacunal) |
| | Viajeros | **SR** (Sarampión y Rubeola) |
| | | **FA** (De acuerdo al antecedente vacunal) |
| | Embarazadas, Personal de Salud, enfermos crónicos desde 6 meses en adelante, adultos de 65 años y más, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas con discapacidad. | Influenza Estacional Triv. Adulto |
|  | • Niños de 6 meses a 4 años sin vacunación previa • Personas de 5 años o más sin vacunación previa<br>• Personas mayores de 65 años sin vacunación previa. | COVID***** |

* Actualización Pentavalente por Hexavalente.

** Actualización Neumococo 10 por Neumococo 13.

*** Actualización HPV, incluye a niñas y niños de 9 años.

**** La vacuna Tdap se incorpora al Esquema Nacional de Vacunación y está dirigida a mujeres embarazadas. Se colocará una dosis en cada embarazo.

***** Inclusión de la vacunación COVID-19, al esquema regular

EL NUEVO ECUADOR IMPULSA
Ministerio de Salud Pública