

Introducción

Para poder entender cada uno de los siguientes ejercicios es necesario conocer que es una función compleja.

Una función compleja es una función que está definida para los números complejos en algún conjunto S y toma valores complejos.

Si \mathbb{C} denota al conjunto de los números complejos, y f es tal función, entonces tenemos que:

$$f : S \rightarrow \mathbb{C}.$$

Esto significa que $f(z)$ es un número complejo para cada z en S .

El conjunto S es conocido como el dominio de la función.

Los siguientes ejercicios fueron consultados del libro *Matemáticas avanzadas para ingeniería*[1] con fines educativos.

Esta es la referencia pero no recuerdo como hacerlo en latex :D [1]Peter V. O'Neil. (2005). *Matemáticas avanzadas para ingeniería*, 5ta Edición. México: Litográfica Ingramex.

Capítulo 9 Funciones Complejas

Sección 9.1 Limites, continuidad, derivadas

Problemas Sección 9.1

En cada problema del 1 al 16, encuentre u y v de manera que $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, determine todos los puntos (si los hay) en donde las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen, y determine todos los puntos en donde la función es diferenciable. Se pueden suponer todos los resultados familiares de la continuidad de funciones reales de dos variables.

1. $f(z) = z - i$

Solución.

$$f(z) = x + iy - i$$

$$f(z) = x + i(y - 1)$$

$$u = x \quad v = y - 1$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = 1 = v_y$$

$$u_y = 0 = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann se satisfacen $\forall z \in \mathbb{C}$

Al cumplirse las condiciones de C-R la función es diferenciable en todo punto.

2. $f(z) = |z|$

Solución.

$$f(z) = |x + iy|$$

$$f(z) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$u = \sqrt{x^2 + y^2} \quad v = 0$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}(2x) \neq 0 = v_y$$

$$u_y = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}(2y) \neq 0 = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en ningún punto

Al no cumplirse las condiciones de C-R la función no es diferenciable en ningún punto.

3. $f(z) = i|z|^2$ Solución.

$$f(z) = i(\sqrt{x^2 + y^2})^2$$

$$f(z) = i(x^2 + y^2)$$

$$u = 0 \quad v = x^2 + y^2$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = 0 \neq 2y = v_y$$

$$u_y = 0 \neq -2x = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann solo se satisfacen si $x=0$, $y=0$

Al no cumplirse las condiciones de C-R $\forall z \in \mathbb{C}$ y no ser analítica, la función no es diferenciable en ningún punto.

4. $f(z) = \frac{z}{\operatorname{Re}(z)}$

Solución.

$$f(z) = \frac{x+iy}{x}$$

$$u = 1 \quad v = \frac{y}{x}$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = 0 \neq \frac{1}{x} = v_y$$

$$u_y = 0 \neq \frac{y}{x^2} = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en ningún punto.

Al no cumplirse las condiciones de C-R la función no es diferenciable en ningún punto.

5. $f(z) = \bar{z}^2$

Solución.

$$f(z) = (x - iy)^2$$

$$f(z) = x^2 - 2ixy - y^2$$

$$u = x^2 - y^2 \quad v = -2xy$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = 2x \neq -2x = v_y$$

$$u_y = -2y \neq 2y = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann solo se satisfacen si $x=0, y=0$.

Al no cumplirse las condiciones de C-R $\forall z \in \mathbb{C}$ y no ser analítica, la función no es diferenciable en ningún punto.

6. $f(z) = -4z + \frac{1}{z}$

Solución.

$$f(z) = -4(x + iy) + \frac{1}{x+iy} \left(\frac{x-iy}{x-iy} \right)$$

$$f(z) = -4x - 4iy + \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{iy}{x^2+y^2}$$

$$u = -4x + \frac{x}{x^2+y^2} \quad v = -4y - \frac{y}{x^2+y^2}$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = -4 + \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = -4 + \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = -4 - \frac{x^2+y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} = v_y$$

$$u_y = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann se satisfacen $\forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$

Al cumplirse las condiciones de C-R $\forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$, la función es diferenciable $\forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$.

7. $f(z) = \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z)$ Solución

$$f(z) = x - y$$

$$u = x - y \quad v = 0$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = 1 \neq 0 = v_y$$

$$u_y = -1 \neq 0 = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en ningún punto.

Al no cumplirse las condiciones de C-R en ningún punto, la función no es diferenciable en ningún punto.

8. $f(z) = \operatorname{Im}\left(\frac{2z}{z+1}\right)$

Solución

$$\frac{2z}{z+1} = \frac{2(x+iy)}{x+iy+1} = \frac{2x+2iy}{(x+1)+iy} \cdot \frac{(x+1)-iy}{(x+1)-iy} = \frac{(2x+2iy)((x+1)-iy)}{(x+1)^2+y^2} = \frac{2x(x+1)-2ixy+2iy(x+1)+2y^2}{(x+1)^2+y^2}$$

$$f(z) = \operatorname{Im}\left(\frac{2x(x+1)-2ixy+2iy(x+1)+2y^2}{(x+1)^2+y^2}\right)$$

$$f(z) = \frac{-2xy+2xy+2y}{(x+1)^2+y^2}$$

$$f(z) = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}$$

$$u = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2} \quad v = 0$$

Condiciones de Cauchy-Riemann.

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

$$u_x = \frac{-2y(2)(x+1)}{((x+1)^2+y^2)^2} = \frac{-4xy-4y}{((x+1)^2+y^2)^2} \neq 0 = v_y$$

$$u_y = \frac{(2)((x+1)^2+y^2)-(2y)(2y)}{((x+1)^2+y^2)^2} = \frac{2x^2+4x+2+2y^2-4y^2}{((x+1)^2+y^2)^2} = \frac{2x^2+4x-2y^2+2}{((x+1)^2+y^2)^2} \neq 0 = -v_x$$

Las condiciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en ningún punto.

Al no cumplirse las condiciones de C-R la función no es diferenciable en ningún punto.

Sección 9.2 Series de potencias

Problemas Sección 9.2

En cada uno de los problemas, determine el radio de convergencia y el disco abierto de convergencia de la serie de potencias.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} (z+3i)^n$

Solución

Por el criterio del cociente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+2}{2^{n+1}} (z+3i)^{n+1}}{\frac{n+1}{2^n} (z+3i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n(n+2)}{2^{n+1}(n+1)} (z+3i) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{2(n+1)} (z+3i) \right| = \frac{1}{2} |z+3i|$$

Para que la serie sea convergente.

$$\frac{1}{2} |z+3i| < 1$$

De esta manera. $|z+3i| < 2$

Por lo tanto el disco abierto de convergencia es $|z+3i| < 2$ y el $R=2$.

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} (z-1+3i)^n$$

Solución

$$\frac{n^n}{(n+1)^n} (z-1+3i)^n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n (z-1+3i)^n = \left(\left(\frac{n}{n+1}\right)(z-1+3i)\right)^n$$

Por el criterio de la raíz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)(z-1+3i)\right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{n}{n+1}(z-1+3i)\right| = |z-1+3i|$$

Para que la serie sea convergente.

$|z-1+3i| < 1$ Por lo tanto el disco abierto de convergencia es $|z-1+3i| < 1$ y el $R=1$.

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{2^{n+1}} (z+8i)^n \text{ Solución}$$

Por el criterio del cociente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{i^{n+1}}{2^{n+2}} (z+8i)^{n+1}}{\frac{i^n}{2^{n+1}} (z+8i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{i^{n+1}(2^{n+1})}{i^n 2^{n+2}} (z+8i) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{i}{2} (z+8i) \right| = \frac{|i|}{2} |z+8i| = \frac{1}{2} |z+8i|$$

Para que la serie sea convergente.

$$\frac{1}{2} |z+8i| < 1$$

De esta manera. $|z+8i| < 2$

Por lo tanto el disco abierto de convergencia es $|z+8i| < 2$ y el $R=2$.

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n+1}} (z+6+2i)^n \text{ Solución}$$

Por el criterio del cociente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^2}{2^{(n+1)+1}} (z+6+2i)^{n+1}}{\frac{n^2}{2^{n+1}} (z+6+2i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+1)(n^2+2n+1)}{(n^2)(2n+3)} (z+6+2i) \right| =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n^3+5n^2+4n+1}{2n^3+3n^2} (z+6+2i) \right| = |z+6+2i|$$

Para que la serie sea convergente.

$$|z+6+2i| < 1$$

Por lo tanto el disco abierto de convergencia es $|z+6+2i| < 1$ y el $R=1$.

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{in}}{2^{n+1}} (z+4)^n \text{ Solución}$$

Por el criterio del cociente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{e^{i(n+1)}}{2^{(n+1)+1}} (z+4)^{n+1}}{\frac{e^{in}}{2^{n+1}} (z+4)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(e^{in+i})(2^{n+1})}{(e^{in})(2^{n+3})} (z+4) \right| =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^i(2^{n+1})}{2^{n+3}} (z+4) \right| = |z+4|$$

Para que la serie sea convergente.

$$|z+4| < 1$$

Por lo tanto el disco abierto de convergencia es $|z + 4| < 1$ y el $R=1$.

6. ¿Es posible que $\sum c_n(z - 2i)^n$ converja en 0 y diverja en i ?

Solución

No, debido a que i está más cerca de $2i$ que 0, por lo que si converge en 0 entonces debe de converger en i .

7. Suponga $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ tiene radio de convergencia R y $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^* z^n$ tiene radio de convergencia R^* .

¿Qué se puede decir acerca del radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n + c_n^*) z^n$?

Solución.

El radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n + c_n^*) z^n$ es al menos tan grande como R o al menos tan grande como R^* .

8. Considere $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, donde $c_n = 2$ si n es par y $c_n = 1$ si n es impar. Pruebe que el radio de convergencia de esta serie de potencias es 1, pero que este número no se puede calcular usando el criterio de la razón. (Esto significa simplemente que no siempre se puede usar este criterio para determinar el radio de convergencia de una serie de potencias.)

Solución

Por el Criterio de la razón tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = 2$ si n es par y que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{2}$ si n es impar, por lo tanto el límite no existe.

Sin embargo por el criterio de la raíz tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = |c_n|^0 = 1$, de manera que el radio de convergencia es 1 por el criterio de la raíz n -ésima.