

Cuidados en casa después de una mastectomía

Guía para la paciente · Documento de DEMOSTRACIÓN

Cuidado del drenaje

Es normal salir del hospital con uno o dos drenajes. Anote todos los días cuánto líquido salió y de qué color era.

El drenaje se retira cuando el débito es menor a treinta mililitros en veinticuatro horas durante dos días seguidos.

Vacíe el recipiente dos veces al día y lávese las manos antes y después.

Consulte si el líquido se vuelve espeso, con mal olor o cambia a un color amarillo verdoso: puede indicar infección.

Cuidado de la herida

Mantenga la herida limpia y seca durante las primeras cuarenta y ocho horas. Después puede ducharse dejando correr el agua sin frotar.

No sumerja la herida en tina, piscina ni mar hasta el control médico.

Un enrojecimiento leve en el borde es esperable los primeros días.

Consulte el mismo día si aparece enrojecimiento que se extiende, calor en la zona, hinchazón que aumenta o cualquier secreción.

Movimiento del brazo

Empiece a mover el hombro a las cuarenta y ocho horas, con ejercicios suaves y sin forzar. Detenga cualquier movimiento que duela.

No levante peso mayor a dos kilos con el brazo del lado operado durante las primeras cuatro semanas.

Evite tomar la presión arterial, aplicar inyecciones o sacar sangre del brazo del lado operado.

Linfedema: qué vigilar

Si le retiraron ganglios de la axila, existe riesgo de linfedema.

Consulte si nota el brazo, la mano o los dedos hinchados, con sensación de pesadez, o si la ropa y los anillos le quedan más apretados.

Proteja el brazo de cortes y quemaduras: use guantes al cocinar y al trabajar en el jardín.

Cuándo llamar de inmediato

Fiebre de treinta y ocho grados o más.

Escalofríos con sensación de malestar general.

Secreción con mal olor o de aspecto purulento en la herida.

Enrojecimiento que se extiende más allá del borde de la herida.

Dolor que aumenta en vez de disminuir con el paso de los días.

Sangrado que empapa el apósito.

Alimentación y ánimo

No hay una dieta especial después de una mastectomía. Coma variado, con suficiente proteína, y tome líquidos.

Es frecuente sentirse triste o ansiosa las primeras semanas. Coméntelo en el control: hace parte de la recuperación y tiene apoyo disponible.