

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计 (A卷) 2012年6月17日

系别：_____ 班号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、填空题 (30分)

1. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率是 $1/9$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) =$ _____。
2. 随机的选一个点将一个区间分成两部分。则长区间至少为短区间的3倍的概率为_____。
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布, 则 $P(\min\{X, Y\} < 1) =$ _____。
4. 若 $X \sim N(1, 4)$, $P(X < x) = \Phi(1)$, 则 $x =$ _____。
5. 设随机变量 X 的概率密度函数为:

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ a, & 0 \leq x \leq 1; \\ a e^{-2(x-1)}, & x > 1, \end{cases}$$

则 $a =$ _____, $EX =$ _____, $Var(X) =$ _____。

6. 设随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 定义随机变量:

$$Z = g(X, Y) = \begin{cases} 1, & a < X \leq b \text{ 且 } c < Y \leq d; \\ 0, & \text{其它情况。} \end{cases}$$

则 $EZ =$ _____。

7. 设总体 X 在区间 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中 $\theta > 0$ 未知。从总体中抽取样本 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则下列统计量中不是 θ 的无偏估计的是_____。

- (A) $\hat{\theta} = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)/2$ (B) $\hat{\theta} = 2x_1 + x_2 - x_3$
(C) $\hat{\theta} = x_1 + x_2 + x_3 - x_4$ (D) $\hat{\theta} = \max\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

8. 设 x_1, x_2, \dots, x_n 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ, σ 未知。若 μ 的95%置信区间为 $[1, 3]$; 且假设检验问题

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 2$$

的显著性水平为 α 的拒绝域为 $\{|\bar{x} - 2| \geq 1.3\}$, 则 α _____ 0.05 (填 $>$ 或 $<$)。

二、(10分) 茶杯成套出售，每套五只，假设各套无次品和含一只次品的概率分别为 $4/5$ 和 $1/5$ 。一顾客在购买时，售货员随意取出一套，而顾客随机地查看其中的一只，若非次品，则买下该套，否则退回。试求：

1. 顾客买下该套的概率；
2. 在顾客买下的一套中确实无次品的概率。

三、(20分) 设 X 和 Y 具有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} 21x^2y^3 & 0 < x < y < 1; \\ 0 & \text{其它}. \end{cases}$$

1. 求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ ，并判断 X 与 Y 的独立性；
2. 条件密度函数 $p_{Y|X}(y|x)$ ；
3. 当求在给定 $X = x$ 下 Y 的条件数学期望 $E(Y|X = x)$ 。

四、(15分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布，且 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(2, 1)$ ， X 与 Y 的相关系数为 $\rho = 1/4$ 。

1. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度；
2. 若 $W = X - cY$ 与 Z 独立，求常数 c ；
3. 若条件期望 $f(z) = E(X^2 + aXY + bY^2 | Z = z)$ 不依赖于 z ，求常数 a , b 以及 $f(z)$ 的值。

五、(15分) 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布， x_1, x_2, \dots, x_n 为来自 X 的样本，

1. 求 $1/\lambda$ 的最大似然估计；
2. 验证最大似然估计与 $n \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 均为 $1/\lambda$ 的无偏估计；
3. 比较最大似然估计与 $n \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的有效性。

六、(10分) 某厂生产一种标准长度35mm的螺钉，实际生产的产品长度服从正态分布 $N(\mu, 9)$ 。做假设检验 $H_0: \mu = 35$, $H_1: \mu \neq 35$ 。拒绝域为 $W = \{|\bar{x} - 35| > 1\}$ 。

1. 当样本容量 $n=36$ 时，求犯第一类错误的概率；
2. 当样本容量 $n=36$, $\mu=36$ 时，求犯第二类错误的概率。

(注：所求概率可用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示。)