

3. Registrada en reiteradas ocasiones en la intendencia del PN Iguazú ubicada en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones durante el otoño de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5).
4. Un individuo observado por Rodrigo Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 18 de abril de 2002 (Chebez *et al.* [2004] *op. cit.*).
5. Un macho juvenil (posiblemente el mismo de la observación anterior) filmado en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 y el 29 de abril de 2002 (Chebez *et al.* [2004] *op. cit.*). La filmación no se encuentra disponible.
6. Una hembra observada por Ramiro Ramírez en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 2014 (ebird.org/checklist/S31734836).
7. Un macho adulto observado por Emiliano García Loyola en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38631553).
8. Un joven fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2020 (Castillo & Florentín [2020] *Nuestras Aves* 65: 76).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La especie al parecer frecuenta regularmente el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, Misiones (Ignacio Roesler *in litt.*).

## ■ PICAFLOR GARGANTA ESCAMADA | *Helimaster squamosus* | N R


**Distribución:** Endémica del E de Brasil, desde Pernambuco hasta São Paulo (Schuchmann [1999] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un individuo observado por Flavio Moschione en la RP Guaycolec, Formosa el 9 de enero de 1991 (F. Moschione *en Contreras et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina*. Vol. 1. *No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

2. Un ejemplar filmado y fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2009 (Castillo & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 40: 1-8).

3. Dos individuos observados por Warren Stevens en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2016 (ebird.org/checklist/S31757055).

4. Un macho fotografiado por Gustavo Puente en Gualeguaychú, departamento homónimo, Entre Ríos entre el 26 de marzo y el 30 mayo de 2020 (Puente *et al.* [2020] *Nuestras Aves* 65: 84). El ejemplar reapareció en el sitio en septiembre y diciembre del mismo año (ecoregistros.org; Figura 4).



**Figura 4.** Picaflor Garganta Escamada *Helimaster squamosus*, Gualeguaychú, Entre Ríos, 6 de diciembre de 2020 (Gustavo Puente).

**Comentarios:** Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La inclusión por parte de Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) provino de una confusión de Martín de la Peña que posteriormente corrigió mencionando que en realidad se trataba de hembras de PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* con mancha oscura en la garganta (de la Peña [2004] *Nuestras Aves* 47: 31; ver además *Heliomaster longirostris*).

## ■ PICAFLOR TIJERETA | *Eupetomena macroura* | N

**Distribución:** Ampliamente distribuida en el centro-este de Sudamérica. La subespecie nominal desde las Guayanas a través del N, centro y SE de Brasil hasta São Paulo. La subespecie *cyanoviridis* en la Serra do Mar del estado de São Paulo (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un macho observado por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones el 22 de julio de 1993 (H. Povedano en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

2. Registrada por David Stejskal y Candice Lowther en el PN Iguazú, Misiones el 12 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S52693654).

3. Un ejemplar fotografiado por Rodrigo Castillo y Silvia Vitale en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre enero y julio de 2005 (Chebez *et al.* [2006] *Hornero* 21: 49-51). El mismo fue registrado en esa localidad hasta octubre de ese año (ebird.org).

4. Un individuo observado por Ernesto Krauczuk en Piñalito Norte, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de julio de 2005 (E. Krauczuk en Straube *et al.* [2006] *Atualidades Ornitológicas* 132: 1-9; del Castillo *et al.* [2012] *Atualidades Ornitológicas* 170: 12-15).

5. Observada en reiteradas ocasiones en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre enero y octubre de 2006 (Castillo *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 68-69).

6. Un individuo observado por Scott Mills en el PN Iguazú, Misiones el 17 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S20277396).

7. Un individuo observado en reiteradas ocasiones en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre 1 y el 5 de enero de 2007 (Castillo *et al.* [2009] *op. cit.*).

8. Un individuo observado por Santiago Imberti, Hernán Casañas y un grupo de observadores en el PP Urugua-í, Misiones el 5 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S27277469).

9. Registrada en forma regular en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre agosto de 2008 y febrero de 2021 (Castillo *et al.* [2009] *op. cit.*; del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*; ebird.org; ecoregistros.org).

10. Un individuo observado por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones el 1 de mayo de 2010 (ebird.org/checklist/S23617648).

11. Un ejemplar fotografiado por Silvia Kruchowski en Garupá, departamento Capital, Misiones durante el primer semestre de 2011 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

12. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de noviembre de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=10528).

13. Un individuo observado por Rodrigo Martínez Gamba en Puerto Rico, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 24 de abril de 2012 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

14. Dos ejemplares fotografiados por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones entre el 5 y el 8 de junio de 2012 (del Castillo *et al.* [2012] *op. cit.*).

15. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Allende en Posadas, departamento Capital, Misiones el 7 de octubre de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=191025).

16. Un ejemplar fotografiado por Lucas Retamoza en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 6 de abril de 2013 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=29420).
17. Dos ejemplares fotografiados por Joel y Guillermo Martínez en Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones el 20 y 21 de junio de 2014 (ebird.org/checklist/S52594433).
18. Un ejemplar fotografiado por Horacio Dali en Campo Ramón, departamento Oberá, Misiones el 26 de diciembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=87502).
19. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en Oberá, departamento homónimo, Misiones el 7 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=212716).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Una pareja y un juvenil fotografiados en San Pedro, departamento homónimo, Misiones durante septiembre y octubre de 2015 (Bodrati *et al.* [2016] *Nuestras Aves* 61: 24). Recientemente registrada por primera vez en la provincia de Corrientes (Bernasconi *et al.* [2019] *EcoRegistros Revista* 9: 1-3).

## ■ PICAFLOR PECHO AZUL | *Chionomesa lactea* | N R

**Distribución:** La subespecie nominal en el centro y S de Brasil, desde Bahia hasta São Paulo (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de abril de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5; Anónimo [2005] *Nuestras Aves* 49: 11).

2. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 3 de julio de 2004 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5).

3. Un ejemplar filmado por Norberto Oste en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de agosto de 2004 (Güller & Oste [2011] *Nuestras Aves* 56: 12-13).

4. Registrada por Sebastián Dardanelli en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de abril de 2011 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=249566).

5-6. Dos ejemplares fotografiados por Roberto Güller en Comandante Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 21 y 23 de julio y el 25 de agosto de 2012 (Güller & Rodríguez [2013] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 130: 1-5). Los mismos permanecieron en el sitio durante la primavera de ese año, pudiendo ser registrados por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).

7. Hasta dos individuos observados diariamente por Emilio White en Puerto Libertad, departamento Iguazú, Misiones entre julio y septiembre de 2012 (E. White en Güller & Rodríguez [2013] *op. cit.*).

8. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Castaing en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 23 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=199077).

9. Un ejemplar fotografiado en forma regular en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones durante julio de 2017 (ebird.org; ecoregistros.org).

10. Un ejemplar fotografiado por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de julio de 2019. El mismo permaneció aproximadamente dos semanas en el sitio (Rodríguez *et al.* [2020] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 306: 1-4).

11. Un ejemplar fotografiado por Natalia Vreys y Fernando Cabral en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 20 de marzo de 2021 (ebird.org/checklist/S83876488).

**Taxonomía:** Anteriormente incluida en el género *Amazilia* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

■ PICAFLOR LAZULITA | *Chlorestes cyanus* | N R

**Distribución:** Ampliamente distribuida en la región amazónica. La subespecie *griseiventris* restringida a la costa de São Paulo y el NE de Argentina (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un macho colectado en Necochea, partido homónimo, Buenos Aires en enero de 1926 (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 420). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.

2. Un macho observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal a la vera del río Bermejo, departamento Orán, Salta el 15 de julio de 1988 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).

3-4. Al menos dos individuos observados por Flavio Moschione en el río Cayotal entre Trigohuaico y Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 28 y 29 de julio de 1992 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Flavio Moschione sobre el río Cayotal cerca de Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 16 de septiembre de 2007 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

6. Un ejemplar fotografiado por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 12 y 13 de enero de 2008 (A. Bodrati en de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 6: 1-348; A. Bodrati *in litt.*; Figura 5).

7. Un ejemplar hallado muerto por Carlos Cuñado y Silvia Strelkov en el abra de Lizoite, departamento Santa Victoria, Salta el 27 de octubre de 2010 (Cuñado et al. [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 95: 1-5).

8. Dos machos observados por Flavio Moschione en la confluencia de los ríos Lipeo y Bermejo, PN Baritú, Salta el 6 de septiembre de 2013 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

**Taxonomía:** Anteriormente incluida en el género *Hylocharis* (Rodríguez Mata et al. [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Las observaciones referidas a la provincia de Salta son la fuente para su inclusión en la avifauna de dicha provincia (Moschione et al. [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo). Una observación de Andrea Pigazzi en el PN Iguazú, Misiones en la década de 1980 requiere confirmación (Hernán Casañas en Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).



**Figura 5.** Picaflor Lazulita *Chlorestes cyanus*, PP de la Araucaria, Misiones, 13 de enero de 2008 (Alejandro Bodrati)



## ■ BURRITO OCELADO | *Micropygia schomburgkii* | N R

**Distribución:** La subespecie *chapmani* ocupa en forma fragmentada una extensa región del SE de Perú, N de Bolivia, centro y SE de Brasil y E de Paraguay (Taylor & Sharpe [2020] en del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

**Registros:** 1. Un individuo escuchado por Alejandro Bodrati y Martjan Lammertink en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 13 de febrero de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *Ornithology Research* 28: 185-190).

2. Un total de 18 ejemplares escuchados y algunos grabados por Alejandro Bodrati y Martjan Lammertink en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones entre el 25 y el 29 de febrero de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).

3. Cuatro individuos escuchados y grabados por Alejandro Bodrati, Néstor Fariña y Olga Villalba en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 5 de marzo de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).

4. Cinco individuos escuchados por Alejandro Bodrati y Facundo Di Sallo en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 16 de marzo de 2020 (Bodrati & Lammertink [2020] *op. cit.*).

5. Seis individuos escuchados y grabados por Alejandro Bodrati, Martjan Lammertink y Facundo Di Sallo en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 18 y 19 de agosto de 2020 (A. Bodrati y F. Di Sallo *in litt.*).

**Comentarios:** A partir de su descubrimiento en el país se sucedieron numerosos registros en la misma localidad (ebird.org), sugiriendo que por el momento la especie se encuentra establecida con éxito en la reserva Campo San Juan, Misiones.

## ■ CHORLITO MONGOL | *Charadrius mongolus* | N V

**Distribución:** Durante la época reproductiva ocupa en forma fragmentada la región oriental de Asia, desde los Himalayas hasta Siberia. Luego migra hacia las costas del océano Índico, SE de Asia y Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un adulto en plumaje nupcial fotografiado por Arnaud Le Névé en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 30 de marzo de 2011 (Le Névé & Manzione [2011] *Hornero* 26: 177-180; Figura 6).

**Taxonomía:** El ejemplar de Punta Rasa, Buenos Aires fue asignado a la subespecie *stegmanni*, que nidifica en el norte de Siberia y pasa el invierno desde China hasta Australia (Le Névé & Manzione [2011] *op. cit.*).

**Comentarios:** Este registro constituye el primero para Argentina y Sudamérica. Una especie no identificada de *Charadrius* hallada en Rio



**Figura 6.** Chorlito Mongol *Charadrius mongolus*, Punta Rasa, Buenos Aires, 30 de marzo de 2011 (Arnaud Le Névé)

Grande do Sul, Brasil probablemente pertenezca a esta especie (Franz *et al.* [2018] *Iheringia. Série Zoológica* 108: e2018005). Un ejemplar fotografiado por Renato Munarriz en la RN de Paracas, Perú el 23 de abril de 2021 (ebird.org/checklist/S86564477).

## ■ PLAYERO GIGANTE | *Numenius arquata* | N V

**Distribución:** Su área de cría comprende una amplia región del N de Europa y Asia. Durante la época no reproductiva se dispersa hacia las costas del Mediterráneo, África, el océano Índico y el SE asiático (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un ejemplar fotografiado por David Vander Pluym y John Sterling en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 27 y 28 de enero de 2010 (Vander Pluym & Sterling [2019] *Cotinga* 41: 41-43). El individuo permaneció varios días en el sitio y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org).

2. Un ejemplar fotografiado por Martín Juárez en Mar Chiquita, departamento homónimo, Buenos Aires el 11 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S53920321; Figura 7).

**Comentarios:** La observación efectuada en Punta Rasa, Buenos Aires constituye el primer registro para Sudamérica.



**Figura 7.** Playero Gigante *Numenius arquata*, Mar Chiquita, Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 (Martín Juárez)

## ■ COMBATIENTE | *Calidris pugnax* | N V

**Distribución:** Se reproduce en una amplia región al N de Asia y Europa. Posteriormente migra hacia el S ocupando principalmente el medio oriente, África e India (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un ejemplar fotografiado por Christoph Bock y Tom Noah en Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos el 9 de noviembre de 2007 (ebird.org/checklist/S76539059; Figura 8).

**Taxonomía:** Tradicionalmente en el género monotípico *Philomachus*, aunque estudios moleculares recientes lo incorporan dentro de *Calidris* (Gibson & Baker [2012] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 64: 66-72; Banks [2012] *Zootaxa* 3513: 86-88).

**Comentarios:** Para una revisión de los registros en Sudamérica ver Remsen *et al.* ([2021] *Classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union).



**Figura 8.** Combatiante *Calidris pugnax*, Ceibas, Entre Ríos, 9 de noviembre de 2007 (Christoph Bock)

## ■ PLAYERO ZARAPITÍN | *Calidris ferruginea* | N V

**Distribución:** Nidifica en un área relativamente pequeña al N de Rusia. En la época no reproductiva ocupa gran parte de África, Asia y Australia (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un ejemplar colectado por William Burnett y Robert Fitzroy en el “Este de la Patagonia”, sin fecha (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 9).

2. Un ejemplar fotografiado por Martín Toledo y Agustín Quaglia en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 17 de octubre de 2013 (Toledo *et al.* [2018] *Revista Brasileira de Ornitologia* 26: 214-216; Figura 10).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), quienes no pudieron hallar el



**Figura 9.** Playero Zarapitín *Calidris ferruginea*, NHMUK-1837.2.21.254, este de la Patagonia (The Natural History Museum)





**Figura 10.** Playero Zarapitín *Calidris ferruginea*, Mar Chiquita, Córdoba, 17 de octubre de 2013 (Martín Toledo)

especimen en el BMNH (= NHMUK). Claës Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) menciona que el ejemplar obtenido fue capturado en la costa de la provincia de Chubut.

**Especímenes (1):** NHMUK-1837.2.21.254

## ■ PLAYERITO MENOR | *Calidris minutilla* | N

**Distribución:** Nidifica en una amplia región de Norteamérica, y posteriormente migra hacia el sur llegando hasta Chile y Brasil (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un individuo observado por Alan Hemmings en Signy Island, Orcadas del Sur el 8 de diciembre de 1981. Supuestamente el mismo fue relocalizado el 26 de enero de 1982 y registrado a diario hasta el 2 de febrero del mismo año (Hemmings [1985] *British Antarctic Survey Bulletin* 69: 81-82).

2. Un ejemplar fotografiado por Juan Maceda, Federico Bruno y Daniela Acevedo en la laguna El Uncal, departamento Chalileo, La Pampa el 11 de febrero de 2007 (Maceda *et al.* [2008] *Hornero* 23: 95-98).

3. Registrada por Flavio Moschione en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en febrero de 2008 (F. Moschione en Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).

4. Registrada en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez *et al.* [2011] *Flamingo* 18: 45-47).

5. Unos 16 individuos observados por Flavio Moschione en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en febrero de 2011 (F. Moschione en Bianchini [2019] *Historia Natural. Tercera Serie* 9: 37-52).

6. Un grupo de 6 u 8 individuos observado por Flavio Moschione en los bañados del Quirquincho, departamento Rivadavia, Salta sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).

7. Un ejemplar fotografiado por Mauro Bianchini y Cynthia Arenas en la laguna de Antofagasta de la Sierra, departamento homónimo, Catamarca el 7 de marzo de 2014 (Bianchini [2019] *op. cit.*).

8. Un ejemplar fotografiado por David Vergara y Martín Toledo en la laguna Mar Chiquita, departamento



San Justo, Córdoba el 11 de noviembre de 2015 (Salvador *et al.* [2016] *Listado de Aves de la Provincia de Córdoba, Argentina*; ebird.org/checklist/S26765304).

9. Un ejemplar fotografiado por Natalia Martínez-Curci en la estancia Medaland, partido de Villa Gesell, Buenos Aires el 15 de diciembre de 2017 (Martínez-Curci *et al.* [2018] *Wader Study* 125: 1-3).

10. Un ejemplar filmado por Luis Pagano, Flavio Moschione, José Segovia, Ana Sureda y Azucena Rodríguez en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 2 de febrero de 2019 (youtube.com/watch?v=F-8L0lm3jyiw; ebird.org/checklist/S53495145).

11. Un ejemplar fotografiado por Marcos Enrique en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 31 de diciembre de 2019 (Enrique *et al.* [2020] *Nuestras Aves* 65: 20-22).

12. Un individuo observado por Flavio Moschione y otros observadores en el salar de Llullaillaco, departamento Los Andes, Salta el 11 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63420335).

13. Un ejemplar fotografiado por Horacio Luna y Martín Manassero en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 19 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63556287).

14. Un ejemplar fotografiado por Pablo Capovilla, Mauricio Schmithalter y Marcos Soria en la laguna Añapiré, departamento La Capital, Santa Fe el 29 de febrero de 2020 (Enrique *et al.* [2020] *op. cit.*). El mismo permaneció algunos días en el área y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org; Figura 11).

15. Un ejemplar fotografiado por Juan Muñoz de Toro y Maximiliani Gilli en Colastiné, departamento La Capital, Santa Fe el 20 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S73907046).

16. Un individuo observado por Flavio Moschione, Ana Sureda, Carina Rodríguez y Walter Arias en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 14 de octubre de 2021 (ebird.org/checklist/S96542130).

17. Un ejemplar fotografiado por Horacio Luna, Camilo García y otros observadores en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 8 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98642261).

18. Un individuo observado por Flavio Moschione, Ana Sureda, María Eugenia Juez y Nicolás Rodri-



**Figura 11.** Playerito Menor *Calidris minutilla*, laguna Añapiré, Santa Fe, 1 de marzo de 2020 (Andrés Terán)

guez Montuelle en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 6 de febrero de 2022 (ebird.org/checklist/S104192494).

19. Un ejemplar fotografiado por Carlos Merlo y Carlos Cabrera en los Piletos de Paramillos, departamento Lavalle, Mendoza el 13 de abril de 2022 (ebird.org/checklist/S107012441).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Es un visitante regular en el MN Laguna de los Pozuelos y cuencas vecinas (ríos Miraflores y Doncellas), departamento Cochínoca, Jujuy (Flavio Moschione *com. pers.*). Un individuo observado en la Bahía de Asunción, Paraguay el 5 de enero 1989 (Hayes *et al.* [1990] *Condor* 92: 947-960) es un registro que podría considerarse limítrofe y fue incluido por Contreras *et al.* ([2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara). Las fotografías presentadas para la provincia de Corrientes (Colina & Kohan [2020] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 308: 1-4), en realidad corresponden al PLAYERITO PECTORAL *Calidris melanotos*.

## ■ BECASINA GIGANTE | *Gallinago undulata* | N R

**Distribución:** Fragmentada distribución en Sudamérica. La subespecie *gigantea* en el SE de Brasil y E de Paraguay (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1-2. Dos ejemplares obtenidos por L. Hardy du Dréssent en “Buenos Ayres” en abril de 1886 (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London; Hellmayr & Conover [1948] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series. Volume XIII. Part I*). Los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK (Figura 12).

3. Un ejemplar colectado por Charles Perrins en “Argentina” en febrero de 1896, e ingresado a la colección del NHMUK como obtenido en San José de los Arroyos (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

4-5. Mencionada para las provincias de Chaco y Buenos Aires por Santiago Venturi, quien aparentemente no colectó ningún ejemplar (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Lynch Arribálzaga [1920] *Homero* 2: 85-98; Hellmayr & Conover [1948] *op. cit.*).

6. Incluida por José Pereyra para el noreste de la provincia de Buenos Aires mediante comentarios de terceros (Pereyra [1938] *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 9: 6-305).

7. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).



**Figura 12.** Becasina Gigante *Gallinago undulata*, NHMUK-1896.1.1.5, Buenos Aires, abril de 1886 (The Natural History Museum)

8. Un individuo escuchado por Hernán Casañas y Adrián Di Giacomo unos 20 km al este de Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, Corrientes en octubre de 2003 (H. Casañas y A. Di Giacomo en López-Lanús & Moller Jensen [2012] *Hornero* 27: 189-193).

9-10. Al menos dos parejas grabadas por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes entre el 24 y el 27 de junio de 2009 (López-Lanús & Moller Jensen [2012] *op. cit.*; López-Lanús [2010] *Sonidos de aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).

11. Un ejemplar grabado por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de febrero de 2011 (López-Lanús & Moller Jensen [2012] *op. cit.*).

12. Tres individuos registrados por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 19 de julio de 2011 (López-Lanús et al. [2013] en Marino et al. [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).

13. Hasta tres ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 4 de diciembre de 2013 (López-Lanús et al. [2013] *op. cit.*).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Richard Wace ([1921] *Hornero* 2: 194-204) la menciona para las islas Malvinas con el nombre de *Gallinago gigantea*, y comenta que algunos ejemplares fueron colectados y depositados en la colección de aves de Puerto Stanley. Con respecto a la cita de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267), quienes mencionan dichas localidades para la BECASINA DE BAÑADO *Gallinago paraguayae*.

Claës Olrog ([1958] *Acta Zoológica Lilloana* 16: 83-90) supone que los reportes locales son confusiones con el PLAYERO ESQUIMAL *Numenius borealis*, ya que a este último los cazadores lo denominaban “becasina grande” o “becasina doble”. Había sido mencionada como fotografiada en Río Grande, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 24 de octubre de 1974 (Abramson [1977] *Auk* 94: 357). Las imágenes depositadas en el United States Geological Survey corresponden a la BECASINA PATAGÓNICA *Gallinago magellanica* (Figura 13).

**Especímenes (3):** NHMUK-1896.1.1.4, NHMUK-1896.1.1.5, NHMUK-1896.7.3.2

## ■ BECASINA PATAGÓNICA | *Gallinago magellanica* | N (CT)

**Distribución:** Desde el centro de Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

**Taxonomía:** Descripta por Phillip Parker King ([1828] *Zoological Journal* 4: 91-105) con material proveniente del estrecho de Magallanes, Chile. Considerada por mucho tiempo una subespecie de la BECASINA DE BAÑADO *Gallinago paraguayae*. Miller et al. ([2020] *Ibis* 162: 968-990) demuestran que la subespecie *magellanica* merece ser elevada a rango específico debido a diferencias en las vocalizaciones y los despliegues aéreos. Esta propuesta fue aceptada por el SACC ([museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop843.htm](http://museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop843.htm)).

**Comentarios:** Esta forma se conoce desde hace mucho tiempo en territorio argentino, especialmente en la región austral y las islas Malvinas (Doering [1881] *Informe Oficial de la Comisión Científica Agregada*



**Figura 13.** Becasina Patagónica *Gallinago magellanica*, Río Grande, Tierra del Fuego, 24 de octubre de 1974 (United States Geological Survey)



al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro. Buenos Aires; Sclater & Hudson [1889] *Argentine Ornithology*. Vol. 2. RH Porton; Oustalet [1891] *Mission scientifique du Cap Horn*. 1882-1883. Tome VI. Première Partie; Scott & Sharpe [1904] *Reports of The Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899*. Volume II; Brooks [1917] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 61 [7]: 135-160; Wace [1921] *Hornero* 2: 194-204; Reynolds [1934] *Hornero* 5: 339-353).

## ■ FALAROPO PICO FINO | *Phalaropus lobatus* | N V

**Distribución:** Nidificante circumpolar en el extremo norte de las regiones Neártica y Paleártica. Luego de la etapa reproductiva se dispersa por los océanos Pacífico e Índico (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).


**Registros:** 1-2. Roberto Dabbene ([1920] *Hornero* 2: 99-128) menciona dos especímenes depositados en el MACN, uno procedente de Chaco con fecha de marzo de 1899 y otro de Patagonia sin fecha. Ambos especímenes parecen estar perdidos en la actualidad.

3. Mencionada por Ángel Zotta y Secundino da Fonseca ([1936] *Hornero* 6: 343-364) para la provincia de Buenos Aires. Al parecer estos autores intercambiaron las localidades de esta especie con las del FALAROPO PICO GRUESO *Phalaropus fulicarius*.

4. Incluida para la avifauna de la provincia de La Pampa, sin detalles (Orrego Aravena [1969] *Vertebrados de La Pampa*. Biblioteca Pampeana. Serie Folletos N°13).

5. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).

6. Un ejemplar fotografiado por Aníbal Casas y Mariano Gelain en el río Ñirihuau, Río Negro el 1 de



**Figura 14.** Falaropo Pico Fino *Phalaropus lobatus*, Plottier, Neuquén, 21 de abril de 2019 (Manuel Battistella)

febrero de 1986 (Casas & Gelain [1986] *Nuestras Aves* 11: 6-7). La imagen obtenida no es suficiente para identificarla con certeza (Christie *et al.* [2004] *Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía*. LOLA).

7. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).

8. Un individuo observado por Leonardo Pastorino, Samuel Narosky y otros observadores en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires en junio de 1988 (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).

9. Un individuo observado por Martín de la Peña a unos 4 km de Las Leñas, departamento Malargüe, Mendoza el 13 de octubre de 2004 (Sosa *et al.* [2006] *Xolmis* 1: 7-8).

10. Un individuo observado por Mariano Gelain y Daniel Pandini en el lago Nahuel Huapi, departamento Bariloche, Río Negro el 14 de octubre de 2004 (Sosa *et al.* [2006] *op. cit.*).

11. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).

12. Un ejemplar fotografiado por Cecilia de Larminat en la laguna La Solitaria, departamento Zapala, Neuquén el 4 de mayo de 2018 (Anónimo [2020] *Aves Argentinas* 59: 9; ebird.org/checklist/S45490519). El ave permaneció al menos tres días en dicha localidad (C. de Larminat *in litt.*).

13. Un ejemplar fotografiado por Manuel Battistella cerca de Plottier, departamento Confluencia, Neuquén el 21 de abril de 2019 (ebird.org/checklist/S55515853; Figura 14).

14. Un ejemplar fotografiado por Cecilia de Larminat en la estancia La Portaña ubicada al este de Las Lajas, departamento Picunches, Neuquén el 31 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S69962386). El ave volvió a ser registrada en el sitio el 7 y 11 de junio de 2020 (C. de Larminat *in litt.*; ebird.org).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Existían fotografías sin publicar provenientes del PP Aconcagua, Mendoza en enero de 1995 (Sosa [1995] *Boletín de la Fundación Cullunche* 23: 6) y la RP Villavicencio, Mendoza en diciembre de 2001 (Sosa *et al.* [2006] *op. cit.*). Las imágenes de ambos ejemplares aportadas por Heber Sosa (*in litt.*) resultan ser adultos de *Phalaropus fulicarius* en plumaje de invierno (Figuras 15-16). La observación realizada por Pablo Petracci en el PP Laguna Tromen, Neuquén (P. Petracci *in Mazar Barnett & Pearman* [2001] *op. cit.*) fue retractada por el mismo autor concluyendo que se trataba de *Phalaropus fulicarius* (P. Petracci *in litt.*). Mariano Gelain ([2013] *Xolmis* 24: 1-3) menciona la observación de cuatro individuos en el departamento Angaco, San Juan el 1 de febrero de 2012. Las fotos del artículo muestran claramente un pequeño grupo de PITOTOY CHICO *Tringa flavipes*.



**Figura 15.** Falaropo Pico Grueso *Phalaropus fulicarius*, PP Aconcagua, Mendoza, enero de 1995 (Luis Arias)



**Figura 16.** Falaropo Pico Grueso *Phalaropus fulicarius*, RP Villavicencio, Mendoza, diciembre de 2001 (Celso Bucolini)

■ GAVIOTA DE SABINE | *Xema sabini* | N V

**Distribución:** Especie de distribución holártica. En América cría en Alaska, costa e islas del archipiélago canadiense y Groenlandia. Luego de la etapa reproductiva la población americana migra a través del Pacífico hasta las costas de Perú y Chile, así como también hasta la corriente de Benguela en el S de África (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Zanoletti y otros observadores en Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires el 1 de abril de 2021 (Loredo *et al.* [2021] *Nuestras Aves* 66: 65-67). El mismo fue relocalizado por Sebastián Lescano en Mar Azul, partido de Villa Gesell, Buenos Aires el 26, 29 y 30 de abril de 2021 (S. Lescano *in litt.*; Figura 17).

**Comentarios:** El ejemplar permaneció varios días en Mar Azul, Buenos Aires y pudo ser documentado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org). El registro efectuado al sur de Tierra del Fuego (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides) pertenece al territorio chileno. Un ejemplar fotografiado por Carlos de Souza Carvalho en Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, Brasil el 16 de noviembre de 2009 (Parrini & Carvalho [2009] *Atualidades Ornitológicas* 151: 53).



**Figura 17.** Gaviota de Sabine *Xema sabini*, Mar Azul, Buenos Aires, 26 de abril de 2021 (Sebastián Lescano)

■ GAVIOTA GARUMA | *Leucophaeus modestus* | N V

**Distribución:** Cría en el desierto de Atacama al N de Chile. Fuera de la etapa reproductiva se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico, desde Colombia hasta el centro de Chile (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un individuo observado durante tres semanas en Puerto Stanley, islas Malvinas durante agosto de 1953 (Cawkell & Hamilton [1961] *Ibis* 103A: 1-27).

2. Un individuo permaneció al menos tres semanas en Puerto Stanley, islas Malvinas en junio de 1991 (Henry [1995] *Cotinga* 4: 68).



**Figura 18.** Gaviota Garuma *Leucophaeus modestus*, Tolar Grande, Salta, 7 de marzo de 2015 (Santiago Carrillo)



3. Un juvenil fotografiado por Santiago Carrillo en Tolar Grande, departamento Los Andes, Salta el 7 de marzo de 2015 (Carrillo [2015] *EcoRegistros Revista* 5: 10-11; Figura 18).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

## ■ GAVIOTA REIDORA | *Leucophaeus atricilla* | N V

**Distribución:** Ampliamente distribuida en regiones cálidas de las Américas. Existen registros erráticos en Europa, O de África, Japón y Australia (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

**Registros:** 1. Un individuo observado por Luis Pagano en el puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires 31 de diciembre de 2008 (Pagano & Bodrati *en prep.*). El ejemplar fue comparado directamente con otras cuatro especies de gaviotas, mostrando proporciones distintas que aseguran su identificación (L. Pagano *obs. pers.*).

2. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Nazareno Yunes Del Carlo, Alejandro Sandoval y Jorge Torres en el dique La Ciénaga, departamento El Carmen, Jujuy el 2 de abril de 2022 (ebird.org/checklist/S106065358; Figura 19). El ave permaneció en el sitio al menos hasta el 15 de abril, fecha en la que fue fotografiada por Gustavo Arévalos (ecoregistros.org).

**Comentarios:** Algunos de los registros más cercanos a nuestro país provienen de Cidreira, Rio Grande do Sul, Brasil (Franz *et al.* [2018] *Iheringia. Série Zoologia* 108: 1-38); bahía de Asunción, departamento Central, Paraguay (Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitologia* 25: 128-136); Piriápolis, departamen-



**Figura 19.** Gaviota Reidora *Leucophaeus atricilla*, dique La Ciénaga, Jujuy, 2 de abril de 2022 (Jorge Omar Torres)

to Maldonado, Uruguay (ebird.org/checklist/S84717513) y laguna Guapilo, departamento Santa Cruz, Bolivia (Brady *et al.* [2019] *Cotinga* 41: 98-100).

## ■ GAVIOTÍN CORONA BLANCA | *Anous minutus* | N V

**Distribución:** Regiones tropicales de los océanos Atlántico y Pacífico. La subespecie *atlanticus* en islas del océano Atlántico hasta el golfo de Guinea (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un ejemplar colectado en las islas Malvinas (sin datos de fecha ni colector) fue adquirido por Thomas Wilson al comprar la colección del duque de Rivoli aproximadamente en el año 1846 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el ANSP (Figura 20).

2. Un ejemplar colectado por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas en Octubre de 1966 (Woods [2017] *op. cit.*). El mismo había sido publicado como proveniente de “Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen, Oktober 1966” (Kinzelbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016. Zoologische Sammlung der Universität Rostock*. Basilikenpresse). El espécimen (ZSRO-1291) actualmente posee la leyenda “SO - Pazifik”, lo que sugiere una proveniencia diferente.

**Comentarios:** Considerada errónea para las islas Malvinas por Woods ([2017] *op. cit.*). Si bien la exacta proveniencia del espécimen depositado en el ANSP podría resultar dudosa, optamos por incluir la especie respetando los datos originales. Existen reportes modernos para la costa del estado de São Paulo, Brasil (Barbieri *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 242-244).

**Especímenes (1):** ANSP-5024



**Figura 20.** Gaviotín Corona Blanca *Anous minutus*, ANSP-5024, islas Malvinas (The Academy of Natural Sciences of Drexel University)

## ■ GAVIOTÍN SOMBRÍO | *Onychoprion fuscatus* | N V

**Distribución:** Especie politípica ampliamente distribuida en los mares tropicales del mundo. La subespecie nominal en el golfo de México y el océano Atlántico (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un ejemplar adulto colectado por Jean Quoy y Joseph Gaimard en las islas Malvinas en el año 1820 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN (Figura 21).

**Taxonomía:** Conocida anteriormente como *Sterna fuscata* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Robin Woods

([2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC) la incluye como vagante para las islas Malvinas. Es probable que las menciones referidas a estas islas provengan del espécimen depositado en el MNHN (American Ornithologists' Union [1910] *Check-List of North American Birds. Third Edition*. New York; Dabbene [1918] *Homero* 1: 129-139; Ridgway [1919] *Bulletin of the United States National Museum*. Volume 50. Part 8). Además Robert Ridgway ([1919] *op. cit.*) menciona una hembra colectada en "Torugas, Argentina", cuyo espécimen aparentemente se encuentra perdido (Christopher Milensky *in litt.*).

**Especímenes (1):** MNHN-ZO-MO-14650



**Figura 21.** Gaviotín Sombrio *Onychoprion fuscatus*, MNHN-ZO-MO-14650, islas Malvinas, año 1820 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)

## ■ GAVIOTÍN ALA BLANCA | *Chlidonias leucopterus* | N V

**Distribución:** Amplia distribución en la región Paleártica, desde el centro de Europa hasta el NE de China. Luego de la reproducción migra al S ocupando gran parte de África, SE de Asia y Australia (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

**Registros:** 1. Un ejemplar fotografiado por Edelweiss Enggist, Héctor Fernández, David Juszczuk, Héctor Schreiber y Mercedes Vivero en Cancha Larga, departamento Bermejo, Chaco durante abril de 2018 (ebird.org/checklist/S45047124; Figura 22)

2. Un ejemplar en plumaje nupcial fotografiado por Hugo Giraudo en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 6 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49085884).

3. Un ejemplar en plumaje nupcial fotografiado por Martín Meurzet en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 28 de septiembre de 2019 (ebird.org/checklist/S60248418; Figura 23).

4. Un ejemplar fotografiado y filmado por Emiliano García Loyola en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 17 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95268008).

**Taxonomía:** Además de las múltiples guías de campo, para una discusión sobre identificación del género ver Alström ([1989] *British Birds* 82: 296-319).



**Comentarios:** Recientemente incorporada para Sudamérica en base a un registro fotográfico en Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brasil (Aldabe *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 261-262). Algunas observaciones sin evidencia podrían corresponder al GAVIOTÍN NEGRO *Chlidonias niger*. El GAVIOTÍN CARA BLANCA *Chlidonias hybridus* ha sido fotografiado recientemente en Paraguay (Clay [2016] *Neotropical Birding* 19: 56-58; Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitologia* 25: 128-136), por lo tanto no debe ser descartado a la hora de identificar estas confusas especies.



**Figura 22.** Gaviotín Ala Blanca *Chlidonias leucopterus*, Cancha Larga, Chaco, 2 de abril de 2018 (Héctor Fernández)



**Figura 23.** Gaviotín Ala Blanca *Chlidonias leucopterus*, Mar Chiquita, Córdoba, 28 de septiembre de 2019 (Martín Meurzet)

## ■ PINGÜINO DE TRISTÁN | *Eudyptes moseleyi* | N V

**Distribución:** Reproduce en las islas Tristan da Cunha y Gough en el océano Atlántico sur, y en la islas Amsterdam y Saint Paul del océano Índico (Cuthbert [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

**Registros:** 1. Un adulto fotografiado por Mike Morrison en MacBride Head, islas Malvinas el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1995 (Woods & Woods [1997] *Atlas of breeding birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson; Matias *et al.* [2009] *Marine Ornithology* 37: 287-289).

2. Un adulto observado por Mike Morrison en MacBride Head, islas Malvinas el 30 de noviembre de 1996 (Woods & Woods [1997] *op. cit.*; Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

3. Un ejemplar observado y fotografiado por Rafael Matias y Paulo Cattri en New Island, islas Malvinas el 21, 27 y 29 de noviembre de 2004 (Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

4. Un adulto observado por Mark Pearman y otros observadores en Kidney Island, islas Malvinas el 12 de diciembre de 2004 (Matias *et al.* [2009] *op. cit.*).

5. Registrada por Peter Alexander al noroeste de la isla Livingston, Península Antártica el 25 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S57673974).

6. Un ejemplar registrado en Diamond Cove, islas Malvinas en todas las temporadas reproductivas desde el año 2009 al 2014. En esa última temporada se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aunque el pichón fue hallado muerto en diciembre de ese año (Crofts & Robson [2015] *Seabird* 28: 37-42; ebird.org/checklist/S45577527).

7. Un individuo observado por Klemens Pütz en Beauchêne Island, islas Malvinas el 27 de noviembre de 2011 (Morrison & Henry [2012] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 16: 6-9; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).

8. Un ejemplar fotografiado en Murrel Farm Camp, islas Malvinas en octubre de 2013 y enero de 2014

(Morrison [2014] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2013*. Falklands Conservation; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).

9. Un individuo observado en Murrel Farm Camp, islas Malvinas en noviembre y diciembre de 2014 (Morrison [2015] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2014*. Falklands Conservation; Crofts & Robson [2015] *op. cit.*).

10. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Eagle Point, islas Malvinas el 31 de diciembre de 2014 (Morrison [2015] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S49371785).

11. Un ejemplar fotografiado por Fernando Riera en el faro Segunda Barranca de la bahía San Blas, partido de Patagones, Buenos Aires el 12 de octubre de 2017 (F. Riera *in litt.*; Figura 24). La identificación fue confirmada por Colin Miskelly (*in litt.*).

12. Un ejemplar fotografiado por Mark Conboy y Grant Humphries en Volunteer Point, islas Malvinas el 19 de enero de 2018 (ebird.org/checklist/S42535118).

13. Un ejemplar fotografiado por Marco Valentini en Kidney's Cove, islas Malvinas el 20 de enero de 2018 (ebird.org/checklist/S62888435).

14. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Murrel Farm Camp, islas Malvinas el 8 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61273479).


15. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry en Murrel Farm Camp, islas Malvinas el 25 de octubre de 2020 (ebird.org/checklist/S75393415). Casi con seguridad el mismo ejemplar fue observado en el sitio en enero y marzo de 2021 (ebird.org).

16. Un ejemplar observado por David Carter en Kidney's Cove, islas Malvinas el 31 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S78435733). Muy probablemente el mismo ejemplar retornó al sitio en noviembre y diciembre de 2021, siendo registrado por Ryan Hawksworth y Ryan Irvine (ebird.org).

17. Un ejemplar fotografiado por Mike Greenfelder y Linnet Tse en New Island, islas Malvinas el 7 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98601477).

**Taxonomía:** Considerada por mucho tiempo una subespecie del PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, pero la evidencia molecular sustenta su separación como especie plena (Jouventin *et al.* [2006] *Molecular Ecology* 15: 3413-3423).

**Comentarios:** Si bien la especie aparece con cierta regularidad en las islas Malvinas e intenta reproducirse allí, hasta el momento no se conoce la existencia de una pareja pura que haya nidificado con éxito en territorio argentino. Es muy probable que algunos de los reportes en estas islas correspondan al mismo ejemplar.



**Figura 24.** Pingüino de Tristán *Eudyptes moseleyi*, bahía San Blas, Buenos Aires, 12 de octubre de 2017 (Fernando Riera)



---

■ ALBATROS REAL DEL NORTE | *Diomedea sanfordi* | N (CT)

**Distribución:** Nidifica principalmente en las islas Sisters, Forty-Fours y Chatham al O de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Taxonomía:** Descrita por Robert Murphy ([1917] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 37: 861-864) en base a un espécimen colectado unas 40 millas al oeste de Corral, Chile. Adoptamos el tratamiento sugerido por Robertson & Nunn ([1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons) quienes separan a este taxón del ALBATROS REAL DEL SUR *Diomedea epomophora*.

**Comentarios:** La dificultad para identificar esta especie genera gran cantidad de reportes erróneos, no obstante existen numerosas observaciones documentadas en el mar argentino (Santiago Imberti *in litt.*).

---

■ ALBATROS DE LAS ANTÍPODAS | *Diomedea antipodensis* | N (CT) R

**Distribución:** Se reproduce exclusivamente en las islas Antípodas y Campbell al S de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Un adulto observado por Santiago Imberti entre la isla de los Estados y las islas Malvinas el 3 de diciembre de 2004 (ebird.org/checklist/S27200236).

2. Un adulto fotografiado por Rick Heil unas 60 millas al norte de la isla Smith, Península Antártica el 23 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40574389).

3. Un individuo (aparentemente el mismo de la observación anterior) observado por Rick Heil y Blair



**Figura 25.** Albatros de las Antípodas *Diomedea antipodensis*, Bird Island, Georgias del Sur, 24 de marzo de 2010 (British Antarctic Survey)

---



Nikula unas 33 millas al norte de la isla Livingston, Península Antártica el 24 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40575132).

4. Una hembra adulta fotografiada por Christian Savigny en el pasaje de Drake el 9 de diciembre de 2006 (Savigny [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 168: 1-5).

5. Un joven anillado en Nueva Zelanda fue fotografiado en Bird Island, Georgias del Sur el 24 de marzo de 2010 (Burton & Croxall [2012] *A Field Guide to the Wildlife of South Georgia*. Princeton University Press; Clarke *et al.* [2012] *British Birds* 105: 118-144; Figura 25).

6. Un macho adulto fotografiado por Christian Savigny en la desembocadura del canal de Beagle, Tierra del Fuego el 24 de marzo de 2012 (Savigny [2014] *op. cit.*).

7. Un macho adulto fotografiado por Santiago Imberti unos 350 km al sudoeste de las islas Georgias del Sur (56°37,82'S 40°43,70'W) el 5 de febrero de 2015 (S. Imberti *com. pers.*; ebird.org/checklist/S21888161).

8. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny en el pasaje de Drake el 13 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=225882).

9. Un individuo observado por Christian Savigny en el pasaje de Drake (57°12,5'S 65°12'W) el 15 de enero de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=675996).

**Taxonomía:** Descripta como una subespecie del ALBATROS ERRANTE *Diomedea exulans* (Robertson & Warham [1992] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 112: 74-81) y posteriormente elevada a rango específico (Robertson & Nunn [1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons) junto con la forma *gibsoni* que se reproduce en las islas Auckland, Nueva Zelanda. Más tarde Burg & Croxall ([2004] *Molecular Ecology* 13: 2345-2355) concluyen que *antipodensis* y *gibsoni* no difieren lo suficiente como para considerarlas especies distintas.

## ■ ALBATROS DE TRISTÁN | *Diomedea dabbenena* | N (CT) R

**Distribución:** Su área de nidificación se restringe a la islas Gough e Inaccessible, en el grupo de las islas Tristan da Cunha (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Dos adultos obtenidos a bordo del crucero *Patria* de la armada argentina, a unas 100 millas de la costa de Buenos Aires (38°30'S 56°W) el 6 de marzo de 1914. Los especímenes se utilizaron para describir el taxón *Diomedea chionoptera alexanderi* (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 311-348; Navas & Camperi [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nueva Serie* 1: 109-113). Uno de ellos se encuentra depositado en el MACN (Figura 26).

2-8. Siete observaciones realizadas por Christian Savigny y otros observadores entre el continente y las islas Malvinas en noviembre de 2002 (Savigny *et al.* [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires). Ninguna de ellas fue debidamente documentada.



**Figura 26.** Albatros de Tristán *Diomedea dabbenena*, MACN-Or-8478a, 100 millas de la costa de Buenos Aires, 6 de marzo de 1914 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

9. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny en aguas frente a Mar del Plata, Buenos Aires el 7 de abril de 2007 (Savigny [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 168: 1-5).

10. Un ejemplar filmado por Josep del Hoyo en el mar de Scotia entre las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur el 19 de abril de 2012 (ebird.org/checklist/S64820104).

11. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

**Taxonomía:** Gregory Mathews ([1929] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 50: 10-11) designó el nombre actual para el taxón descrito por Roberto Dabbene ([1926] *op. cit.*). Seguimos el actual consenso que separa este taxón del ALBATROS ERRANTE *Diomedea exulans* en base a diferencias moleculares y morfométricas (Robertson & Nunn [1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons; Cuthbert *et al.* [2003] *Waterbirds* 26: 338-344; Burg & Croxall [2004] *Molecular Ecology* 13: 2345-2355).

**Comentarios:** La dificultad para identificarlo a campo quizás sea la verdadera causa de la escasez de registros, por lo tanto es probable que sea una especie regular y subobservada en aguas argentinas (Santiago Imberti *in litt.*).

**Especímenes (1):** MACN-Or-8478a

## ■ ALBATROS DE BULLER | *Thalassarche bulleri* | N R

**Distribución:** Toda su población se reproduce en las islas Solander y Snares al S de Nueva Zelanda. Luego se dispersa por el océano Pacífico llegando a las costas de Chile y Perú (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Tres individuos observados por William Curtis al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 28 de marzo de 1987 (Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 3-8; Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 62-63).

2. Un individuo observado al norte de Orkney Island, Orcadas del Sur (59°39'S 45°49'W) el 5 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *Polar Research* 32: 18972).

3. Un adulto fotografiado por Leandro N. Chávez en Bahía Aguirre, Tierra del Fuego el 15 de diciembre de 2012 (Tamini & Chávez [2014] *Polar Biology* 37: 1209-1212; Figura 27).

**Taxonomía:** Esta especie posee una subespecie no descrita formalmente, antiguamente tratada como *Thalassarche platei*. Esta forma innominada se reproduce en las islas Sisters y Forty-Fours del archipiélago de las islas Chatham y en las islas Three Kings en el norte de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*). El ejemplar fotografiado en aguas argentinas (Tamini & Chávez [2014] *op. cit.*) pertenece a la forma nominal.

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Dos ejemplares fotografiados por Michael O'Brien cerca del cabo de Hornos, Chile el 26 de enero de 2016 (ebird.org/checklist/S27161775).



**Figura 27.** Albatros de Buller *Thalassarche bulleri*, bahía Aguirre, Tierra del Fuego, 15 de diciembre de 2012 (Leandro N. Chávez)

■ ALBATROS DE SALVIN | *Thalassarche salvini* | N (CT) R

**Distribución:** La mayor parte de la población nidifica en las islas Bounty al S de Nueva Zelanda, aunque parejas aisladas crían en otras islas cercanas y en el océano Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Un ejemplar colectado por el vapor *Undine* en la “costa de la provincia de Buenos Aires” en el año 1927 (Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 28).

2. Un ejemplar fotografiado en Bird Island, Georgias del Sur el 28 de febrero de 1982 (Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27). Aparentemente el mismo individuo fue nuevamente observado en el sitio el 16 de diciembre de 1983 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).

3. Un adulto identificado entre un total de 25 observaciones de albatros *tipo cauta*, durante un estudio realizado cerca de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero de 2001 (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).

4. Dos adultos observados en cercanías de las islas Malvinas (White *et al.* [1999] *Seabird and marine mammal dispersion in the waters around the Falkland Islands 1998-1999*. Joint Nature Conservation Committee). No queda claro si este registro tiene relación con la referencia anterior (White *et al.* [2002] *op. cit.*).

5. Un ejemplar fotografiado 29 km al este de Puerto Deseado, Santa Cruz (47°39'S 64°53'W) el 10 de marzo de 2006 (Seco Pon *et al.* [2007] *Notornis* 54: 49-51).

6. Un adulto fotografiado por Nigel Voaden en aguas antárticas del pasaje de Drake el 27 de noviembre de 2006 (ebird.org/checklist/S19991194).

7. Un ejemplar subadulto fotografiado por Rubén Dellacasa entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas (53°17'14"S 64°7'1"W) el 6 de diciembre de 2019 (Dellacasa *et al. en prep.*).

**Taxonomía:** Seguimos los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies distintas: *T. cauta*, *T. steadi*, *T. salvini* y *T. eremita*. Al igual que las otras especies del grupo, la identificación específica de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25).

**Comentarios:** Un adulto fotografiado por Christophe Gouraud en el pasaje de Drake, Chile el 6 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S65102721).

**Especímenes (1):** MACN-Or-1579a



**Figura 28.** Albatros de Salvin *Thalassarche salvini*, MACN-Or-1579a, costa de la provincia de Buenos Aires, año 1927 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)



■ PAÍÑO DE COLLAR | *Hydrobates hornbyi* | N V

**Distribución:** Restringida a la corriente de Humboldt en las costas del océano Pacífico, desde el N de Ecuador hasta el centro de Chile (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).

**Registros:** 1. Un ejemplar capturado y fotografiado por María Astete y René Gingins en San Martín de los Andes, departamento Lácar, Neuquén el 25 de abril de 2020 (Astete & Gingins [2020] *Nuestras Aves* 65: 92-93; Figura 29).

**Taxonomía:** A veces incluida dentro del género *Oceanodroma* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).

**Comentarios:** Los primeros nidos de esta especie fueron recientemente descubiertos en el desierto de Atacama, Chile (Barros *et al.* [2018] *Ardea* 106: 203-207).



**Figura 29.** Paíño de Collar *Hydrobates hornbyi*, San Martín de los Andes, Neuquén, 25 de abril de 2020 (María Astete y René Gingins)

■ PETREL ALAS GRANDES | *Pterodroma macroptera* | N

**Distribución:** Se reproduce en diversas islas de los océanos Atlántico e Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).

**Registros:** 1-3. Tres individuos observados en la zona de los 60°S 30°W el 26 de diciembre de 1959 (Novatti [1960] *Contribución del Instituto Antártico Argentino* 53: 1-19).

4. Registrada a los 40°S 57°W el 23 de abril de 1960 (Tickell & Woods [1972] *British Antarctic Survey Bulletin* 31: 63-68).

5-7. Tres individuos observados frente a la costa de Buenos Aires (39°S 57°W) en febrero de 1962 (Thurston [1982] *British Antarctic Survey Bulletin* 55: 77-103).

8-9. Dos individuos observados a los 39°21'S 56°20'W el 4 de enero de 1970 (Brown *et al.* [1975] *Ibis* 117: 339-356).

10. Registrada por B. Pearson cerca de las islas Georgias del Sur (53°44'S 36°18'W) el 10 de abril de 1977 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).

11. Registrada por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (53°10'S 43°50'W) el 22 de febrero de 1980 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).

12-20. Tres individuos observados por William Curtis a unas 200 millas de las islas Malvinas (49°S 55°W) el 19 de agosto 1982, y otros seis el 24 de agosto en la misma zona (Bourne & Curtis [1985] *Sea Swallow* 34: 18-28).

21. Registrada por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (51°21'S 37°11'W) el 22 de marzo de 1985 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).

22. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 millas al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 5 de febrero de 1990 (Gregory [1994] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 12-20).

23. Un individuo observado por William Curtis frente a la costa de Buenos Aires (39,2°S 57,3°W) el 24 de febrero de 1992 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43: 19-28).
- 24-48. Registrada 25 veces entre los 64°09'S 30°10'W y 65°12'S 25°41'W el 26 de enero de 1994 (José L. Orgeira IAA en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
- 49-50. Registrada en dos ocasiones entre los 67°59'S 26°24'W y 67°52'S 26°57'W el 13 de febrero de 1994 (José L. Orgeira IAA en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Posteriormente Montalti *et al.* ([1999] *Polish Polar Research* 20: 347-354) mencionan un total de 64 individuos observados en el mar de Weddell oriental entre los 64°S y 69°S durante febrero de 1994, siendo la posición más austral a los 69°05'S 21°24'W el 13 de febrero de 1994.
51. Registrada a los 66°08'S 33°09'W el 14 de febrero de 1994 (José L. Orgeira IAA en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*; Montalti *et al.* [1999] *op. cit.*).
52. Un individuo observado por Anders Anderson al norte de las islas Georgias del Sur el 15 de diciembre de 1995 (A. Anderson en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
53. Un individuo observado entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (53°05'S 52°28'W) en febrero de 1999 (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).
54. Un individuo observado a los 47°52'S 60°41'W en marzo de 1999 (White *et al.* [2002] *op. cit.*).
55. Un individuo observado por Andrew Black unas 25 millas al este de Puerto Stanley, islas Malvinas el 14 de marzo de 2003 (Black *et al.* [2004] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2003*. Falklands Conservation).
56. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).
57. Un individuo observado por Colin Miskelly en Port Williams, islas Malvinas el 26 de diciembre de 2007 (ebird.org/checklist/S31267690).
58. Registrado por Mike Greenfelder entre las islas Malvinas y Georgias del Sur el 13 de marzo de 2008 (ebird.org/checklist/S36999377).
59. Un individuo observado por Michael Hoit frente al golfo San Jorge, Chubut el 4 de noviembre de 2009 (ebird.org/checklist/S66008437).
60. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6:1-37).
- 61-62. Dos individuos observados en el mar de Scotia (60°26'S 49°55'W) el 15 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *Polar Research* 32: 18972).
63. Un individuo observado al norte de las islas Shetland del Sur (60°21'S 62°07'W) el 21 de marzo de 2012 (Orgeira *et al.* [2013] *op. cit.*).
- 64-65. Al parecer dos ejemplares distintos filmados por Josep del Hoyo en el mar de Scotia al noroeste de las islas Georgias del Sur el 19 de abril de 2012 (ebird.org/checklist/S64820101).
66. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny frente a la costa de Buenos Aires el 2 de febrero de 2016 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=195314).
- 67-70. Un total de cuatro individuos registrados en tres sitios diferentes alrededor de los 58°S 50°W el 29 de marzo de 2017 (José L. Orgeira IAA *in litt.*).
71. Un ejemplar fotografiado por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur el 13 de marzo de 2018 (ebird.org/checklist/S43625290).
72. Un ejemplar fotografiado por Christian Savigny frente a la costa de Buenos Aires (40°03'25"S 50°50'55"W) el 13 de marzo de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=256561).
73. Un ejemplar fotografiado por Santiago Imberti al noroeste de las islas Georgias del Sur el 14 de marzo de 2018 (ebird.org/checklist/S43650155).
74. Un ejemplar fotografiado por Ken Chamberlain y un grupo de observadores frente a la costa de Chubut el 24 de febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S53258627).

**Taxonomía:** Junto al PETREL DE CARA GRIS *Pterodroma gouldii* fueron tratadas como la misma especie, pero sus diferencias son mayores que aquellas entre otras especies de *Pterodroma* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).

**Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*), quienes especulan que los registros más australes podrían ser confusiones con el PETREL APIZARRADO *Aphrodroma brevirostris* (William Bourne en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Es una especie habitual en la plataforma continental argentina y en aguas entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (Santiago Imberti *in litt.*).

## ■ PETREL DE ANTEOJOS | *Procellaria conspicillata* | N

**Distribución:** Restringida al océano Atlántico sur, nidifica únicamente en la isla Inaccessible del archipiélago Tristan da Cunha (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Un individuo observado por Andrew Black 350 km al sudeste de Sea Lion Island, islas Malvinas (54°23'S 55°45'W) en diciembre de 1996 (A. Black en White [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).

2-4. Tres individuos observados por Christian Savigny 147 millas al sudeste de Punta Medanosa, Santa Cruz (48°47'S 62°21'W) el 9 de febrero de 2000 (Savigny [2002] *Cotinga* 18: 81-84; Quiñones & Imberti [2018] *Cotinga* 40: 74-78).

5. Un individuo registrado por Andrew Black 110 km al norte de Macbride Head, islas Malvinas (50°20'S 57°41'W) el 13 de marzo de 2000 (A. Black en White [2002] *op. cit.*; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

6-7. Un individuo observado por Santiago Imberti 278 millas al este de Cabo Blanco, Santa Cruz (46°14'S 59°11'W); y otro 283 millas al sudeste de Camarones, Chubut (45°28'S 58°54'W) el 13 de marzo de 2000 (Imberti [2002] *Marine Ornithology* 30: 32-33; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).

8-9. Dos individuos observados por Santiago Imberti 220 millas al sudeste de la bahía San Blas, Buenos Aires (41°44'S 57°36'W) el 14 de marzo de 2000 (Imberti [2002] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).

10. Un individuo observado por Tim Reid al norte de Jason Island, islas Malvinas el 14 de febrero de 2004 (Black *et al.* [2005] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 5: 12-14).

11. Un individuo observado en una localidad no especificada de las islas Malvinas el 29 de marzo de 2006 (Morrison & Henry [2007] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 8: 11-14).

12. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).

13. Un individuo observado por Juan Mazar Barnett a menos de 370 km frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 24 de enero de 2008 (Ginsburg & DeWitt [2013] *Nuestras Aves* 58: 55-56; J. Mazar Barnett *in litt.*).

14-21. Ocho individuos observados (al menos uno fotografiado) en un rango entre 97 y 101 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires entre febrero y marzo de 2008 (Chávez *et al.* [2014] *Hornero* 23: 73-79; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).

22-24. Tres ejemplares marcados con transmisores satelitales en la isla Inaccessible visitaron en el año 2009 las aguas frente a la costa de Buenos Aires, ingresando uno de ellos en la bahía Samborombón y el río de la Plata (Reid *et al.* [2014] *Antarctic Science* 26: 23-32).

25. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Doumeq Milieu en aguas frente a la provincia de Buenos Aires el 17 de enero de 2010 (ebird.org/checklist/S37650232).



26. Un ejemplar fotografiado 100 millas al sudeste de la bahía Samborombón, Buenos Aires (36°26'S 54°09'W) el 10 de abril de 2010 (Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
27. Un ejemplar fotografiado por Leandro N. Chávez 158 millas al sudeste de Punta Ninfas, Chubut (44°20'S, 61°15'W) el 30 de enero de 2012 (Anónimo [2012] *Naturaleza & Conservación* 34: 38; Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*).
28. Un ejemplar fotografiado por Bárbara DeWitt 125 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 3 de febrero de 2013 (Ginsburg & DeWitt [2013] *op. cit.*). Esto fue publicado como la primera evidencia de la especie en aguas argentinas continentales.
- 29-33. Cinco observaciones realizadas por Leandro N. Chávez y otros observadores en el mar argentino entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2013 (Chávez *et al.* [2014] *op. cit.*).
34. Un individuo observado por Santiago Imberti frente a la costa de Buenos Aires el 25 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S27839208).
35. Un ejemplar fotografiado por William Stein 89 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires (38°55'S 56°00'W) el 13 de febrero de 2014 (Seco Pon & Stein [2015] *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 29-30).
36. Un individuo observado por Fabrice Schmitt y Fernando Díaz frente a Bahía Blanca, Buenos Aires el 26 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S17374111).
37. Un individuo observado por Leandro N. Chávez y otros observadores 193 millas al sudeste de la bahía San Blas, Buenos Aires (42°06'S 58°15'W) el 28 de mayo de 2014 (Chávez [2014] *op. cit.*; Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
- 38-39. Dos individuos observados por Christophe Gouraud en aguas del mar argentino el 13 de marzo de 2015 (ebird.org/checklist/S22782129).
- 40-41. Dos ejemplares fotografiados por Diego Monteleone y un grupo de observadores en las afueras de Mar del Plata, Buenos Aires el 15 de marzo de 2015 (ebird.org/checklist/S22600014). Las coordenadas del registro son 38°17'S 57°32'W (L. Pagano *obs. pers.*).
42. Un grupo de nueve ejemplares fotografiados por Javier Quiñones 134 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 18 de enero de 2016 (Quiñones & Imberti [2018] *op. cit.*).
- Taxonomía:** Considerada hasta hace poco una subespecie del PETREL BARBA BLANCA *Procellaria aequinoctialis* (Ryan [1998] *Bird Conservation Internacional* 8: 223-235).

## ■ PARDELA DE CABO VERDE | *Calonectris edwardsii* | N R

**Distribución:** Se reproduce únicamente en el archipiélago de Cabo Verde, ubicado en el océano Atlántico norte (Onley & Scofield [2007] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

**Registros:** 1. Tres individuos observados por William Curtis 181 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires (38°36'S 53°30'W) el 18 de febrero de 1994 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43:19-28).

2. Un ejemplar fotografiado por Sean Sime y Joseph DiCostanzo en algún lugar del mar argentino el 2 de marzo de 2001 (ebird.org/checklist/S55680550).

3. Un ejemplar fotografiado por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Luis Pagano y un grupo de observadores unas 12 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S30651047).

4. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman unas 21 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 8 de marzo de 2014 (M. Pearman *com. pers.*).

5. Dos ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores entre 10 y 25 millas al este de Mar del Plata, Buenos Aires el 27 de noviembre de 2016 (L. Pagano *obs. pers.*; ebird.org/checklist/S32807580).