

6. Hasta 18 ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores entre 10 y 25 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 17 de febrero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*; ecoregistros.org/site/imagen.php?id=191102; Figura 30).
7. Más de 20 ejemplares observados y fotografiados por Luis Pagano y un grupo de observadores unas 10 millas al este de Mar del Plata, Buenos Aires el 18 de febrero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*; ebird.org/checklist/S44550015).
- 8-11. Un total de 67 individuos registrados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores en cuatro sitios frente a la costa de Buenos Aires el 26 de febrero de 2017 (ebird.org). Las fotografías no se encuentran disponibles.
12. Un total de 26 individuos observados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires el 3 de febrero de 2018 (ebird.org).
13. Un máximo de 202 individuos observados y fotografiados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires el 3 de marzo de 2018 (ebird.org).
14. Dos individuos observados por Mick Greene frente a la costa patagónica norte el 20 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S64619428).
15. Al menos dos individuos observados por Luke Seitz y Steve Howell frente a la costa de Buenos Aires el 23 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S63993001).
- 16-18. Un total de tres individuos observados por Fabrice Schmitt y un grupo de observadores frente a la costa de Buenos Aires entre el 17 y el 22 de febrero de 2020 (ebird.org).
19. Un individuo observado por Marcelo Gavensky, Laura Dodyk, Andrés de Miguel y Javier Pe-



Figura 30. Pardela de Cabo Verde *Calonectris edwardsii*, Mar del Plata, Buenos Aires, 17 de febrero de 2017 (Jorge La Grotteria)

reya frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 5 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98582323).

20. Un ejemplar hallado muerto por Flavio Moschione en las playas de Mar Chiquita, partido homónimo, Buenos Aires el 28 de diciembre de 2021 (ebird.org/checklist/S99617878). Desconocemos si el ejemplar fue conservado, y al parecer no existen fotografías del mismo.

Taxonomía: Considerada por mucho tiempo una subespecie de la PARDELA GRANDE *Calonectris diomedea* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

Comentarios: William Curtis ([1994] *op. cit.*) curiosamente menciona que los ejemplares observados poseían el pico negro. Recientemente citada para aguas uruguayas (Abreu *et al.* [2010] *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay* 19: 29-35). Aparentemente no es una especie rara en el mar argentino, la escasez de registros se debe a que ha pasado desapercibida para la mayoría de los observadores (Santiago Imberti *in litt.*).

■ PARDELA PATAS CLARAS | *Ardeanna carneipes* | N V

Distribución: Se reproduce en Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente se dispersa por los océanos Pacífico e Índico (Onley & Scofield [2007] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry 110 km al noroeste de las islas Malvinas el 16 de octubre de 2014 (Morrison [2015] *Rare and vagrants birds in the Falkland Islands*. Falklands Conservation; ebird.org/checklist/S50430053).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Puffinus* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

■ PIQUERO VARIADO (Piquero Peruano) | *Sula variegata* | N V

Distribución: Endémica de la corriente de Humboldt en el océano Pacífico. Las colonias se distribuyen desde el N de Perú hasta el centro de Chile (Carbóneras [1992] *en del Hoyo et al. [editores] Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar colectado en las “Islas Malvinas” el 7 de enero de 1837 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el NML (Figura 31).

2. Un individuo observado por Johan Mogensen en la provincia de Tierra del Fuego, sin fecha (Zotta [1935] *Hornero* 6: 151-196).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

Especímenes (1): NML-D2907a



Figura 31. Piquero Variado *Sula variegata*, NML-D2907a, islas Malvinas, 7 de enero de 1837 (World Museum)

■ PELÍCANO PERUANO | *Pelecanus thagus* | N V

Distribución: Se reproduce en la costa del océano Pacífico, desde el centro de Perú hasta el centro de Chile (Elliott [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513) menciona un supuesto comentario o hallazgo de Santiago Venturi en Barracas al Sud (actualmente Avellaneda), Buenos Aires sin fecha.

2. Mencionada como accidental para Tierra del Fuego, sin más detalles (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA).

3. Un individuo observado por María Luisa de Solari en el PN Lago Puelo, Chubut el 21 de noviembre de 1993 (Félix Vidoz en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

4. Registrada por Domingo Gallusio en el lago Fagnano, Tierra del Fuego sin fecha (D. Gallusio en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Posteriormente la localidad fue rectificad como canal de Beagle, Tierra del Fuego (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

5. Un juvenil fotografiado por Andrés Elías en el embalse Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, Mendoza en junio de 2008 (Elías [2008] *Nuestras Aves* 53: 48).

6. Un juvenil fotografiado por Paula Ciraolo unos 40 km al sur de Gaiman, departamento Rawson, Chubut el 17 de mayo de 2015 (ebird.org/checklist/S23516961; Figura 32).

7. Un juvenil capturado y fotografiado en el Puesto Fernández de la localidad de Ingeniero Luis Huergo, departamento General Roca, Río Negro el 30 de mayo de 2021 (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Río Negro).

Taxonomía: Anteriormente tratada como una subespecie del PELÍCANO PARDO *Pelecanus occidentalis*, aunque existen diferencias de tamaño, plumaje y distribución que avalan el tratamiento como especies distintas (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop271.htm).



Figura 32. Pelicano Peruano *Pelecanus thagus*, 40 km al sur de Gaiman, Chubut, 17 de mayo de 2015 (Paula Ciraolo)

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Con respecto a la mención de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Recientemente fotografiada en la costa de São Paulo, Brasil (Patrial *et al.* [2011] *Revista Brasileira de Ornitologia* 19: 539-540).

■ GARZA BRUJA CORONADA (Garza Encapuchada) | *Nyctanassa violacea* | N V

Distribución: Por el Atlántico desde Estados Unidos y las Antillas hasta el S de Brasil. En las costas del océano Pacífico desde California hasta el N de Perú (Martínez-Vilalta & Motis [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar adulto fotografiado por Fabricio Gorleri en Tilcara, departamento homónimo, Jujuy el 22 de octubre de 2018 (Gorleri [2020] *Hornero* 34: 50-52).

Comentarios: Esta especie se ha expandido a través de las costas del Pacífico hacia Perú y Chile (Ugarte *et al.* [2010] *Revista Peruana de Biología* 17: 249-251; Barros [2018] *La Chiricoca* 23: 25-44), así como también en el sur de Brasil (Gianuca [2007] *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 464-467).

■ GARCITA REAL | *Pilherodius pileatus* | N R

Distribución: Cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Desde el E de Panamá a través de las Guayanas hasta el E de Brasil, E de Ecuador, Bolivia, Paraguay y N de Argentina (Martínez-Vilalta & Motis [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione y Ricardo Banchs en el riacho Monte Lindo Chico, departamento Patiño, Formosa el 5 de diciembre de 1993 (Moschione & Banchs [1995] *Nótulas Faunísticas* 83: 1-2).

2. Un individuo observado por Miguel Castelino y Karina Schiaffino en el PN Iguazú, Misiones el 3 de abril de 1995 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

3. Un individuo observado en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 5 de febrero de 1999 (Daniel Fernández *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

4. Un individuo observado por Carla Pijoan en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 2005 (Pijoan [2009] *Nuestras Aves* 54: 40-41).

5. Un ejemplar fotografiado por Pablo Capovilla y Facundo Di Sallo 2,5 km al sur del PP Pampa del Indio, Chaco el 10 de noviembre de 2017 (Di Sallo & Capovilla [2018] *Nuestras Aves* 63: 22-23).

6. Dos ejemplares observados (uno fotografiado) por Marcelo Cavicchia en el PN Iguazú, Misiones el 2 de septiembre de 2019 (ebird.org/checklist/S59481845).

7. Un individuo observado por Patricio Ramírez Llorens en el PN Iguazú, Misiones el 16 de julio de 2020 (ebird.org/checklist/S71572076).

8. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 20 de febrero de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=434211). Quizás el mismo fue relocalizado por María del Castillo y otros observadores el 15 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S91784034).

9. Un ejemplar observado y fotografiado por Marcelo Gavensky, Adrián Heredia y un grupo de observadores en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 y 16 de mayo de 2021 (ebird.org/checklist/S89934185). Quizás el mismo fue observado por Adrián Heredia,

Silvina Collado y Julián Collado el 26 y 27 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S98163579).
Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*).

■ **BANDURRIA ANDINA** | *Theristicus branickii* | N V

Distribución: Andes desde Ecuador hasta el NO de Bolivia y extremo N de Chile (Matheu & del Hoyo [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un grupo de al menos seis ejemplares fotografiado por Gisela Müller y Oscar Braslavsky en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta entre el 16 y el 23 de octubre de 2020 (Müller *et al.* [2021] *Hornero* 36: 79-82; Figura 33).

Taxonomía: Descripta por Hans von Berlepsch y Jean Stolzmann ([1894] *Ibis* 36: 385-405) con material proveniente de Perú. Considerada por largo tiempo una subespecie de la BANDURRIA AUSTRAL *Theristicus melanopis*. Existe numerosa evidencia que sustenta la separación de las formas *melanopis* y *branickii* como especies válidas (Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press; Collar & Bird [2011] *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 459-463), propuesta que fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop822.htm).



Figura 33. Bandurria Andina *Theristicus branickii*, Los Toldos, Salta, 22 de octubre de 2020 (Gisela Müller)

■ JOTE CABEZA AMARILLA GRANDE | *Cathartes melambrotus* | N V

Distribución: Especie típica de la Amazonía, distribuida en las Guayanas, S de Venezuela y Colombia, E de Ecuador y Perú, N y E de Bolivia y centro de Brasil (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: 1. Un individuo observado por Roberto Straneck y Christian Henschke en el PN Calilegua, Jujuy en mayo de 1981 (Olrog [1985] en Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors*. ICBP Technical Publication N°5).

2. Un individuo observado en las juntas del río Lipeo, Salta el 29 de julio de 1992 (Flavio Moschione en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

3. Una pareja observada en Tartagal, departamento General José de San Martín, Salta el 21 de octubre de 2000 (Mark Pearman en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*). Muy probablemente la misma observación fue luego publicada con fecha “19 de octubre de 2000” (Coconier *et al.* [2007] en Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).

4-5. Un total de cuatro individuos observados en el PN Calilegua, Jujuy en agosto de 2003 y julio de 2004 (Roesler & Juhant [2004] *I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces*. La Plata).

6. Dos ejemplares fotografiados por Alejandro Laspiur y Gustavo Fava en Rodeo, departamento Iglesia, San Juan el 3 de marzo de 2011 (Fava & Acosta [2015] *Nuestras Aves* 60: 51-52).

7. Un inmaduro observado por Luis Pagano en la finca Río Seco, unos 10 km al norte de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 30 de junio de 2011 (L. Pagano *obs. pers.*).

8. Un adulto observado por Luis Pagano unos 2 km al oeste de General Mosconi, departamento General José de San Martín, Salta el 3 de diciembre de 2011 (L. Pagano *obs. pers.*).

9. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 17 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=605997).

10. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 14 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=684415).

11. Un adulto observado por Luis Pagano en la ruta provincial n°83 sobre el puente del río Jordán, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 de enero de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).

Taxonomía: Alexander Wetmore ([1964] *Smithsonian Miscellaneous Collections*. Volume 146. Number 6: 1-18) describe esta especie basándose en características del plumaje y medidas de las timoneras centrales.

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Claës Olrog ([1985] *op. cit.*) menciona que los “jotes de cabeza amarilla” del PN Iguazú, Misiones aparentan ser más grandes que los observados en Corrientes y podrían corresponder a esta especie. Es plausible que los ejemplares identificados como *melambrotus* en las yungas argentinas correspondan a una forma no descripta de *Cathartes*.

■ PEUQUITO | *Accipiter chilensis* | N (CT)

Distribución: Localizada en el centro de Chile y O de Argentina hasta Tierra del Fuego (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).

Taxonomía: Descripta por Rudolph Philippi y Ludwig Landbeck ([1864] *Archiv für Naturgeschichte* 30 [1]: 41-54) con material tipo proveniente de Chile. Tradicionalmente considerada una población austral del ESPARVERO VARIADO *Accipiter bicolor*. Seguimos a Jean-Marc Thiollay ([1994] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions) en reconocer a este taxón como especie válida. *Accipiter chilensis* posee distribución alopátrica y difiere en tamaño, plumaje y vocali-

zaciones (Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Comentarios: Las primeras menciones para Argentina provienen de Ushuaia e isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego (Salvadori [1900] *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 20: 609-634; Dabbene [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 341-405) y el lago General Paz (= Vintter), Chubut (Lynch Arribáizaga [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 151-168). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

■ AGUILUCHO BLANCO | *Pseudastur polionotus* | N R

Distribución: Restringida a la franja costera del E de Sudamérica, desde Alagoas hasta Rio Grande do Sul en Brasil, E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).

Registros: 1. Observada en la costa argentina del Alto Paraná a los 26° de latitud sur, Misiones (Bertoni [1904] *Anales Científicos Paraguayos* 3: 1-10). Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención de Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Un individuo observado por Samuel Narosky en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 1975 (S. Narosky en Beltrán [1985] *Nuestras Aves* 6: 16-17). Posteriormente Chebez ([1994] *Los que se van*. Albatros) menciona la localidad como PN Iguazú, Misiones.

3. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1985 (M. Rumboll en Saibene et al. [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

4. Un individuo observado por Hernán Casañas en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1985 (H. Casañas en Chebez [1994] *op. cit.*).

5. Dos individuos observados por Fernando Foletto en el PP Horacio Foerster, Misiones el 14 de agosto de 2009 (Baigorria & Foletto [2013] *Nuestras Aves* 58: 88-91).

6. Un ejemplar fotografiado por Fernando Foletto en el PP Horacio Foerster, Misiones el 2 de diciembre de 2009 (Baigorria & Foletto [2013] *op. cit.*).

7. Un individuo observado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 19 de febrero de 2012 (Baigorria & Foletto [2013] *op. cit.*).

Taxonomía: Anteriormente conocida como *Leucopternis polionota* (Rodríguez Mata et al. [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Tanto Bertoni ([1904] *op. cit.*) como Dabbene ([1914] *Physis* 1: 293-366) comentan que el “aguilucho de cabeza blanca” referido por Holmberg ([1887] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 19: 1-388) para el arroyo Quiá, Chaco podría corresponder a esta especie.

Había sido incluida para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación de Judith Hutton en mayo de 1989 (Gómez & Babarskas [1992] en Gómez et al. [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz et al. ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error.

■ AGUILUCHO ALAS ANCHAS | *Buteo platypterus* | N

Distribución: Nidifica en el E de Norteamérica y las Antillas, migrando luego hacia Centroamérica y O de Sudamérica a través de los Andes (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).

Registros: 1. Un individuo observado por Andrew Whittaker y Steve Hilty en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de noviembre de 2000 (A. Whittaker y S. Hilty en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions; Mazar Barnett & Kirwan [2002] *Cotinga* 17: 79-87).
2. Un individuo observado por Ignacio Roesler y Luciano Naka en el PN Calilegua, Jujuy el 5 de noviembre de 2002 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *Hornero* 19: 37-40).

3-4. Dos individuos observados por Juan Mazar Barnett y Hernán Casañas en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de noviembre de 2002 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *op. cit.*).

5-6. Un juvenil y un adulto observados por Juan Mazar Barnett, Johanna Winkelmann y Eduard Osieck en dos sitios diferentes del PN Calilegua, Jujuy el 24 de noviembre de 2003 (Roesler & Mazar Barnett [2004] *op. cit.*). El adulto fue fotografiado por Johanna Winkelmann (Ignacio Roesler *in litt.*).

7. Un adulto observado en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en diciembre de 2003 (Roesler & Casañas [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).

8. Un adulto fotografiado por José Segovia en Ocloyas, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy en octubre de 2004 (J. Segovia *com. pers.*).

9. Un adulto observado en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en noviembre de 2004 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).

10. Un adulto observado por Ignacio Roesler en la zona de selva montana del PN Calilegua, Jujuy en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).

11. Un juvenil observado por Ignacio Roesler en la zona de selva de transición del PN Calilegua, Jujuy en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).

12. Un adulto observado por Ignacio Roesler en la RN El Nogalar, Salta en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).

13. Un adulto observado por Ignacio Roesler en el PN Baritú, Salta en enero de 2005 (Roesler & Casañas [2005] *op. cit.*).

14-15. Un adulto y un juvenil fotografiados por Pablo Grilli unos 9 km al oeste de Salvador Mazza, departamento General José de San Martín, Salta el 13 de diciembre de 2009 (Pagano *et al.* [2017] *Nuestras Aves* 62: 34-35).

16. Un individuo observado por Germán Pugnali volando sobre el río Jordán, departamento Valle Grande, Jujuy el 21 de noviembre de 2010 (ebird.org/checklist/S26693335).

17. Un adulto fotografiado con cámara trampa en la estancia Guaycolec, departamento Formosa, Formosa el 9 de diciembre de 2010 (Klavins *et al.* [2012] *Cotinga* 34: 57-59).

18. Un adulto observado por José Segovia y Luis Pagano en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de diciembre de 2011 (L. Pagano *obs. pers.*).

19-21. Tres adultos observados y uno fotografiado por Donald Bryant sobre la ruta provincial n°83 cerca de San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 16 de enero de 2013 (Sergio Seipke *in litt.*).

22-23. Registrada en el PN Calilegua, Jujuy el 1 y 4 de febrero de 2013 (Kilpp *et al.* [2018] *Ornitología Neotropical* 29: 337-342).

24. Un individuo observado por Facundo Gandoy en Vaqueros, departamento La Caldera, Salta el 4 de noviembre de 2013 (ebird.org/checklist/S15563960).

25. Registrada por Freddy Burgos en el abra Los Cedros-Honda, departamento Valle Grande, Jujuy el 29 de diciembre de 2013 (ebird.org/checklist/S16147314).

26. Un adulto fotografiado con cámara trampa en el PN Iguazú, Misiones el 27 de enero de 2014 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*).

27. Un juvenil fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy en la finca Miraflores, departamento Anta, Salta el 8 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S20835818).
28. Una pareja observada por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de diciembre de 2014 (ebird.org/checklist/S23382068).
29. Un adulto fotografiado por Carlos Cuñado en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 9 de noviembre de 2015 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ecoregistros.org/site/imagen.php?id=125527).
30. Una pareja observada (adulto fotografiado) por William Legge en el PN Calilegua, Jujuy el 9 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26848181).
31. Un juvenil fotografiado por Luis Fernández en el dique Los Molinos, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy el 12 de enero de 2016 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S26856660).
32. Un juvenil fotografiado por Mariel Sánchez en el PN Calilegua, Jujuy el 12 de noviembre de 2016 (Kilpp *et al.* [2018] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S32575035).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Mencionada sin detalles para la reserva privada San Pablo, departamento Lules, Tucumán entre julio de 2016 y noviembre de 2017 (Ortiz *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 246: 1-8). Un ejemplar fotografiado por Iván Eroles en la reserva privada El Destino, partido de Magdalena, Buenos Aires el 4 de diciembre de 2019; y otro fotografiado por Enrique Chiurla en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, Buenos Aires el 8 de diciembre del mismo año (Eroles Monllor & Chiurla [2020] *Nuestras Aves* 65: 17-19). Un ejemplar fotografiado por Esteban Martínez Pastur en Villa Nogués, departamento Lules, Tucumán el 23 de febrero de 2020 (Navarrete *et al.* [2020] *EcoRegistros Revista* 10: 4-7). Con numerosos registros durante los últimos 20 años, actualmente se la considera una especie de presencia estacional y frecuente en las selvas de montaña del noroeste argentino.

■ CATITA ANDINA | *Bolborhynchus orbynesius* | N R

Distribución: Andes orientales desde el N Perú hasta el centro de Bolivia (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*).

Registros: 1. Un grupo de 45 individuos observado por Flavio Moschione entre Valle Colorado y Santa Ana, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de abril de 2007 (F. Moschione *en* Krabbe *et al.* [2009] *Hornero* 24: 95-98).

2. Un grupo grabado y fotografiado por Niels Krabbe, Ana Sureda y Roberto Canelo en la finca El Candado, departamento Chicoana, Salta el 27 y 28 marzo de 2009 (Krabbe *et al.* [2009] *op. cit.*; xeno-canto.org/32253; xeno-canto.org/32257).

3. Un grupo grabado por Niels Krabbe en la finca El Candado, departamento Chicoana, Salta el 22 de enero de 2015 (xeno-canto.org/212732).

4. Tres ejemplares observados y grabados por Freddy Burgos arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 22 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S45950440).

5. Dos individuos observados por José Segovia arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 16 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S46917015).

6. Un grupo de cinco individuos observados por Flavio Moschione arriba de Valle Colorado, departamento Valle Grande, Jujuy el 13 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95058182).

■ CHOROY | *Enicognathus leptorhynchus* | N V

Distribución: Centro de Chile desde Aconcagua hasta Chiloé y ocasionalmente el N de Aisén, hasta los 2000 msnm (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Registrada con cierta regularidad por Omar Zapata en Villa Pehuenia, departamento Aluminé, Neuquén durante el mes de marzo sin especificar el año (O. Zapata en Veiga et al. [2005] *Aves de la provincia de Neuquén*. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. Editorial RyC).

2. Dos individuos observados por Horacio Matarasso y Henry Webster en la estancia San Huberto, departamento Huiliches, Neuquén el 25 de febrero de 2006 (Matarasso & Webster [2006] *Nuestras Aves* 52: 35-36).

3. Un individuo observado por Juan M. Rubio en Esquel, departamento Futaleufú, Chubut el 27 de mayo de 2008 (J.M. Rubio *in litt.*).

4. Un ejemplar filmado y fotografiado por Luis Ricciuto en el museo El Charrúa, RM Quilque Lil, departamento Aluminé, Neuquén el 7 y 9 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S68630573; Figura 34).

5. Un ejemplar (probablemente el mismo de la observación anterior) fotografiado por Luis Ricciuto en Aluminé, departamento homónimo, Neuquén el 18 de noviembre de 2021 (L. Ricciuto *in litt.*).

Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Existen reportes referidos al paso Icalma, departamento Aluminé, Neuquén que preferimos excluir por falta de detalles (H. Gerbund en López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).



Figura 34. Choroy *Enicognathus leptorhynchus*, reserva Quilque Lil, Neuquén, 9 de mayo de 2020 (Luis Ricciuto)

■ CHURRÍN DE ZIMMER | *Scytalopus zimmeri* | N

Distribución: Andes del S de Bolivia y NO de Argentina, entre los 1700-3200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Claës Olrog en el “camino a Valle Grande, San Francisco”, departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de agosto de 1956 (Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 15: 5-18). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2-3. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog, José María Gómez, Octavio Budin y Leoncio Lemo en El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 25 y 27 de octubre 1970 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264). Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.

4-5. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog, José María Gómez, Octavio Budin y Leoncio Lemo en El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de noviembre de 1970 (Olrog [1972] *op. cit.*). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MACN y el restante en la COFML.

6. Numerosos ejemplares grabados por Mark Pearman en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de diciembre de 1996. Posteriormente este observador la registró en varias visitas a la misma zona (M. Pearman *in litt.*).

7. Varios ejemplares grabados por Mark Pearman entre El Duraznillo y Alto Calilegua, departamento Valle Grande, Jujuy el 4 de septiembre de 1998 (M. Pearman *in litt.*).

8. Registrada por Germán Pugnali en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 29 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S26745026).

9-10. Varios individuos registrados por Juan Mazar Barnett cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 2 y 3 de diciembre de 2003 (J. Mazar Barnett, inédito).

11. Registrada por Diego Monteleone, Germán Pugnali, Mark Pearman y Frank Lambert cerca de Rodeo Pampa, departamento Santa Victoria, Salta el 7 de septiembre de 2004 (ebird.org/checklist/S26500580).

12. Registrada por Daniel Almirón en cercanías de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta entre el 22 y el 25 de octubre de 2004 (ebird.org/checklist/S27379459).

13-33. Mencionada sin detalles para diez localidades de la provincia de Jujuy y otras once de la provincia de Salta (Di Giacomo [2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

34. Un individuo observado por Nigel Voaden en el PN Los Cardones, Salta el 5 de marzo de 2006 (ebird.org/checklist/S20477493).

35. Un individuo observado por John y Lindsay Fitch en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 19 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S7954097).

36. Registrada en numerosas ocasiones en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy).

37-38. Grabada por Daniel Almirón, Diego Caiafa y otros observadores cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 5 y 6 de noviembre de 2007 (ebird.org/checklist/S24888731; xeno-canto.org/116369).

Taxonomía: Niels Krabbe y Thomas Schulenberg ([1997] *Ornithological Monographs* 48: 47-88) proponen una clasificación moderna del género *Scytalopus* basada en diferencias ecológicas y vocales.

Comentarios: Claës Olrog había observado diferencias de plumaje entre las aves de la sierra de Aconquija, Tucumán (pertenecientes al CHURRÍN CEJA BLANCA *Scytalopus superciliaris*) y las provenientes de Calilegua, Jujuy sospechando que estas últimas podrían corresponder a la subespecie *Scytalopus superciliaris zimmeri* (Olrog [1958] *op. cit.*; Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377). Más tarde, este autor refuta su propia hipótesis aclarando que las diferencias observadas son individuales (Olrog [1972] *op. cit.*). Esta especie pasó desapercibida por largo tiempo en territorio argentino ya que habita en sectores localizados e inaccesibles, pero principalmente debido al desconocimiento de sus vocalizaciones y la

importancia de éstas como caracteres taxonómicos (Areta & Monteleone [2022] *Journal of Ornithology*: doi.org/10.1007/s10336-022-02012-0).

Especímenes (5): MACN-Or-52161, COFML-10050, COFML-13213, COFML-13214, COFML-13215

■ BANDURRITA BOLIVIANA | *Tarphonomus harterti* | N R

Distribución: Andes del O de Bolivia entre los 1400-2950 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Una pareja observada y grabada por Juan Mazar Barnett en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 3 de diciembre de 2003 (J. Mazar Barnett, inédito).

2. Un ejemplar grabado por Diego Monteleone, Germán Pugnali, Mark Pearman y Frank Lambert en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 8 de septiembre de 2004 (Monteleone [2008] en López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).

3. Un ejemplar fotografiado por Germán Pugnali, Mark Pearman y James Lowen en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 4 de agosto de 2009 (G. Pugnali y J. Lowen *in litt.*).

4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta en junio de 2010 (A. Bodrati *com. pers.*).

5. Tres ejemplares fotografiados por Jorge La Grotteria, Santiago Torres y Walter Gómez en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 9 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=358398; Figura 35).

6. Tres ejemplares fotografiados y grabados por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Fabricio Gorleri y un grupo de observadores en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 15 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61623949).

7. Dos individuos observados por Freddy Burgos en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 23 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61770837).



Figura 35. Bandurrita Boliviana *Tarphonomus harterti*, Santa Victoria Oeste, Salta, 9 de septiembre de 2019 (Jorge La Grotteria)

8. Un ejemplar fotografiado por Ulises Ornstein, Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 9 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S97547768).

Comentarios: Todos los registros provienen de un sector localizado sobre la ruta que conduce a Cañaní, unos 3 km al este de Santa Victoria Oeste, Salta.

■ BANDURRITA DE BOSQUE | *Upucerthia saturator* | N (CT)

Distribución: Endémica de los bosques patagónicos del centro-sur de Chile y O de Argentina (Areta & Pearman [2009] *Condor* 111: 135-149).

Taxonomía: Descripta por William Scott ([1900] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 10: 62-64) con material proveniente de Chile, y considerada por casi todos los autores como una subespecie de la BANDURRITA ESTEPARIA *Upucerthia dumetaria*. Juan Esteban ([1951] *Acta Zoológica Lilloana* 12: 377-441) fue uno de los pocos en tratar a la forma *saturator* como especie diferente. Nuevos estudios demostraron que las diferencias morfológicas, vocales y ecológicas son suficientes para reconocer a *saturator* como especie válida (Areta & Pearman [2009] *op. cit.*; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop393.htm).

Comentarios: Mencionada por primera vez para la avifauna argentina en base a una serie de ejemplares colectados cerca del lago Nahuel Huapi, Neuquén y en la provincia de Chubut (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

■ REMOLINERA ACANELADA | *Cinclodes albiventris* | N (CT)

Distribución: Andes de Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina hasta los 5000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por Rudolph Philippi y Ludwig Landbeck ([1861] *Anales de la Universidad de Chile* 18: 731-734) con material proveniente de Arica, Chile y considerada por mucho tiempo una subespecie de la REMOLINERA PARDA *Cinclodes fuscus*. Nuevos estudios demostraron que *albiventris* debería ser tratada como especie válida, propuesta que fue aceptada por el SACC (Sanín *et al.* [2009] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 53: 547-555; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop415.htm).

Comentarios: Existen numerosos reportes históricos en la literatura (White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259; Chapman [1919] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 41: 323-333; Dabbene [1920] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 30: 113-195).

■ BAILARÍN YUNGUEÑO | *Chiroxiphia boliviana* | N

Distribución: Andes desde el S de Perú hasta el O de Bolivia, entre los 650-2150 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Registrada por Flavio Moschione en la finca Candado Grande ubicada en la serranía de las Pavas, departamento Orán, Salta el 9 de septiembre de 2013 (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; Areta *et al. en prep.*).

- 2-3. Varios ejemplares grabados por Juan I. Areta, Mark Pearman, Facundo Gandoy y Giselle Mangini en dos territorios de la finca Candado Grande ubicada en la serranía de las Pavas, departamento Orán, Salta entre el 1 y el 3 de octubre de 2014 (Areta *et al.* *en prep.*).
4. Un juvenil capturado y al menos cuatro ejemplares grabados por Luis Rivera y Natalia Politi en la finca Pintascayo, departamento Iruya, Salta entre el 10 y el 13 de octubre de 2014 (Rivera & Politi [2015] *Hornero* 30: 21-23).
5. Escuchada por Juan I. Areta en el PN Calilegua, Jujuy el 21 de agosto de 2015 (Areta *et al.* *en prep.*).
6. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S51699794).
7. Registrada por Flavio Moschione en el PN Calilegua, Jujuy en enero de 2016 (Hernán Povedano *en* López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).
8. Cuatro individuos grabados por Facundo Gandoy, Giselle Mangini, Facundo Di Sallo y Federico Brissón Egli en el dique Itiyuro, departamento General José de San Martín, Salta el 17 de abril de 2016 (ebird.org/checklist/S29057033).
9. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en el PN Calilegua, Jujuy el 24 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=563265).
10. Un juvenil fotografiado por Adrián Braidotti en el PN Calilegua, Jujuy el 11 de julio de 2016 (Braidotti [2016] *EcoRegistros Revista* 6: 27-29).
11. Un individuo observado por Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en el PN Calilegua, Jujuy el 1 y 3 de agosto de 2016 (ebird.org/checklist/S31037685).
12. Uno o dos individuos escuchados por Diego Monteleone y Hugo Hulsberg en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de septiembre de 2016 (ebird.org/checklist/S31648854).
13. Al menos cuatro ejemplares grabados por Juan I. Areta en el PN Calilegua, Jujuy el 16 de septiembre de 2016 (Areta *et al.* *en prep.*).
14. Dos individuos grabados por Jorge La Grotteria y Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 27 de septiembre de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=485110).
15. Un ejemplar grabado por Martín Toledo y Alejandro Schaaf en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S31986970).
16. Un total de seis individuos registrados por Julián Quillén Vidoz en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32167843).
17. Dos individuos observados por Nicolás Bejarano en la reserva Loma Chata, departamento Valle Grande, Jujuy el 1 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S51523652).
18. Un ejemplar fotografiado por Matías Chávez en el PN Calilegua, Jujuy el 27 de febrero de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=549575).
- Comentarios:** Documentada en el PN Baritú, Salta en octubre de 2018 y enero de 2019 (Müller *et al.* [2019] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 269: 1-4).

■ TUERÉ ENMASCARADO | *Tityra semifasciata* | N

Distribución: Desde México y Centroamérica hasta el NO de Sudamérica y la Amazonía, con una población disyunta en el E de Paraguay. Mayormente por debajo de los 1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho fotografiado por Ignacio Roesler y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 17 de enero de 2008 (Bodrati *et al.* [2008] *Hornero* 23: 45-49).

2-3. Una hembra y una pareja observadas por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 4 y 6 de mayo de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *Nuestras Aves* 56: 33-34).

4. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 16 de agosto de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
 5. Una hembra adulta fotografiada por Rosana Ursino y Pablo Mosto cerca de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 29 de agosto de 2010 (Mosto [2011] *EcoRegistros Revista* 3: 1-3; Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
 6. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 1 de diciembre de 2010 (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).
 7. Una hembra fotografiada por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 30 de agosto de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=15731).
 8. Un macho fotografiado por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 22 de agosto de 2013 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=25702).
 9. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de octubre de 2013 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=606015).
 10. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Laura Dodyk en el PP Puerto Península, Misiones el 8 de enero de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=36300).
 11. Una pareja fotografiada por Jorge La Grotteria, Alec Earnshaw y Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 2 y 3 de mayo de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=50616).
 12. Una pareja fotografiada por Patricio Silfeni en el PN Iguazú, Misiones el 31 de julio de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=58041).
 13. Una hembra fotografiada por Marian Wigdorovitz en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de marzo de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=92321).
 14. Una hembra fotografiada por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 7 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=98890).
 15. Dos ejemplares fotografiados por Andrés Terán en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 27 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S53179395).
- Comentarios:** Un individuo observado por Alejandro Bodrati unos 4 km al este del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 14 de octubre de 2017 (Bodrati [2018] *Nuestras Aves* 63: 56). Un nido depredado por ARASARÍ FAJADO *Pteroglossus castanotis* en el PN Iguazú, Misiones (Moresco [2019] *Nuestras Aves* 64: 14-16). Especie de reciente y rápida expansión por el territorio argentino (Pagano & Bodrati [2011] *op. cit.*).

■ PICOAGUDO | *Oxyruncus cristatus* | N R

Distribución: Fragmentada distribución en Sudamérica. La población más austral ocupa la región SE de Brasil, E de Paraguay y extremo NE de Argentina hasta los 1600 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Pablo Canevari en el PN Iguazú, Misiones el 16 de mayo de 1982 (Canevari [1992] *Nuestras Aves* 27: 35).

2. Un individuo observado por Peter Kaestner en el PN Iguazú, Misiones en el año 1986 (P. Kaestner en Ridgely & Tudor [1994] *The Birds of South America. The Suboscine Passerines*. University of Texas Press).

3-6. Registrada por Davis Finch en el PN Iguazú, Misiones el 19 de julio de 1987, 19 de julio de 1988, 20 de noviembre de 1988 y 19 de julio de 1989 (Finch [1991] *Nuestras Aves* 24: 24-25).

7. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 1992 (ebird.org/checklist/S26748674).

8. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1994 (G. Pugnali en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

9. Un ejemplar grabado en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 27 y 28 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).

10. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2007. Al día siguiente fue relocalizado por Ignacio Roesler, Mark Pearman y Emilio Jordan en el mismo sitio (I. Roesler *in litt.*).

11. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 28 de agosto de 2008 (ramonmollerjensen.com).

12. Un ejemplar fotografiado por Fernando Bernasconi en el PP Urugua-í, Misiones el 8 de mayo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=17122).

13. Un individuo escuchado por Luis Pagano y Diego Oscar sobre la ruta provincial n°14 unos 6 km al sur del cruce con la ruta provincial n°17, departamento San Pedro, Misiones el 7 de abril de 2012 (L. Pagano *obs. pers.*; ebird.org/checklist/S31610122).

14. Un individuo escuchado por Rosana Ursino en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de abril de 2012 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=32675).

15. Dos individuos vocalizando cerca de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 2 y 3 de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).

16. Dos individuos escuchados por Fabricio Gorleri en el PP Urugua-í, Misiones el 12 de abril de 2015 (ebird.org/checklist/S17917593).

17. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Hugo Hulsberg y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 10 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S47191345).

18. Un ejemplar fotografiado y filmado por Alec Earnshaw y Julián Baigorria en el PN Iguazú, Misiones el 2 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S36634944; Figura 36).

19. Un individuo observado por Walter Gómez en el PN Iguazú, Misiones el 21 de julio de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=458086).

20. Un individuo escuchado por Julián Quillén Vidoz en Saltos del Tabay, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 24 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S33180893).

21. Un ejemplar fotografiado por Héctor Schreiber, David Juszczuk y Héctor Fernández en el PN Iguazú, Misiones el 28 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=354326).

22. Un individuo registrado por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 8 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S80668531).

23. Un ejemplar fotografiado por Jorge La Grotteria y María Sosa en el PN Iguazú, Misiones el 1 de abril de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=439157).



Figura 36. Picoagudo *Oxyruncus cristatus*, PN Iguazú, Misiones, 2 de julio de 2016 (Alec Earnshaw)

24. Un individuo observado por Facundo Di Sallo y Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 16 de abril de 2021 (ebird.org/checklist/S85670247). Éstos y otros observadores lo registran en forma regular en la zona entre abril y noviembre de ese año (ebird.org; ecoregistros.org).

25. Un ejemplar fotografiado por Dante Insúa, Carlos Schmidutz, Sergio Castedo y Livio Blanco sobre la ruta nacional n°101, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de enero de 2022 (ebird.org/checklist/S103299601).

26. Un individuo observado por Agostina Juncosa y Valentín Zárate en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de enero de 2022 (ebird.org/checklist/S101309102).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Casi todos los registros del PN Iguazú, Misiones provienen del mismo sector sobre la ruta nacional n°101. Es probable que allí exista una pequeña población local y las fotografías publicadas correspondan a unos pocos individuos.

■ MOSQUETA OREJA NEGRA | *Phylloscartes paulista* | N R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y el extremo NE de Argentina. Mayormente por debajo de los 600 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada con dudas para Iguazú, Misiones (Zotta [1939] *Hornero* 7: 299-326).

2. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).

3. Un individuo anillado en el norte de Misiones en septiembre de 1978 (Arturo Tarak en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324). Posteriormente dicha localidad fue referida como PN Iguazú, Misiones (Juan C. Chebez en Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Cambridge).

4. Observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1982 (F. Moschione en Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

5. Un ejemplar colectado por Miguel Castelino y otros investigadores en la seccional Hidrómetro del PN Iguazú, Misiones el 29 de agosto de 1984. Esta quizás sea la fuente del comentario publicado años más tarde (Gustavo Iglesias en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA). El espécimen permaneció depositado en el CIES y posteriormente ingresado a la colección del MACN el 25 de septiembre de 2012 (M. Castelino *com. pers.*; Figura 37).

6. Observada por Samuel Narosky en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 1986 (S. Narosky en Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

7. Observada por Bret Whitney y Robert Barth en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1986 (B. Whitney y R. Barth en Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).

8. Observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1988 (F. Moschione en Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

9. Observada por Bernabé López-Lanús en el PN Iguazú, Misiones entre el 7 y el 25 de enero de 1990 (B. López-Lanús en Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

10. Registrada por Ernesto Krauczuk en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones en el año 1990 (E. Krauczuk en Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5).

11. Tres individuos observados en Puerto San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 20 de febrero 1992 (Giraud *et al.* [1993] *Nótulas Faunísticas* 49: 1-13).

12. Observada por Leonardo Pastorino en el PN Iguazú, Misiones en julio de 1992 (L. Pastorino en Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

13. Uno o dos individuos observados por Phil Benstead en el PN Iguazú, Misiones el 27 de agosto de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser Mergus octosetaceus in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).
14. Dos individuos observados por Juan Mazar Barnett en el PP de la Sierra Martínez Crovetto, Misiones el 11 de junio de 1994 (J. Mazar Barnett en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). Luego la localidad fue referida como Colonia Taranco, departamento Apóstoles, Misiones (Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
15. Tres individuos observados en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 3 de diciembre de 1994 (Ernesto Krauczuk en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
- 16-17. Registrada en dos ocasiones en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones durante el año 1996 (Ernesto Krauczuk en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
18. Un individuo observado en el PP Cruce Caballero, Misiones en marzo de 1997 (Bodrati & Cockle [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 243-258).
19. Registrada por Diego Serra en la RNE San Antonio, Misiones en el año 1998 (D. Serra en Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA).
20. Un individuo observado por Greg Roberts en el PN Iguazú, Misiones el 17 de enero de 1999 (G. Roberts en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
- 21-22. Un individuo y una pareja observados en el PP Cruce Caballero, Misiones el 22 y 23 de octubre de 2003 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
23. Un individuo observado por Carlos Ferrari en el PP Cruce Caballero, Misiones el 24 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S16018264).
24. Dos individuos observados por Christian Savigny en el PN Iguazú, Misiones el 16 de mayo de 2004 (Savigny [2013] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 124: 1-4).
25. Un individuo observado en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 6 de febrero de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*). En esta localidad se la encontró regularmente entre los años 2004 y 2007 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).
- 26-27. Registrada en la RNE San Antonio, Misiones el 4 y 9 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
28. Un individuo observado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 22, 24 y 27 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
29. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 5 de abril de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).



Figura 37. Mosqueta Oreja Negra *Phylloscartes paulista*, MACN-Or-72928, PN Iguazú, Misiones, 29 de agosto de 1984 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

30. Un ejemplar grabado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 4 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
 31. Un ejemplar grabado por Kristina Cockle en el PP Uruguayí, Misiones el 30 de mayo de 2005 (Cockle [2008] en López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).
 32. Un individuo observado vocalizando en la seccional Uruzú del PP Uruguayí, Misiones el 2 de junio de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
 33. Una pareja observada en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
 34. Un individuo observado por Carlos Ferrari en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 8 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S15620397).
 35. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso del PP Caá Yari, Misiones el 16 de octubre de 2007 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
 36. Dos ejemplares observados (uno de ellos grabado) por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso del PP Caá Yari, Misiones el 19 de octubre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).
 37. Dos individuos observados por Marcelo Allende en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 9 de junio de 2012 (ebird.org/checklist/S23722329).
 38. Un individuo observado por Sebastián Dardanelli en el PN Iguazú, Misiones el 18 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24308730).
 39. Un individuo observado por Frank Dijkstra y Guy Cox en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 2 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24778539).
 40. Un individuo observado por David Bell y Adam Timpf en la seccional Uruzú del PP Uruguayí, Misiones el 7 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S27529759).
 41. Un ejemplar fotografiado por Facundo Di Sallo en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 6 de agosto de 2020 (F. Di Sallo *in litt.*). Lamentablemente la calidad de la fotografía no permite una identificación segura.
- Comentarios:** Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). La observación referida a la RB Yaboty, Misiones en septiembre de 1994 (Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*; Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*) fue refutada por Sebastián Cabanne (*in litt.*). Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
- Especímenes (1):** MACN-Or-72928

■ MOSQUETA PICO PALA | *Todirostrum cinereum* | N

Distribución: Desde México y Centroamérica hasta gran parte de Sudamérica, mayormente periamazónica por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

- Registros:**
1. Un individuo observado por Andrés Bosso en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 11 de febrero y el 21 de marzo de 2001 (Bosso [2001] *Hornero* 16: 49-50).
 2. Un individuo observado por Germán Pugnali en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de marzo de 2003 (ebird.org/checklist/S26708113).
 3. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 3 de marzo de 2004 (Bodrati [2005] *Nuestras Aves* 50: 30-33).
 4. Registrada por Terry Rosenmeier en el PP Cañadón de Profundidad, Misiones el 20 de marzo de 2006 (ebird.org/checklist/S25662180).

5. Un ejemplar fotografiado por Gabriela Núñez Montellano en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de marzo de 2007. El mismo fue registrado regularmente durante ese año, hallándose una pareja con nido el 25 de noviembre (Núñez Montellano *et al.* [2009] *Cotinga* 31: 151-152).
6. Un individuo observado en Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones en abril de 2007 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
7. Un individuo observado por Facundo Gandoy en el PN Iguazú, Misiones el 15 de agosto de 2007 (ebird.org/checklist/S28229566).
8. PAREJAS nidificantes en el barrio de guardarques del PN Iguazú, Misiones entre los años 2008 y 2010 (Javier Cerutti en Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*; Pagano & Bodrati [2017] *Nuestras Aves* 62: 11-13).
9. Un individuo observado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 21 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S15741906).
10. Un ejemplar observado y grabado por Juan I. Areta y Alejandro Bodrati en la península Andre-sito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).
11. Un individuo observado por Santiago Imberti y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 7 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S27277881).
12. Un individuo observado por Daniel Almirón, Norberto Oste y Diego Monteleone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 5 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S26501348).
13. Un individuo observado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 10 de octubre de 2008 (ebird.org/checklist/S15740532).
14. Una pareja nidificante observada por Ramón Moller Jensen en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 15 de octubre de 2008 (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*).
15. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 28 de octubre de 2008 (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*).
16. Un ejemplar fotografiado por Rosana Ursino en el PN Iguazú, Misiones el 8 de abril de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=1212).
17. Registrada por Pablo Meoniz en el PN Iguazú, Misiones el 18 de abril de 2010 (ebird.org/checklist/S54930511).
18. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 4 y 5 de mayo de 2010 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).
19. Dos individuos observados por Joshua Stone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de julio de 2010 (ebird.org/checklist/S6623163).
20. Registrada por Gabriel San Juan en el lago Urugua-í, departamento Iguazú, Misiones el 29 de julio de 2010 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=11539).
21. Un individuo observado por Glenda Janca y otros observadores en el PN Iguazú, Misiones el 6 de agosto de 2010 (ebird.org/checklist/S6781323).
22. Un individuo observado por Matt Dufort en el PN Iguazú, Misiones el 20 de agosto de 2010 (ebird.org/checklist/S7213714).
23. Grabada y fotografiada por José Luis Merlo en el departamento Iguazú, Misiones entre el 21 y el 23 de septiembre de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=4075). La ubicación de estos registros no es precisa, existen fotos de la misma serie con diferentes fechas y localidades.
24. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 3 de diciembre de 2010 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).
25. Un individuo observado en Santa Rosa, departamento San Pedro, Misiones en febrero de 2011 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).
26. Un individuo observado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones en marzo de 2011 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).

27. Un ejemplar fotografiado por Diego Oscar y Rosana Ursino en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de marzo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=5219).

28. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2011 (ebird.org/checklist/S47197190).

29. Hallada por Ramón Moller Jensen nidificando en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones desde noviembre de 2011 en adelante (R. Moller Jensen en Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*).

30. Un ejemplar fotografiado por Lotfi Si Saber en el PN Iguazú, Misiones el 5 de enero de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=283275).

Comentarios: Esta especie ha colonizado en forma acelerada, aparentemente de norte a sur, el territorio de la provincia de Misiones y sus densidades han aumentado en las localidades donde fue inicialmente registrada (Pagano & Bodrati [2017] *op. cit.*). Un nido hallado por Marcelo Wioneczak en Posadas, departamento Capital, Misiones (Wioneczak [2018] *Nuestras Aves* 63: 14-15). Recientemente documentada en la provincia de Corrientes (Colina & Cibils [2019] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 283: 1-3; De Lucca & Demarco [2020] *Nuestras Aves* 65: 90).

■ FIOFÍO PARANAENSE | *Elaenia sordida* | N (CT)

Distribución: Amplia región del SE de Brasil incluyendo E de Paraguay y NE de Argentina, hasta los 2000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por John Zimmer ([1941] *American Museum Novitates* 1108: 1-23) con material proveniente de Franca, São Paulo, Brasil. Considerada tradicionalmente una subespecie del FIOFIO OSCURO *Elaenia obscura*. Trabajos moleculares recientes avalan el tratamiento de la subespecie *sordida* como especie válida (Rheindt *et al.* [2008] *BMC Evolutionary Biology* 8: 1193; Tang *et al.* [2018] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 127: 522-533), propuesta que fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop806.htm).

Comentarios: Una de las primeras menciones para nuestro país la realiza William Partridge ([1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153), quien describe cuatro machos colectados en el arroyo Urugua-í, Misiones en los años 1949 y 1951. En el mismo trabajo se comenta la existencia de otros cuatro especímenes provenientes de Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones. Para una revisión de las vocalizaciones ver Minns ([2017] *xeno-canto.org/article/218*).

■ DORADITO LIMÓN | *Pseudocolopteryx citreola* | N (CT)

Distribución: Centro de Chile y O de Argentina, entre los 300-1300 msnm (Ábalos & Areta [2009] *Ornitología Neotropical* 20: 215-230).

Taxonomía: Descripta por Ludwig Landbeck ([1864] *Archiv für Naturgeschichte* 30 [1]: 55-62) con material proveniente del valle del río Mapocho, Santiago, Chile. Nuevas investigaciones demuestran que la población occidental del DORADITO PAMPEANO *Pseudocolopteryx flaviventris* difiere en medidas y vocalizaciones de las del centro y este del país, pero al mismo tiempo son indistinguibles del taxón *citreola* (Ábalos & Areta [2009] *op. cit.*). El reconocimiento de esta forma como especie válida fue aceptado por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop420.htm).

Comentarios: La descripción original fue publicada en español por una revista científica chilena (Lan-

dbeck [1864] *Anales de la Universidad de Chile* 24: 336-348). La primera mención para Argentina la realiza Alexander Wetmore ([1926] *Bulletin of the United States National Museum* 133: 1-448), quien colectó especímenes en las provincias de Mendoza, Río Negro y Chubut. Para mayor información sobre identificación, comportamiento vocal, movimientos migratorios y filogenia ver López-Lanús *et al.* ([2010] *Boletín Chileno de Ornitología* 16: 51-58), Leiva & Bierig ([2014] *Natura Neotropicalis* 45: 87-95) y Jordan *et al.* ([2021] *Zoologica Scripta* 50: 173-192).

■ BENTEVEO DE BARBIJO | *Myiodynastes chrysocephalus* | N

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, mayormente entre los 1000-2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en Mesón de Condado, departamento Santa Victoria, Salta el 26 de enero de 1991 (López-Lanús [1992] *Hornero* 13: 258).

2-4. Registrada por Ignacio Roesler y Luciano Naka en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy en octubre de 2002. Además, Ignacio Roesler la observó en dicha localidad en enero de 2004 y en otras ocasiones posteriores (I. Roesler *in litt.*). Las grabaciones no fueron halladas en la MLNS.

4. Un adulto y tres juveniles observados por Flavio Moschione y José Segovia en la RP Las Lancitas, Jujuy el 29 de enero de 2004 (Segovia *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 23-25).

5. Un adulto y un juvenil observados y fotografiados por José Segovia, Patricio Ramírez Llorens y Mónica Camposano cerca del río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 21 de marzo de 2007 (Segovia *et al.* [2009] *op. cit.*).

6. Una pareja grabada por Fabricio Gorleri en el PN Calilegua, Jujuy el 6 de abril de 2007 (Segovia *et al.* [2009] *op. cit.*).

7. Un individuo observado por Fabricio Gorleri, Freddy Burgos y Rolando Guevara en el PN Calilegua, Jujuy el 8 de abril de 2007 (ebird.org/checklist/S10702182).

8. Un ejemplar grabado por Flavio Moschione en el río Cayotal a 500 m de su unión con el río Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de enero de 2009 (xeno-canto.org/292930).

9. Un individuo observado y escuchado por Germán Pugnali en el PN Calilegua, Jujuy el 21 de noviembre de 2010 (ebird.org/checklist/S26693335).

10. Un ejemplar grabado por Freddy Burgos en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 29 de diciembre de 2011 (ebird.org/checklist/S41730562).

11. Una pareja con nido fotografiada por Diego Monteleone y Cristina Pita en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de enero de 2013 (ebird.org/checklist/S26501264).

12. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg y Daniel Almirón en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 26 de diciembre de 2013 (ebird.org/checklist/S48243898).

13. Tres ejemplares fotografiados por William Legge arriba del PN Calilegua, departamento Valle Grande, Jujuy el 8 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26847946).

14. Dos individuos observados por José Segovia en la RP Las Lancitas, Jujuy el 12 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S48922880).

15. Un ejemplar grabado y fotografiado por Jorge La Grotteria y Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 29 de septiembre de 2016 (La Grotteria *et al.* [2017] *EcoRegistros Revista* 7: 55-58).

16. Dos individuos observados y escuchados por Julián Quillén Vidoz en el PN Calilegua, Jujuy el 14 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32168113).

17. Un ejemplar fotografiado por Matías Chávez en el río Jordan, departamento Valle Grande, Jujuy el 25 de octubre de 2016 (La Grotteria *et al.* [2017] *op. cit.*).

18. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en el PN Calilegua, Jujuy el 30 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S51521306).

19. Un ejemplar grabado por Francisco Cornell en San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 14 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S32668517).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Actualmente es una especie regularmente registrada en algunos sitios de las yungas argentinas, donde se la puede considerar un visitante estival nidificante.

■ BENTEVEO ALA ROJIZA | *Myiozetetes cayanensis* | N V

Distribución: Amplia distribución en el N de Sudamérica, mayormente por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Dos ejemplares escuchados y fotografiados por Oscar Rodríguez en el PN Iguazú, Misiones el 16 de junio de 2022 (ebird.org/checklist/S113074097). Al día siguiente uno de ellos fue grabado por Fernando Cabral en el mismo sitio (ebird.org).

Taxonomía: Para una discusión sobre identificación ver Restall ([2009] *Neotropical Birding* 5: 24-31).

Comentarios: Recientemente confirmada para Paraguay mediante registros documentados en los departamentos Canindeyú y Concepción (Smith *et al.* [2014] *Alauda* 82: 71-72).

■ VIUDITA ENMASCARADA | *Fluvicola nengeta* | N

Distribución: La subespecie nominal en el E de Brasil hasta São Paulo, por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar filmado por Ernesto Krauczuk, Daniel Kurday y Esteban Arzamendia en el PP Esmeralda, Misiones el 20 de marzo de 2002 (Krauczuk *et al.* [2003] *Lundiana* 4: 161).

2. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 19 de octubre de 2005 (Klavins & Bodrati [2007] *Hornero* 22: 43-45).

3. Un individuo observado por Dionisio Paniagua en el PN Iguazú, Misiones el 29 de julio de 2008 (ebird.org/checklist/S37194466).

4. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 18 de febrero de 2010 (Militello *et al.* [2010] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 44: 1-4).

5. Registrada por Alan Wilkinson en el PN Iguazú, Misiones el 4 de diciembre de 2010 (ebird.org/checklist/S60219606).

6. Registrada por Al Kirkley en el PN Iguazú, Misiones el 2 de enero de 2012 (ebird.org/checklist/S22375574).

7. Un ejemplar fotografiado en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones durante febrero y marzo de 2012 (La Grotteria *et al.* [2012] *EcoRegistros Revista* 2. Artículo 4: 1-6). Numerosas observaciones en la misma localidad hasta noviembre de 2018, e incluso se la halló nidificando en septiembre de 2015.

8. Un individuo observado por Marcos Lartigau en la reserva privada San José, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de febrero de 2014 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=182785).

9. Registrada por Julián Quillén Vidoz en el PN Iguazú, Misiones el 7 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S23834046).

10. Un individuo observado por Martín Toledo y Javier Poblete en el PN Iguazú, Misiones el 15 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24369715).
11. Un ejemplar fotografiado por Joel Martínez y Pedro Gauna en el complejo La Aventura, departamento Capital, Misiones el 1 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S29927505).
12. Un ejemplar fotografiado por Andrea Paniagua en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 4 de diciembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26257596).
13. Dos individuos observados por Warren Bielenberg en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 2017 (ebird.org/checklist/S38419678).
14. Un ejemplar fotografiado por Martjan Lammertink y Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 16 de octubre de 2017 (Fariña & Lammertink [2018] *Nuestras Aves* 63: 48-50).
15. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el balneario municipal de Aristóbulo del Valle, departamento Caingúas, Misiones el 31 de noviembre de 2017 (A. Bodrati en Fariña & Lammertink [2018] *op. cit.*).
16. Un individuo observado por Andrés Espindola en el PN Iguazú, Misiones el 24 de enero de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=682767).
17. Un ejemplar fotografiado por Sabina De Lucca en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 18 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49279739).
18. Un individuo observado por Cherry Williams y Fernando Cabral en el PN Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S64154640).
19. Un ejemplar observado y fotografiado por Vanesa Montañó en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 y 28 de julio de 2020 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=405991).
20. Un ejemplar fotografiado por Florencia Morinigo en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 2 de agosto de 2020 (ebird.org/checklist/S75101235).
21. Un ejemplar fotografiado por Haydee Cabassi y Claudia Castells en la reserva Arroyo Itá, departamento Capital, Misiones el 9 y 10 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S73392048). Probablemente el mismo fue relocalizado en el sitio el 16 de octubre de 2020 (ebird.org).

Comentarios: Especie de reciente aparición y franca expansión a través de las provincias de Misiones y extremo norte de Corrientes, donde se la continúa registrando con cierta regularidad.

■ MONJITA RABADILLA BLANCA | *Xolmis velatus* | N R

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro y E de Brasil, N de Bolivia y N de Paraguay hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Wioneczek, Luis Pradier, Luis Krause y Nicolás Pavese cerca de Rincón Ombú Chico, departamento Ituzaingó, Corrientes el 18 de octubre de 2015 (Wioneczek *et al.* [2018] *Nuestras Aves* 63: 8-10).

2. Un ejemplar fotografiado por Flávio Laube y un grupo de observadores cerca del paraje Uguay, departamento Mercedes, Corrientes el 16 de diciembre de 2018 (wikiaves.com.br/3221790; Adrian Eisen Rupp *in litt.*).

3. Un ejemplar filmado por Ernesto Krauczuk cerca de Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones el 18 de diciembre de 2018 (ecoregistros.org/site/video.php?id=3834).

4. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iberá, departamento Mercedes, Corrientes el 20 de febrero de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=317564).

5. Un ejemplar fotografiado por Daniel Almirón, Hugo Hulsberg, Javier Ubiria, Norberto Oste y Ce-

priano Oporto en Bahía Carayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 31 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S54501124). El mismo permaneció en el sitio al menos hasta julio de ese año, pudiendo ser registrado en numerosas ocasiones (ebird.org; ecoregistros.org).

6. Un ejemplar fotografiado por Carlos Carmona en Paso de los Oscars, departamento Salavina, Santiago del Estero el 9 de abril de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=326750).

7. Un ejemplar fotografiado por Antonio Gómez y María Pelozo sobre la ruta provincial n°40 entre Rincón del Socorro y Colonia Carlos Pellegrini, departamento Mercedes, Corrientes el 18 de agosto de 2019 (Gómez & Pelozo [2019] *Nuestras Aves* 64: 26).

8. Un ejemplar fotografiado por Marcelo Gavensky, Julián Baigorria y un grupo de observadores en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 23 y 24 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79955132).

9. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Battistino, Laura González y Gustavo Marino en la reserva natural Laguna El Palmar, departamento Vera, Santa Fe el 28 de agosto de 2021 (ebird.org/checklist/S94012509). El ave permaneció en el sitio al menos hasta octubre de ese año (ebird.org).

■ BURLISTO OLIVÁCEO | *Contopus cooperi* | N V

Distribución: Nidificante en una amplia región de Alaska, Canadá y el O de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el sur ocupando el NO y centro de Sudamérica (Altman & Sallabanks [2020] en Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Diego Ferrer en el PP Aconcagua, Mendoza el 11 de noviembre de 2014 (Ferrer [2015] *Hornero* 30: 25-27; Figura 38).



Figura 38. Burlisto Oliváceo *Contopus cooperi*, PP Aconcagua, Mendoza, 11 de noviembre de 2014 (Diego Ferrer)

■ **GOLONDRINA PURPÚREA** | *Progne subis* | **N V**

Distribución: Se reproduce en una extensa región del E de Estados Unidos, centro y SE de Canadá. Luego de la etapa reproductiva ocupa la mitad N de Sudamérica hasta el S de Brasil y N de Argentina (Brown & Tarof [2020] en Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Un macho de primer año observado en vuelo en Horseshoe Bay, islas Malvinas el 19 de octubre de 1972. El mismo fue hallado muerto por Vernon Steen y posteriormente medido e identificado por David Carstairs (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC; Mike Morrison *in litt.*). El espécimen aparentemente se encuentra perdido.

2. Cuatro machos y una hembra observados en la laguna de Pocho, departamento Pocho, Córdoba el 3 de noviembre de 1977 (Nores *et al.* [1983] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 56: 1-114).

3. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).

4. Mencionada como abundante en el centro y oeste de la provincia de Formosa en diciembre de 1982, sin más detalles (Ridgely & Tudor [1989] *The birds of South America*. Vol. 1. The oscine passerines. University of Texas Press; Robert Ridgely en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

5. Registrada en varias ocasiones por Pablo Michelutti en Miramar y la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba desde el año 1987 (P. Michelutti en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

6. Una bandada de 5000 individuos observada en Jujuy en el mes de diciembre, sin más detalles (Fjeldsø & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes*. University of Copenhagen).

7. Un individuo observado por Mark Van Beirs en el PN Iguazú, Misiones el 1 de diciembre de 1991 (M. Van Beirs en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

8. Un macho y varias hembras observados por Carlos Saibene en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1991 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

9. Una pareja observada por Flavio Moschione en Pipinas, partido de Punta Indio, Buenos Aires el 3 de noviembre de 1993 (F. Moschione en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

10. Una pareja observada por Ricardo Clark y Tom Gullick en el PN El Rey, Salta el 12 de diciembre de 1994 (R. Clark en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

11. Hallada con nido y fotografiada en Mendoza, sin más detalles (Elba Pescetti en Veiga *et al.* [2005] *Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución*. Editorial RyC).

12. Unos siete individuos observados por Flavio Moschione en Acambuco, departamento General José de San Martín, Salta el 22 de octubre de 2003 (Coconier *et al.* [2007] en Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).

13. Dos inmaduros observados y fotografiados por Mike Peake, Alan Henry, Mike Morrison y Sue Morrison en Puerto Stanley, islas Malvinas el 8 de octubre de 2004. Esto fue publicado como el primer registro confirmado de esta especie en las islas Malvinas (Black *et al.* [2005] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 5: 12-14; Mike Morrison *in litt.*), aunque las imágenes obtenidas no se encuentran disponibles.

14. Un grupo de siete individuos (cinco machos y dos hembras) fotografiado y grabado por Ignacio Roesler, Bernabé López-Lanús, Diego Monteleone y Eugenio Coconier en Acambuco, departamento General José de San Martín, Salta el 6 de octubre de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*; López-Lanús [2008] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).

15. Un grupo de 20 individuos observado por Flavio Moschione en Acambuco, departamento Ge-

neral José de San Martín, Salta entre el 22 y el 26 de enero de 2006 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*).
16. Mencionada sin detalles para la provincia de Catamarca (Carma [2009] *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. CFI).

17. Un grupo de 20 ejemplares fotografiado por Alejandro Espeche en el cruce de la ruta nacional n°50 y el río Pescado, departamento Orán, Salta el 29 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76844699).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Una pareja fotografiada en Yerba Buena, departamento homónimo, Tucumán en realidad se trata de la GOLONDRI-NA NEGRA *Progne elegans* (Aráoz & Ortiz [2007] *Xolmis* 3: 47-48). Los reportes estivales de *P. elegans* en la provincia de Misiones podrían ser confusiones con *P. subis* (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*), o con ejemplares melánicos de la GOLONDRI-NA DOMÉSTICA *Progne chalybea* (Ignacio Roesler *in litt.*). Registrada en numerosas ocasiones por Robert Clay en Asunción, Paraguay (ebird.org).

■ ZORZALITO COLORADO | *Catharus fuscescens* | N V

Distribución: Nidificante en una amplia franja sobre el límite entre Estados Unidos y Canadá. Luego de la etapa reproductiva migra hacia Sudamérica, llegando al N de Paraguay y S de Brasil (Heckscher *et al.* [2020] en Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1-2. Al parecer dos individuos distintos observados (uno fotografiado) por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en el PP Cruce Caballero, Misiones el 25 de octubre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *Hornero* 28: 79-83). Las fotografías obtenidas no aseguran que se trate de esta especie.

3. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 3 de noviembre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *op. cit.*).

4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 4 de noviembre de 2010 (Pagano *et al.* [2013] *op. cit.*).

5. Un ejemplar hallado muerto por Juan Klavins en la ciudad de Córdoba, departamento Capital, Córdoba el 17 de noviembre de 2020 (Klavins *en prep.*; ebird.org/checklist/S76493429). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 39).

Comentarios: La fecha publicada en internet para el ejemplar de Córdoba (ebird.org), no coincide con los datos de su etiqueta.

Especímenes (1): MACN-Or-74192



Figura 39. Zorzalito Colorado *Catharus fuscescens*, MACN-Or-74192, ciudad de Córdoba, Córdoba, 17 de noviembre de 2020 (Diego Monteleone)