

■ ZORZAL CHOCOLATE | *Turdus fumigatus* | N R

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa la franja costera del E de Brasil, por debajo de los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1-3. Registrada por Eduardo Militello en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en agosto de 2011, diciembre de 2012 y entre octubre y noviembre de 2013 (Militello [2016] *EcoRegistros Revista* 6: 6-10; ebird.org).

4. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman en El Soberbio, departamento Guaraní, Misiones el 14 de noviembre de 2014 (M. Pearman *in litt.*).

5. Un individuo observado por Martín Toledo, David Álvarez, Javier Poblete y Juan Klavins en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 16 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24289086).

6. Un ejemplar fotografiado por Diego Villalba en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de julio de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=112947).

7. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Durán en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de octubre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=124084).

8. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Marcaida en la posada La Misión, departamento Guaraní, Misiones el 28 de noviembre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=128715).

9. Un adulto observado por Luis Pagano entre los cruces de las rutas provinciales n°2 y n°103 cerca de Barra Bonita, departamento 25 de Mayo, Misiones el 20 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

10. Un ejemplar fotografiado por Federico Villegas en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 12 de julio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=276000).

11. Un adulto observado por Luis Pagano en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 13 de octubre de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).

12. Un ejemplar fotografiado por Patricia Leiva en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 14 de noviembre de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=362197).

13. Un ejemplar fotografiado por Marcos Sosa en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones, el 19 de diciembre de 2019 (ebird.org/checklist/S70558221).

Comentarios: Existe la posibilidad de que algunas aves reportadas en realidad correspondan a variaciones cromáticas del ZORZAL SABIÁ *Turdus leucomelas*.

■ TENCA | *Mimus thenca* | N

Distribución: Endémica del centro de Chile hasta los 2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Félix Seró López en Las Ovejas, departamento Minas, Neuquén el 15 de diciembre de 2006 (Matarasso & Seró López [2008] *Hornero* 23: 41-43).

2-3. Dos grupos registrados cerca de Las Ovejas, departamento Minas, Neuquén el 15 de marzo de 2007 (Matarasso & Seró López [2008] *op. cit.*).

4. Un total de cuatro ejemplares observados y fotografiados en Andacollo, departamento Minas, Neuquén el 17 de marzo de 2007 (Matarasso & Seró López [2008] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Pablo Moreno en el PP Tromen, Neuquén el 12 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S35338454).

6. Un individuo observado por Silvio Montani en la RP Lagunas de Epu Lauquen, Neuquén el 12 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S102489424).

7. Un individuo observado por Javier de Leonardis en la laguna de Esquel, departamento Cushamen, Chubut el 15 de febrero de 2014 (ebird.org/checklist/S17988332).
 8. Cinco ejemplares fotografiados por Jorge Veiga y José Luis Pérez sobre la ruta provincial n°21 al norte de Loncopué, departamento Ñorquín, Neuquén el 21 de febrero de 2014 (Veiga & Pérez [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 158: 1-5).
 - 9-10. Varios ejemplares fotografiados por Sergio y Eduardo Cusano en la seccional Paimún del PN Lanín, Neuquén el 26 de julio y el 8 de agosto de 2014 (Cusano & Cusano [2015] *EcoRegistros Revista* 5: 49-53).
 11. Un ejemplar fotografiado por Nahuel Aguirre en Puerto Patriada, departamento Cushamen, Chubut el 20 de noviembre de 2014 (ebird.org/checklist/S494749600).
 12. Un ejemplar fotografiado por Santiago Torres en la RP Lagunas de Epu Lauquen, Neuquén el 27 de noviembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=70537).
 - 13-15. Varios ejemplares fotografiados por Sergio y Eduardo Cusano en la seccional Paimún del PN Lanín, Neuquén el 22 de julio, 29 de julio y 4 de agosto de 2015 (Cusano & Cusano [2015] *op. cit.*).
 16. Un ejemplar fotografiado por Julián Quillén Vidóz en Cerro Pirque, departamento Cushamen, Chubut el 19 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26016971). Por el momento la imagen no se encuentra disponible.
 17. Dos individuos observados por Neli Jorquera en La Matancilla, departamento Minas, Neuquén el 21 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S25974562).
 18. Tres individuos observados (uno fotografiado) por Julián Quillén Vidóz al sur de Esquel, departamento Futaleufú, Chubut el 24 de noviembre de 2015 (ebird.org/checklist/S26017747).
 19. Un individuo observado por Julián Quillén Vidóz en Trevelin, departamento Futaleufú, Chubut el 28 de agosto de 2016 (ebird.org/checklist/S32897176).
 20. Un ejemplar fotografiado por Miguel Bean en Trevelin, departamento Futaleufú, Chubut el 24 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S34213543).
- Comentarios:** Matarasso & Seró López ([2008] *op. cit.*) comentan que la especie es registrada diariamente en Las Ovejas, Neuquén y reportan además el hallazgo de dos nidos en esa localidad. Omitimos las reiteradas observaciones provenientes de Las Ovejas y Andacollo, Neuquén.

■ CACHILO YUNGUEÑO | *Rhynchospiza dabbenei* | N (CT)

Distribución: Prácticamente endémica de Argentina en las serranías orientales de Salta, Jujuy y Tucumán (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por Charles Hellmayr ([1912] *Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern* 11: 187-190) con material colectado en Tapia, departamento Trancas, Tucumán. Considerado tradicionalmente una subespecie del CACHILO CORONA CASTAÑA *Rhynchospiza strigiceps*. Areta et al. ([2019] *Journal of Ornithology* 160: 973-991) realizan un análisis de las poblaciones y determinan que la subespecie *dabbenei* merece ser elevada a rango específico debido a diferencias vocales y morfológicas. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop842.htm).

Comentarios: Las primeras menciones provienen de las provincias de Salta (Salvadori [1895] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 10 [208]: 1-24) y Tucumán (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. Serie 3. Tomo 1:* 169-221). Para una revisión de los antiguos registros ver Navas ([1965] *Hornero* 10: 215-224).

■ CERQUERO MUSGOSO | *Arremon dorbignii* | N (CT)

Distribución: Andes desde Bolivia hasta el NO de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por Philip Sclater ([1856] *Proceedings of the Zoological Society of London* 24: 269-272) con material proveniente Bolivia, y considerada tradicionalmente una subespecie del CERQUERO DE COLLAR *Arremon flavirostris*. Cardoso da Silva ([1991] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 111: 152-155) sugiere el estatus específico para la subespecie *dorbignii*. Más recientemente, Buainain et al. ([2016] *Zootaxa* 4178: 547-567) y Trujillo-Arias et al. ([2017] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 112: 107-121) confirman esta hipótesis mediante análisis moleculares, morfología y vocalizaciones. Estos estudios y sus conclusiones fueron aceptados por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop874.htm).

Comentarios: Habitual en las yungas argentinas y áreas de transición con el Chaco Seco, con antiguas menciones para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (White [1882] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591-629; Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Bruch [1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259; Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267).

■ ARAÑERO AMERICANO (Arañero Yanqui) | *Setophaga ruticilla* | N V

Distribución: Se reproduce en gran parte de Canadá, N y E de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva se desplaza ocupando el S de México, Centroamérica y el N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un individuo observado por Paula Bertolini y otros observadores en la RM Ribera Norte, partido de San Isidro, Buenos Aires el 17 y 20 de julio de 1995 (Bertolini et al. [1995] Informe Inédito; Gasparri et al. [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 234: 1-43).

2. Un macho fotografiado por Mike McRae y Nikki Summers en Cape Dolphin, islas Malvinas el 3 y 4 de diciembre de 2014. El ave fue vista por última vez en la zona el 17 de febrero de 2015 (Morrison [2015] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2014*. Falklands Conservation; Morrison [2016] *Wild-life Conservation in the Falkland Islands* 24: 10-11; ebird.org/checklist/S44080988).

3. Un macho fotografiado por Bobby & Janet McLeod en Puerto Stanley, islas Malvinas el 26 de diciembre de 2014. Fue visto en esa localidad hasta junio de 2015, y finalmente hallado muerto por Colin Smith el 23 de agosto del mismo año (Morrison [2015] *op. cit.*; Morrison [2016] *op. cit.*).

4. Un macho adulto fotografiado por Alan Henry en Douglas, islas Malvinas el 26 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61767730).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ FUEGUERO BOREAL | *Piranga olivacea* | N V

Distribución: Nidifica en una amplia zona del NE de Estados Unidos y parte de Canadá. Durante la época no reproductiva ocupa el NO de Sudamérica llegando al centro de Bolivia (Mowbray [2020] en Poole & Gill [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Ricardo Fernández en la laguna Las Encadenadas, partido de Saavedra, Buenos Aires el 19 de marzo de 2017 (Fernández [2017] *EcoRegistros Revista* 7: 51-54).



Figura 40. Fuego Boreal *Piranga olivacea*, Quequén, Buenos Aires, 10 de mayo de 2020 (Matías Torreguitar)

2. Un ejemplar fotografiado por Matías Torreguitar en Quequén, partido de Necochea, Buenos Aires entre el 8 y el 17 de mayo de 2020 (Torreguitar [2020] *Nuestras Aves* 65: 91; Figura 40).

■ SAÍ GRANDE (Saí Gigante) | *Conirostrum binghami* | N R

Distribución: Local en los altos Andes desde el S de Colombia hasta el extremo N de Chile y O de Bolivia, mayormente entre los 3500-4200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Juan Mazar Barnett, Germán Pugnali y Marco della Seta unos 10 km al oeste de Rodeo Pampa, departamento Santa Victoria, Salta el 26 de septiembre de 1997 (Mazar Barnett *et al.* [1998] *Hornero* 15: 44-46).

2. Un individuo observado por Alejandra Gri-goli en el queñol de Santa Catalina, departamento homónimo, Jujuy sin fecha (Moschione [2005] en Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

3. Un individuo observado por Flavio Moschione en Lesser, departamento La Caldera, Salta sin fecha (Flavio Moschione *in litt.*).



Figura 41. Saí Grande *Conirostrum binghami*, municipio de Abra Pampa, Jujuy, julio de 2017 (Uriel Colina)

4. Un adulto fotografiado por Uriel Colina en el “municipio de Abra Pampa, departamento Cochino”, Jujuy en julio de 2017 (U. Colina *in litt.*; Figura 41). La fotografía fue presentada sin ninguna referencia (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones), siendo indispensable que se publiquen más detalles acerca de este registro.

Taxonomía: Conocida anteriormente como *Oreomanes fraseri* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La mención para “río Senguer, Salta” (López-Lanús [2017] *op. cit.*) es un error (Flavio Moschione *in litt.*).

■ JILGUERO DEL MONTE | *Sicalis mendozae* | N (CT)

Distribución: Endémica del desierto del Monte en el O de Argentina, desde Tucumán hasta el S de Mendoza (Areta *et al.* [2012] *Condor* 114: 654-671).

Taxonomía: Descrita por Richard Sharpe en base a dos ejemplares colectados por Hermann Burmeister en la provincia de Mendoza (Burmeister [1860] *Journal für Ornithologie* 46: 241-268; Sharpe [1888] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 12. London). Considerada posteriormente una subespecie del JILGUERO OLIVÁCEO *Sicalis olivascens*. Areta *et al.* ([2012] *op. cit.*) revisan la historia taxonómica y presentan datos que apoyan el reconocimiento de *mendozae* como especie válida. Dicha propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop539.htm).

■ FUEGUERO OSCURO | *Ramphocelus carbo* | N R

Distribución: Ampliamente distribuida en Sudamérica por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Registrada por Mark Scheuerman en el PN Iguazú, Misiones el 12 de agosto de 1997 (ebird.org/checklist/S5824489).

2. Un individuo observado por Germán Pugnali en el PN Iguazú, Misiones el 19 de junio de 2005 (ebird.org/checklist/S26781813).

3. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en el PN Iguazú, Misiones el 14 de junio de 2006 (Moller Jensen [2006] *Nuestras Aves* 52: 33-34).

4. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Roesler en el PN Iguazú, Misiones sin fecha (I. Roesler *in litt.*).

5. Registrada por Dave Winter en el PN Iguazú, Misiones el 22 de diciembre de 2006 (ebird.org/checklist/S48257403).

6. Un ejemplar fotografiado por Ryan Terrill en el PN Iguazú, Misiones el 29 y 30 de julio de 2007 (ebird.org/checklist/S38099378).

7. Un individuo observado por Esteban Daniels en el PN Iguazú, Misiones el 4 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S21517445).

8. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 20 de octubre de 2009 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=11391).

9. Un individuo observado por Vicki Sandage en el PN Iguazú, Misiones el 12 de diciembre de 2009 (ebird.org/checklist/S7666097).

10. Registrada por Paul Brookes en el PN Iguazú, Misiones el 3 de diciembre de 2010 (ebird.org/checklist/S16706067).

11. Un ejemplar fotografiado por Federico Villegas en la posada La Misión, departamento Guaraní, Misiones el 21 de enero de 2014 (Villegas [2014] *EcoRegistros Revista* 4: 11-13).

12. Un individuo observado por Marcelo Gavensky en el PP de la Araucaria, Misiones el 9 de diciembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=855655).

13. Un individuo observado por Martín López Aguirre en el PN Iguazú, Misiones el 18 de marzo de 2022 (ebird.org/checklist/S105506657).

Comentarios: Es altamente probable que algunos registros del PN Iguazú, Misiones correspondan al mismo individuo. Un ejemplar fotografiado en varias ocasiones por Adrián Heredia en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones parece ser un híbrido entre esta especie y un FRUTERO CORONADO *Tachyphonus coronatus* (A. Heredia *in litt.*).

■ MIELERO PATAS ROJAS | *Cyanerpes cyaneus* | N V

Distribución: Mayormente en el NO de Sudamérica y la región amazónica, con una población disyunta en las selvas costeras de Brasil hasta Santa Catarina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un inmaduro fotografiado por Sandra Antueno en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 28 de julio de 2018 (S. Antueno *in litt.*; Figura 42).

2. Un adulto fotografiado por Sandra Antueno en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 20 y 22 de agosto de 2018 (S. Antueno *in litt.*; Figura 43).

Comentarios: Un ejemplar fotografiado por Chris Farias en Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil el 29 de abril de 2020 (ebird.org/checklist/S68074796).



Figura 42. Mielero Patas Rojas *Cyanerpes cyaneus*, Eldorado, Misiones, 28 de julio de 2018 (Sandra Antueno)



Figura 43. Mielero Patas Rojas *Cyanerpes cyaneus*, Eldorado, Misiones, 20 de agosto de 2018 (Sandra Antueno)

■ CAPUCHINO IBERÁ | *Sporophila iberaensis* | N

Distribución: Localmente común en el N de Corrientes, centro y S de Paraguay y unos pocos sitios del centro de Brasil (Galluppi-Selich *et al.* [2018] *Revista Brasileira de Ornitologia* 26: 234-239).

Registros: 1. Dos individuos observados por Adrián Di Giacomo 14 km al sur de Galarza (28°12'55"S 56°43'32"W), departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de octubre de 2001 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *Nuestras Aves* 61: 3-5).

2. Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian ([2016] *op. cit.*) mencionan un total de 45 registros de su autoría y otros 57 registros de otros observadores, casi todos en las cuencas del río Aguapey y los Esteros del Iberá, Corrientes. El detalle de estos registros no fue publicado en dicho trabajo, y la fotografía que acompaña el artículo no posee fecha ni localidad.

3. Varios ejemplares grabados por Juan I. Areta en la estancia Rincón del Socorro, departamento Mercedes, Corrientes durante noviembre de 2005 (Areta *et al.* [2016] *PLoS ONE* 11: 10.1371/journal.pone.0154231). Dichos autores sospechan que este taxón podría representar un morfo de alguna especie ya descrita (Areta *et al.* [2016] *op. cit.*).

4. Un ejemplar fotografiado por Jorge Spinuzza en el arroyo Ayuí, Corrientes en diciembre de 2006 (J. Spinuzza en Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).

5. Un ejemplar filmado y fotografiado por Germán Pugnali cerca de Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 1 de octubre de 2008 (ebird.org/checklist/S41076887).

6. Un ejemplar fotografiado por Alec Earnshaw en el estero Cambá Trapo, departamento San Martín, Corrientes el 4 de enero de 2009 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=146891).

7-8. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 27 y 28 de diciembre de 2010 (López-Lanús [2013] *Sonidos de las Aves de Pastizal*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas; xeno-canto.org).

9. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 11 de febrero de 2011 (xeno-canto.org).

10. Un macho adulto colectado por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 19 de febrero de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). El espécimen (holotipo) se encuentra depositado en el MACN.

11. Numerosos ejemplares grabados por Bernabé López-Lanús en la estancia San Alonso, departamento Concepción, Corrientes el 20 de febrero de 2011 (xeno-canto.org).

12. Un individuo escuchado en la estancia La Sirena, departamento San Martín, Corrientes el 26 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] en Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).

13-14. Tres machos y al menos una hembra grabados y fotografiados por Bernabé López-Lanús, Adrián Galimberti y Alexander Keyel en la entrada de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes el 29 y 30 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *op. cit.*; xeno-canto.org).

15. Dos machos observados por Bernabé López-Lanús, Adrián Galimberti y Alexander Keyel unos 2,5 km al oeste de la entrada de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes el 30 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] *op. cit.*).

16. Un macho adulto colectado por Bernabé López-Lanús cerca de la estancia Don Luis, departamento Ituzaingó, Corrientes el 13 de diciembre de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). El espécimen (paratipo) se encuentra depositado en el MACN, y su vocalización muy probablemente corresponda al corte publicado en internet (xeno-canto.org/307510).

17. Un macho adulto grabado y colectado por Adrián Di Giacomo, Bernabé López-Lanús y Cecilia Kopuchian en la estancia El Tránsito, departamento Concepción, Corrientes el 15 de diciembre de 2011 (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*; xeno-canto.org/307513). El espécimen (paratipo) se encuentra depositado en el MACN.

Taxonomía: Recientemente descrita en base a diferencias de plumaje y vocalizaciones (Di Giacomo & Kopuchian [2016] *op. cit.*). La descripción previa y el nombre *Sporophila digiacomoi* no fueron reconocidos (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop715.htm). El nombre *Sporophila digiacomoi* (=

Sporophila digiacomorum) debe considerarse sinónimo de *S. iberaensis*, ya que su descripción no se ajusta al CINZ y ambos están basados en la misma serie tipo. Para una discusión sobre especiación y aislamiento reproductivo en *S. iberaensis* ver Turbek *et al.* ([2021] *Science* 371: eabc0256).

Especímenes (3): MACN-Or-72854 (holotipo), MACN-Or-72855, MACN-Or-72856 (paratipos)

■ CAPUCHINO VIENTRE NEGRO | *Sporophila melanogaster* | N V

Distribución: Endémica de las sabanas del SE de Brasil, nidificando regularmente en Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho fotografiado por Julián Baigorria y otros observadores en la reserva Urutaú, departamento Candelaria, Misiones el 21 y 23 de noviembre de 2017 (Baigorria *et al.* [2020] *Hornero* 35: 141-145; Figura 44).



Figura 44. Capuchino Vientre Negro *Sporophila melanogaster*, reserva Urutaú, Misiones, 21 de noviembre de 2017 (Julián Baigorria)

■ CHOGÜÍ OLIVÁCEO (Celestino Oliváceo) | *Thraupis palmarum* | N

Distribución: Desde Centroamérica hasta la región SE de Brasil, mayormente por debajo de los 1300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

- Registros:** 1. Un individuo observado por John Mc Donald en el PN Iguazú, Misiones el 20 de julio de 1989 (Finch [1991] *Nuestras Aves* 24: 24-25).
2. Dos individuos observados por Flavio Moschione en la RN Formosa, Formosa el 13 de enero de 1995 (F. Moschione en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).
3. Un individuo observado por Esteban Abadie en el PN Iguazú, Misiones el 15 de septiembre de 1995 (E. Abadie en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
4. Un individuo observado por Dante Insúa en Puerto Península, departamento Iguazú, Misiones el 26 de enero de 1996 (D. Insúa en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).
5. Observada por Juan C. Chebez en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1996 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
6. Un individuo observado por Enrique Bertolotto en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en julio de 2004 (Monteleone *et al.* [2010] *Nuestras Aves* 55: 25-28).
7. Un individuo observado por Pablo Grilli en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 9 de abril de 2005 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
8. Un individuo observado por Juan I. Areta en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de noviembre de 2006 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
9. Observada por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de septiembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
10. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Roesler y Diego Monteleone en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de septiembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
11. Dos individuos observados por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de octubre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
12. Cuatro individuos observados por Daniel Almirón en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 de octubre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
13. Un individuo observado por James Lowen en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de noviembre de 2008 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
14. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 8 de mayo de 2009 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
15. Un individuo observado por Juan I. Areta en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 26 de noviembre de 2009 (Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*).
16. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 20 de mayo de 2011 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=274116).
17. Un ejemplar fotografiado por Hugo Hulsberg en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2011 (ebird.org/checklist/S47197190).
18. Registrada por Marcos Lartigau en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 27 de septiembre de 2014 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=182140).
19. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 22 de junio de 2015 (ebird.org/checklist/S24007512).
20. Dos individuos observados por Julián Quillén Vidoz en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S32938767).
21. Un individuo observado por Eric Gulson y Teresa Pegan en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 26 de enero de 2017 (ebird.org/checklist/S33997649).
22. Un individuo observado por Ignacio Roesler en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38550798).
23. Un individuo observado por Pablo Grilli en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S47618782).
- 24-25. Fotografiada por Sebastián Cabanne en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 15 y

17 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38660534; ebird.org/checklist/S38785023).

26. Dos individuos observados por Ulises Ornstein y Paula Polleri en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 13 de septiembre de 2017 (ebird.org/checklist/S39165813).

27. Un ejemplar fotografiado por Dolores Fernández en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de junio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=272831).

28. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Marcaida en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 1 de julio de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=275357).

29. Un ejemplar fotografiado por Deanna Mac Phail en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de noviembre de 2018 (ebird.org/checklist/S51401104).

30. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Andrés Terán en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 1 de julio de 2019 (ebird.org/checklist/S57924002).

31. Dos individuos observados por Jorge La Grotteria en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 31 de julio de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=954951).

32. Un ejemplar fotografiado por Gabriel Moresco en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 8 de agosto de 2019 (ebird.org/checklist/S58845554).

Comentarios: Considerada hipotética por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*). Había sido mencionada para la RN Formosa, Formosa (Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA) y posteriormente ratificado como un error (Hernán Povedano en Monteleone *et al.* [2010] *op. cit.*). Incluida sin detalles en la lista de aves de la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo). Arnaldo de Winkelried Bertoni la registra por primera vez para Paraguay en la localidad fronteriza de Puerto Bertoni, Alto Paraná en agosto de 1917 (Bertoni [1919] *Hornero* 1: 255-259).



ESPECIES RARAS Y VAGANTES

En Argentina existen 123 especies que a nuestro criterio son *raras* o *vagantes*. Estas poseen menos de 10 (diez) registros documentados en total o en los últimos 50 años (*i.e.* a partir de 1972). En el caso de las *raras* suponemos que son residentes en el territorio nacional, o que al menos llegaban con cierta regularidad en el pasado. Por el contrario, la presencia de las especies *vagantes* es meramente accidental o errática. Las especies raras recientemente incorporadas a la lista nacional, se detallan en la sección Nuevas. A pesar de que algunas queden apenas afuera de esta categoría y dejen de ser raras en el futuro, preferimos incorporarlas a nuestra revisión por resultar de interés conservacionista. Se incluyen aquellas consideradas extintas o probablemente extintas a nivel nacional o global.

■ INAMBÚ ENANO | *Taoniscus nanus* | R

Distribución: Especie típica del cerrado en el SE de Brasil y NE de Argentina (Cabot [1992] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Una hembra colectada por Noel Holden en la “Costa del Río Bermejo, Chaco Austral, Rep. Argentina” en el año 1900 (Collar & Andrew [1988] *Birds to Watch. The ICBP World Checklist of Threatened Birds*. ICBP Technical Publication N°8). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 45).

2. Una hembra colectada por Noel Holden en “Chaco Austral, Río Bermejo, R. Argentina” en el año 1901 (Collar & Andrew [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

Comentarios: Félix de Azara conocía muy bien esta especie e incluso tuvo algunos ejemplares cautivos. Este autor lo describe como “muy escaso en dichas Misiones”, sin precisar si corresponde a Argentina o Paraguay (Azara [1805] *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Rio de la Plata* III. Madrid). Luego la especie es incluida para Argentina por José Pereyra ([1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40) y Claës Olrog ([1959] *Las aves argentinas*. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Miguel Lillo) como habitante de la provincia de Misiones. Juan C. Chebez ([1996] *Fauna Misionera*. LOLA) asume que estos autores malinterpretaron la referencia de Félix de Azara. Actualmente se considera como localidad tipo a Misiones, Paraguay (Silveira & Silveira [1998] *Cotinga* 9: 42-46). Considerada Extinta a nivel nacional (MAYDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (2): NHMUK-1900.12.22.1, NHMUK-1901.4.21.6



Figura 45. Inambú Enano *Taoniscus nanus*, NHMUK-1900.12.22.1, costa del río Bermejo, Chaco Austral, año 1900 (The Natural History Museum)

■ PATO MEDIA LUNA | *Spatula discors* | V

Distribución: Su área de cría comprende desde Alaska hasta el centro de Estados Unidos. Luego realiza una migración cubriendo el S de Estados Unidos, México, el Caribe y N de Sudamérica (Carboneras [1992] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Dos individuos capturados vivos por Héctor Bersezio en Chilecito, departamento homónimo, La Rioja en septiembre de 1958. Uno de ellos fue entregado a César Guerrero, formando parte de su colección personal de aves (Navas [1961] *Neotrópica* 7: 52). La fotografía no se encuentra disponible.

2. Una pareja observada en vuelo (macho colectado) por Dora Ochoa de Masramón en el dique de Renca, departamento Chacabuco, San Luis el 27 de noviembre de 1960 (Bó [1965] *Hornero* 10: 251-268). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
3. Un macho adulto observado por Robert Storer y Frank Gill en la estancia La Segunda, partido de Chascomús, Buenos Aires el 3 de septiembre de 1961 (Storer & Gill [1961] *Neotrópica* 7: 92).
4. Un macho observado por Jeremy Tallowin en las islas Georgias del Sur en abril de 1972. El ave luego fue colectada en Cumberland Bay, Georgias del Sur el 20 de junio del mismo año (Prince & Payne [1979] *British Antarctic Survey Bulletin* 48: 103-118). El espécimen aparentemente no fue conservado.
5. Mencionada sin detalles para la provincia de Santa Fe (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
6. Registrada en el lago Pellegrini, departamento General Roca, Río Negro (Canevari [1979] *1er. Encuentro Iberoamericano de Ornitología y Mundial sobre Ecología y Comportamiento de las Aves*. Buenos Aires).
7. Un macho observado por Manuel Nores, Darío Yzurieta, Claës Olrog y Sergio Salvador en los bañados de Figueroa, departamento Figueroa, Santiago del Estero a mediados de julio de 1980 (Nores & Yzurieta [1981] *Historia Natural* 2: 33-42).
8. Un macho adulto observado por Mauricio Rumboll en la laguna Los Escarchados, departamento Lago Argentino, Santa Cruz en noviembre de 1985 (Rumboll [1991] *Nuestras Aves* 24: 23).
9. Una pareja observada por Julio Contreras en el sur de la provincia de Entre Ríos en noviembre de 1987 (J. Contreras en de la Peña [1997] *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. LOLA).
10. Un macho cazado unos 6 km al noroeste de Etruria, departamento San Martín, Córdoba el 12 de mayo de 1989 (Salvador & Salvador [1990] *Hornero* 13: 178-179). El espécimen no fue conservado (S. Salvador com. pers.).
11. Registrada en la Lagunilla, departamento Capital, Salta entre los años 1990 y 1992 (Gonzo & Mosqueira [1993] *VIII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú).
12. Un macho volando en compañía de tres hembras en el bañado de Añatuya, departamentos General Taboada y Avellaneda, Santiago del Estero entre el 9 y el 14 de julio de 1992 (Sferco & Baldo [1995] *Hornero* 14: 78-79).
13. Tres ejemplares observados por Christian Savigny y Rogelio Ymbernón en la laguna de los Padres, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 11 de julio de 1992 (Savigny [2002] *Nuestras Aves* 43: 24-25).
14. Mencionada sin detalles para San Miguel del Monte, partido homónimo, Buenos Aires (Jorge Rodríguez Mata en Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).
15. Un grupo de once individuos observado por Pablo Michelutti en el tramo final del río Suquia, departamento Río Primero, Córdoba el 25 de febrero de 1994 (P. Michelutti en Yzurieta [1995] *Manual de Reconocimiento y Evaluación Ecológica de las Aves de Córdoba*. Gobierno de Córdoba). Luego Ricardo Torres y Pablo Michelutti ([2001] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 1: 1-5) mencionan que se observó “un individuo” en la misma fecha y localidad.
16. Mencionada sin detalles para la laguna Llancanelo, departamento Malargüe, Mendoza (Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75).
17. Un macho observado por Marcelo Dolsan en la reserva Parque Luro, departamento Toay, La Pampa en diciembre de 1996 (Cenizo et al. [2019] *XVIII Reunión Argentina de Ornitología*. Tandil).
18. Una pareja observada por Federico Bruno en el parque Don Tomás, departamento Capital, La Pampa el 14 de noviembre de 1999 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros; Darrieu et al. [2011] *Opera Lilloana* 55: 64-108).
19. Mencionada sin detalles para la provincia de Catamarca (Carma [2009] *Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. CFI).
20. Un individuo observado por Sandra Delgado, Carlos Marchisio y Marta Cortéz en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, departamento Capital, Córdoba el 14 de febrero de 2000 (Nores & Serra [2005] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004*. Wetlands International).

21. Dos hembras observadas por Mariano Gelain y Roberto Orduna en la laguna Los Juncos, departamento Pilcaniyeu, Río Negro el 20 de enero de 2002 (Gelain & Orduna [2006] *Xolmis* 1: 4).
 22. Mencionada sin detalles para el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre los años 2008 y 2011 (Moschione *et al.* [2011] *Aves Argentinas* 30: 14-17).
 23. Un macho observado en vuelo por Julián Hernández en la laguna del Burro, partido de Chascomús, Buenos Aires el 2 de febrero de 2011 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=29543).
 24. Un macho fotografiado por Robert Lewis en Grytviken, Georgias del Sur el 26 de octubre de 2012 (ebird.org/checklist/S23520785).
 25. Un individuo observado en vuelo por Marcelo Gavensky en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 24 de enero de 2014 (Pugnali *et al.* [2016] *Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur*. *Aves Argentinas*; ecoregistros.org/site/registro.php?id=102280).
 26. Un macho adulto fotografiado por Guillermo Rost en Rada Tilly, departamento Escalante, Chubut el 8 y 9 de noviembre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=124820).
 27. Un macho fotografiado por Ignacio Roesler en la estancia La Vizcaína, departamento Lago Buenos Aires, Santa Cruz el 12 de diciembre de 2015 (Martín *et al.* [2019] *XVIII Reunión Argentina de Ornitología*. Tandil; ebird.org/checklist/S26398783).
 28. Registrada por José Segovia y otros observadores en la finca del Toro, departamento Rosario de Lerma, Salta en febrero de 2018 (ver detalles en ebird.org/checklist/S57085922).
 29. Un macho fotografiado por José Navarro en el dique Los Quiroga, departamento Banda, Santiago del Estero el 29 de julio de 2018 (ebird.org/checklist/S47532805). El ejemplar permaneció algunas semanas en el lugar y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).
 30. Un macho observado por José Segovia, Flavio Moschione, Ana Sureda y Azucena Rodríguez en la finca del Toro, departamento Rosario de Lerma, Salta el 10 de febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S57085922).
 31. Seis individuos observados por Héctor Inchaurreaga en la ruta provincial n°24, departamento Sarmiento, Chubut el 17 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S64708265). Este registro fue desestimado por Roesler *et al.* (*en prep.*).
 32. Un macho fotografiado por Alan Henry en Gull Island Pond, islas Malvinas el 28 de mayo de 2020 (ebird.org/checklist/S69761510). El ejemplar permaneció al menos hasta el 25 de julio del mismo año (ebird.org).
 33. Una pareja fotografiada por Yanina Romero en el dique Los Molinos, departamento Capital, Jujuy el 20 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S82780610).
 34. Un ejemplar fotografiado por Hugo Valderrey en la laguna Delfín Pérez, departamento Maracó, La Pampa el 17 de febrero de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=446255).
- Taxonomía:** Tradicionalmente en el género *Anas* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).
- Comentarios:** María Lucero ([1983] *Miscelánea* 75: 1-61) menciona dos ejemplares anillados en Tucumán que seguramente pertenecían a esta especie, pero esto nunca fue confirmado. Una posible hembra adulta hallada muerta por Luis Pagano en el partido de General Villegas, Buenos Aires en el año 2008 (L. Pagano *obs. pers.*; MLP-Or-14979).
- Especímenes (1):** MLP-Or-1271

■ PATO SERRUCHO | *Mergus octosetaceus* | R

Distribución: Localizada en el SE de Brasil, E de Paraguay (Alto Paraná) y NE de Argentina (Misiones) (Carboneras [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

- Registros:** 1. Un macho colectado por Ramón Lista en el arroyo Garuhapé, Misiones en septiembre de 1882 (Lista [1883] *El territorio de las Misiones*. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires; Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
2. Un macho colectado por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 30 de abril de 1912 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Según William Partridge ([1956] *Auk* 73: 473-488) el mismo fue posiblemente obtenido en el arroyo Yabebiry, Misiones. El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML.
3. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).
4. Una hembra colectada por Francisco Manuel Rodríguez en los saltos del río Iguazú, Misiones sin fecha (Phillips [1926] *A Natural History of the Ducks*. Houghton Mifflin). El ejemplar perteneció a la colección de Antonio Núñez y fue entregado al museo de Buenos Aires en el año 1914 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Un ejemplar colectado por Eduardo Del Ponte y Alberto Aiello en el arroyo Yacuy, Misiones cuya etiqueta dice “septiembre de 1947”. Andrés Gaii ([1951] *Hornero* 9: 247-276) menciona como fecha de captura octubre de 1947, mientras que William Partridge ([1956] *op. cit.*) el 2 de octubre de 1947. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
6. Un macho colectado por Andrés Gaii en el arroyo Aguaray Guazú, Misiones el 29 de mayo de 1948 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
7. Un macho colectado por Andrés Gaii en el arroyo Urugua-í, Misiones el 20 de julio de 1948 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.
- 8-10. Un macho y dos hembras colectados por Andrés Gaii en el arroyo Urugua-í, Misiones el 22 de julio de 1948 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
11. Un macho colectado por Andrés Gaii en el arroyo Urugua-í, Misiones el 28 de julio de 1948 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el YPM.
12. Un macho colectado por Andrés Gaii en el arroyo Urugua-í, Misiones el 4 de agosto de 1948 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.
13. Un macho colectado por Andrés Gaii en el arroyo Urugua-í, Misiones el 20 de agosto de 1948 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.
14. Una hembra colectada por Andrés Gaii y William Partridge en el arroyo Urugua-í, Misiones el 12 de septiembre de 1949 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
- 15-16. Una pareja colectada por Andrés Gaii y William Partridge en el arroyo Urugua-í, Misiones el 24 de marzo de 1950 (Gaii [1951] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
- 17-18. Dos ejemplares colectados por José Gorgues en el arroyo Yacuy, departamento Iguazú, Misiones entre fines de 1948 y principios de 1950. Este observador la registró con cierta frecuencia en la zona entre los años 1942 y 1978 (Johnson & Chebez [1985] *Historia Natural. Suplemento* 1: 1-16). Los especímenes se encuentran exhibidos en el Centro de Interpretación del PN Iguazú, Misiones (Guillermo Gil *in litt.*)
- 19-20. Dos ejemplares (un macho y una hembra) colectados por Alberto Anziano en el arroyo Yacuy, departamento Iguazú, Misiones entre los años 1945 y 1957 (Gelain [2008] *Xolmis* 3: 7-16). Los especímenes se encuentran depositados en el MP.
21. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 18 del arroyo Piray Guazú, Misiones el 3 de mayo de 1951 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

22. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 8 de agosto de 1951. Este ejemplar (MACN-Or-33245) fue mencionado por Partridge ([1954] *op. cit.*) como capturado el 8 de julio de 1951 y luego con fecha del 16 de agosto de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
23. Una hembra colectada por William Partridge en el arroyo Uruguayí, Misiones el 11 de agosto de 1951. Este ejemplar (NHMUK-1966.24.1) fue mencionado por Partridge ([1954] *op. cit.*) como capturado el 11 de julio de 1951 y luego con fecha del 16 de agosto de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.
24. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 15, Misiones el 23 de septiembre de 1951 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
25. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 14 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MNRJ.
26. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 20 del arroyo Uruguayí, Misiones el 17 de mayo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
27. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 15 del arroyo Uruguayí, Misiones el 18 de mayo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*; Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.
28. Un ejemplar colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 18 de agosto de 1952. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
- 29-30. Una pareja colectada por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 43, Misiones el 25 de agosto de 1952 (Partridge [1956] *op. cit.*). El macho se encuentra depositado en el UMMZ y la hembra en el MACN.
31. Varios ejemplares observados por Joaquín Carreras y William Partridge en el arroyo El Soberbio, Misiones en noviembre de 1953 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*). Este registro fue posteriormente desestimado por Chebez ([2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
- 32-33. Dos pichones colectados por William Partridge en el km 30 del arroyo Uruguayí, Misiones el 31 de agosto de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
- 34-35. Una hembra y un pichón colectados por William Partridge en el km 30 del arroyo Uruguayí, Misiones el 1 de septiembre de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
36. Una hembra colectada por William Partridge en el km 20 del arroyo Uruguayí, Misiones el 12 de diciembre de 1954 (Partridge [1956] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
37. Un ejemplar proveniente de "Misiones" sin fecha ni datos de colector. El espécimen se encuentra depositado en el YPM.
38. Un individuo observado por Jean Delacour en el PN Iguazú, Misiones el 29 de abril de 1956 (Delacour [1959] *The Waterfowl of the World*. Volume 3. Country Life).
39. Un macho colectado por Ricardo Moller Jensen en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 28 de julio de 1960. El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
40. Registrada por Havestron en el arroyo Las Antas cerca de la ruta provincial nº16 a la altura de Cerro 60, departamento Montecarlo, Misiones en el año 1960 (Daniel Gómez en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
41. Registrada por Rosa en el cruce del arroyo Tigre y la ruta provincial nº16, departamento Montecarlo, Misiones en el año 1960 (Giraud & Abramson [1998] *Boletín Técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina* 42: 1-48).
42. Un individuo observado por Joaquín Carreras en el arroyo Victoria, Misiones en noviembre de 1969 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).

43. Un ejemplar colectado en el arroyo Falso Uruguayí de Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en el año 1970. El espécimen permaneció en la colección personal de Mariano Chudy (Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*), pero al parecer se encuentra perdido en la actualidad.
44. Registrada por Claës Olrog en el arroyo Tigre cerca de la ruta provincial n°14, departamento San Pedro, Misiones en el año 1977 (Mauricio Rumboll y C. Olrog *en* Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
45. Una pareja observada por Guillermo Harris en el PN Iguazú, Misiones en febrero de 1977 (G. Harris *en* Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
46. Un ejemplar colectado en el arroyo Piray Mini, departamento Eldorado, Misiones en la década de 1970 (Juan C. Chebez *en* Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). El espécimen al parecer se encuentra perdido.
47. Tres individuos observados por Andrés Johnson en el arroyo Uruguayí, 17 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 11 de junio de 1984 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
48. Una pareja observada por Andrés Johnson en el arroyo Palacio, 37 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 13 de junio de 1984 (Johnson & Chebez [1985] *op. cit.*).
49. Una pareja observada en el arroyo Paranay Guazú, Misiones en el año 1984 (Manuel Nores *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
50. Un individuo observado por Daniel Forcelli, Lucio Contigiani y Tomás Waller en el arroyo Uruguayí, 15 km aguas abajo del puente de la ruta provincial n°19, Misiones el 27 de julio de 1985 (Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*).
51. Registrada en el arroyo Uruzú, Misiones entre agosto y septiembre de 1986 (Pablo Canevari *en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
52. Registrada por Andrés Johnson, Juan C. Chebez, Francisco Erize y Charles Luthin en el arroyo Uruguayí, Misiones en julio de 1988 (Luthin [1988] *Boletín Panamericano* 3: 1; Collar *et al.* [1992] *op. cit.*).
53. Registrada por Andrés Johnson, Alejandro Giraudo y Juan C. Chebez en el arroyo Uruzú cerca de la ruta provincial n°19, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en enero de 1989 (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
54. Un individuo observado en el arroyo Piray Mini, departamento Eldorado, Misiones el 9 de agosto de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser Mergus octosetaceus in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust; Benstead *et al.* [1994] *Cotinga* 2: 35-36).
55. Mencionada por pobladores locales en la confluencia de los arroyos Guairapo y Piray Mini, Misiones durante el año 1993 (Bosso & Gil [2000] *Sobre la situación del Pato Serrucho Mergus octosetaceus en la Argentina*. Apunte preparado para el Taller sobre Pato Serrucho. São Roque Minas. Brasil).
56. Un individuo observado por cazadores locales en el arroyo Piray Guazú, Misiones en septiembre de 1995 (Bosso & Gil [2000] *op. cit.*).
57. Un individuo observado por Jorge Baldo en el arroyo Uruzú del PP Uruguayí, Misiones en el año 2002 (Rey [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
58. Tres individuos observados por Federico Miró en el arroyo Pepirí Guazú, departamento San Pedro, Misiones el 5 de julio de 2005 (Miró [2010] *Nuestras Aves* 55: 5-6).
59. Un individuo observado por Leonardo Muñoz en el arroyo Los Patos a unos 4 km de su confluencia con el arroyo Yacuy, Misiones el 16 de marzo de 2006 (L. Muñoz *en* Chebez [2008] *op. cit.*; sib.gob.ar).
60. Un individuo observado por Onésimo Olivera en el arroyo Uruguayí, Misiones en el primer semestre del año 2007 (Guillermo Gil *en* Chebez [2008] *op. cit.*).

61. Un individuo observado por Justo Herrera en el río Iguazú superior cerca del salto Dos Hermanas, PN Iguazú, Misiones el 1 de junio de 2013. Pocos días después fue nuevamente registrado por Irineo da Costa y Griselda Escobar en la misma zona (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN; MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Comentarios: Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216) describe la especie haciendo referencia al Alto Paraná (latitud 27°), Paraguay en el año 1891. Notas extras de William Partridge fueron publicadas posteriormente (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 22: 20-24). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (36): MACN-Or-s/n, MACN-Or-8521, MACN-Or-31328, MACN-Or-31330, MACN-Or-31331, MACN-Or-31332, MACN-Or-31760, MACN-Or-32367, MACN-Or-32368, MACN-Or-33204, MACN-Or-33245, MACN-Or-33868, MACN-Or-33902, MACN-Or-36576, MACN-Or-36577, MACN-Or-36578, MACN-Or-36579, MACN-Or-36580, MACN-Or-47581, COFML-SHIP-TON-42, MLP-Or-9514, MP-100, MP-101, CIPNI-s/n, CIPNI-s/n, AMNH-748468, AMNH-748583, FMNH-419655, LACM-46537, MNRJ-32963, NHMUK-1966.24.1, NHMUK-1966.24.2, NMNH-413529, UMMZ-134871, YPM-35082, YPM-116261

■ PALOMA TROCAL | *Patagioenas speciosa* | R

Distribución: Desde México hasta el N de Bolivia, SE de Brasil, E de Paraguay y N de Argentina (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1. Una pareja observada (hembra colectada) por Andrés Giaí unos 35 km al norte de Tostado, departamento 9 de Julio, Santa Fe el 12 de noviembre de 1938 (Zotta [1939] *Hornero* 7: 243-255; Giaí [1950] *Hornero* 9: 121-164). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguaí, Misiones el 26 de octubre de 1959 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un macho colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Uruguaí, Misiones en febrero de 1960 (Navas y Bó [1986] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

4. Un ejemplar colectado por Luis Maruñak en Cerro Moreno, departamento Caingua, Misiones en septiembre de 1981 (Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30). El espécimen permaneció depositado en el CHMO, pero actualmente se desconoce su paradero (Graciela Ayala *in litt.*).

5. Registrada en forma ocasional por O. Putzolo en el oeste de la provincia de Chaco, sin fecha (Contreras *et al.* [1990] *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación Vida Silvestre Argentina).

6. Dos individuos observados por Flavio Moschione entre Las Lomitas y el río Teuco, departamento Patiño, Formosa el 4 de diciembre de 1990 (F. Moschione *en* Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

7. Una pareja observada en la estancia La Mansión, departamento Empedrado, Corrientes el 11 de noviembre de 1993 (Baldo *et al.* [1995] *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 26: 55-59).

8. Observada por Freddy Burgos, Gabriel Capuzzi y Maximiliano Navarro en el PP de la Araucaria, Misiones entre el 21 y el 26 de noviembre de 2001 (F. Burgos *en* Bodrati *et al.* [2010] *Nuestras Aves* 55: 9-11).

9. Un individuo observado por Alejandro Bodrati unos 300 mts al sur del PP de la Araucaria, departamento San Pedro, Misiones el 23 de noviembre de 2003 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).

10. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati cerca de la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 10 de febrero de 2004 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
 11. Un individuo observado y escuchado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
 12. Un individuo escuchado por Juan I. Areta e Ingrid Holzmänn en la reserva privada de Vida Silvestre Urugua-í, departamento General Manuel Belgrano, Misiones 16 de septiembre de 2008 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
 13. Un individuo observado y grabado por Kristina Cockle, José Segovia y Emilse Mérida en la reserva privada Aguaray-mí, departamento Iguazú, Misiones el 9 de julio de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
 14. Dos ejemplares fotografiados por Patricio Ramírez Llorens en el PP Puerto Península, Misiones el 23 de diciembre de 2013 (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).
 15. Un ejemplar fotografiado por Adrián Heredia y Marcelo Gavensky en la reserva privada Surucúa, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 18 de octubre de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=120824).
 16. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la RB Yaboty, Misiones en septiembre de 2016 (A. Bodrati *com. pers.*).
 17. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el paraje Siete Estrellas, departamento San Pedro, Misiones el 8 de enero de 2020 (A. Bodrati *com. pers.*).
 18. Dos ejemplares fotografiados por Claudio Sarco y María José Huc en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95166822).
- Comentarios:** Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1919] *Hornero* 1: 255-259) menciona haber cazado un ejemplar en Puerto Bertoni, Alto Paraná, Paraguay en el año 1915. El comentario de William Partridge con respecto a la provincia de Misiones seguramente se refiera a los ejemplares mencionados arriba (W. Partridge en Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377).
- Especímenes (3):** MACN-Or-4612a, MACN-Or-39238, MACN-Or-43360

■ PALOMA MONTERA VIOLÁCEA | *Geotrygon violacea* | R

Distribución: Fragmentada distribución en Centroamérica y Sudamérica, mayormente periamazónica. La población sureña ocupa el E de Brasil hasta el E de Paraguay y NE de Argentina (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para el Alto Paraná, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Un ejemplar colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones el 16 de noviembre de 1918 (Dabbene [1919] *Hornero* 1: 259-266). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Una pareja observada (hembra colectada) por Andrés Gai en el arroyo Aguaray Guazú, Misiones el 13 de junio de 1948 (Gai [1950] *Hornero* 9: 121-164; Navas & Bó [1988] *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo* 166: 1-10). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

4. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 10 de abril de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 22 de septiembre de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

6. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 15 de septiembre de 1957 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

7. Un macho colectado por Marcelino Salas en el km 30 del arroyo Uruguayí, Misiones el 14 de febrero de 1961 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
8. Una hembra colectada por William Partridge en Barra Concepción, departamento Concepción, Misiones el 18 de junio de 1961 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
9. Una hembra colectada por Claës Olrog, Leoncio Lemo, María Lucero, Estela Alabarce y Francisco Contino en Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones el 9 de noviembre de 1974 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el COFML.
10. Un macho colectado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 22 de junio de 1984. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
11. Un ejemplar colectado por Julio Contreras en Puerto San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 11 de junio de 1991 (Contreras *et. al.* [1994] *Nótulas Faunísticas* 53: 1-13). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
12. Registrada por Ernesto Krauczuk en el departamento San Ignacio, Misiones entre los años 1991 y 2002 (Krauczuk [2008] *Lundiana* 9: 29-39).
13. Registrada por Ernesto Krauczuk en El Mapacho, departamento Eldorado, Misiones entre el 24 y el 28 de marzo de 1993 (Contreras *et. al.* [1994] *op. cit.*).
14. Registrada por Andrés Johnson en la propiedad María Magdalena sobre el arroyo Piray Mini, departamento Eldorado, Misiones en agosto de 1993 (Contreras *et. al.* [1994] *op. cit.*).
15. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 11 de marzo de 1997 (Bodrati *et. al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64; A. Bodrati *in litt.*)
16. Registrada por Germán Pugnali en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 21 de julio de 2000 (ebird.org/checklist/S26703665).
17. Una hembra hallada muerta en el PN Iguazú, Misiones el 27 de mayo de 2002 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5). Al parecer el ejemplar no fue conservado.
18. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 2003 (A. Bodrati *in litt.*).
19. Una pareja observada por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 5 de febrero de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
20. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el establecimiento Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 14 de febrero de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
21. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 17 de febrero de 2004 (Bodrati *et. al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
22. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Esmeralda, Misiones el 28 de noviembre de 2004 (A. Bodrati *in litt.*).
23. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 6 de mayo de 2005 (Bodrati *et. al.* [2010] *op. cit.*; A. Bodrati *in litt.*).
24. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 17 de octubre de 2005 (A. Bodrati *in litt.*).
25. Un macho observado por Alejandro Bodrati y Emilse Mérida en el PP Caá Yari, Misiones el 11 de octubre de 2006 (A. Bodrati *in litt.*).
26. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yasy-yateré, departamento Guaraní, Misiones el 17 de octubre de 2006 (A. Bodrati *in litt.*).
27. Una posible hembra observada por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 5 de septiembre de 2007 (A. Bodrati *in litt.*).
28. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el sendero Macuco del PN Iguazú, Misiones el 13 de junio de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).
29. Un macho grabado por Alejandro Bodrati en la reserva Güirá-pé, departamento General Manuel

Belgrano, Misiones el 3 de agosto de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).

30. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la propiedad Avanzini ubicada en la península Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (A. Bodrati *in litt.*).

31. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 12 de noviembre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).

32. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 13 de noviembre de 2009 (A. Bodrati *in litt.*).

33. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 25 de noviembre de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).

34. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 23 de noviembre de 2012 (A. Bodrati *in litt.*).

35. Registrada por Rodrigo Martínez Gamba en el parque natural Monte Seguí, departamento General San Martín, Misiones entre los años 2007 y 2012 (Martínez Gamba [2014] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 163: 1-10).

36. Dos individuos observados en cercanías de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 2 de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).

37. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el PP Caá Yari, Misiones el 18 de julio de 2015 (ebird.org/checklist/S24341271).

38. Un ejemplar hallado muerto en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 24 de junio de 2016 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=155670). Lamentablemente el espécimen no pudo ser conservado (Julián Baigorria *in litt.*).

39. Un macho observado por Alejandro Bodrati en la reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 8 de octubre de 2016 (A. Bodrati *in litt.*).

40. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en San José, departamento Apóstoles, Misiones el 20 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=242720).

41. Un ejemplar fotografiado por Matías Romano en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de junio de 2019 (ebird.org/checklist/S57295961).

Comentarios: Dos ejemplares que habían sido depositados en el MACN (Navas & Bó [1988] *op. cit.*), fueron luego reidentificados como PALOMA MONTERA CASTAÑA *Geotrygon montana*: una hembra colectada por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 13 de julio de 1953 (MACN-Or-34627) y un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 de septiembre de 1953 (MACN-Or-34122).

Especímenes (10): MACN-Or-9638, MACN-Or-31240, MACN-Or-34125, MACN-Or-34628, MACN-Or-38242, MACN-Or-40080, MACN-Or-44060, MACN-Or-53429, MACN-Or-62028, CO-FML-13530

■ PALOMITA MORADA | *Paraclaravis geoffroyi* | R

Distribución: La mayoría de los registros en el SE de Brasil, y unos pocos provenientes del E de Paraguay y N de Argentina en la provincia de Misiones (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Un macho inmaduro colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 18 de octubre de 1957 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 46).

3. Una pareja observada cerca de Wanda, departamento Iguazú, Misiones en diciembre de 1974 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

4. Un individuo anillado por Arturo Tarak y Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (A. Tarak y M. Christie en Olrog [1979] *op. cit.*).

5. Dos individuos observados por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones el 19 de julio de 1990 (H. Povedano en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

6. Un individuo observado por Frank Lambert en el PN Iguazú, Misiones en mayo de 1991 (F. Lambert en Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5).

7. Una hembra observada por Alejandro Bodrati en el camino a la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 29 de noviembre de 2007 (Areta *et al.* [2009] *Biotrópica* 41: 66-73).

8. Una hembra observada por José Segovia en el camino a la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 30 de noviembre de 2007 (Areta *et al.* [2009] *op. cit.*).

9. Dos individuos observados por Juan I. Areta en la reserva Güirapé, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de agosto de 2008 (Lees *et al.* [2021] *Frontiers in Ecology and Evolution*; doi.org/10.3389/fevo.2021.624959).

10. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el establecimiento Don Pepe, departamento San Ignacio, Misiones el 29 de junio de 2017 (ebird.org/checklist/S39465728).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Claravis*, donde era conocida como *Claravis godefrida* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

Comentarios: Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): MACN-Or-38238



Figura 46. Palomita Morada *Paraclaravis geoffroyi*, MACN-Or-38238, arroyo Uruguayí, km 30, Misiones, 18 de octubre de 1957 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ TORCACITA ENANA | *Columbina minuta* | R

Distribución: En parches desde el S de México hasta el centro de Sudamérica. La población austral ocupa una extensa región del centro y E de Brasil, Bolivia y Paraguay (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para el Alto Paraná, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102; Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261).

2. Un macho colectado por Asunción Rivas en Puerto Piray, km 18, Misiones el 5 de diciembre de 1951 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 21 de marzo de 1958 (Navas & Bó [1986] *Neotrópica* 32: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 47).

4. Dos individuos observados por Julio Contreras en la RP Guaycolec, Formosa el 14 de noviembre de 1992 (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

5. Un macho fotografiado cerca de Paso Amaro, departamento Ituzaingó, Corrientes el 2 de enero de 1993 (Pearman & Abadie [1995] *Nótulas Faunísticas* 72: 1-5).

6. Un ejemplar grabado por Juan I. Areta en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 10 de octubre de 2005 (J.I. Areta *in litt.*).

7. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en la península Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 19 de abril de 2009 (A. Bodrati *en de la Peña* [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 6: 1-348).

8. Un ejemplar fotografiado por Damián Lozano en Candelaria, departamento homónimo, Misiones el 16 de octubre de 2020 (ebird.org/checklist/S75088834).

Comentarios: La mención de *Columbigallina passerina griseola* para Misiones por parte de Bertoni ([1913] *op. cit.*), en realidad se refiere a *Columbina minuta* (Partridge [1954] *op. cit.*). Rogelio Ymbernón la menciona como de presencia habitual en la zona de Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones (Juan I. Areta *in litt.*).

Especímenes (2): MACN-Or-33344, MACN-Or-38231



Figura 47. Torcacita Enana *Columbina minuta*, MACN-Or-38231, arroyo Uruguayí, km 10, Misiones, 21 de marzo de 1958 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ ANÓ PICO SURCADO | *Crotophaga sulcirostris* | V

Distribución: Desde el S de Estados Unidos hasta el N y O de Sudamérica, llegando al N de Chile y NO de Argentina (Payne [1997] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 4. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Demetrio Rodríguez en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en octubre de 1912 (Zotta [1937] *Hornero* 6: 477-483). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 48).

2. Un individuo observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en la finca Jacúlica, departa-



Figura 48. Anó Pico Surcado *Crotophaga sulcirostris*, MACN-Or-8502, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, octubre de 1912 (Diego Monteleone)

mento Santa Victoria, Salta el 16 de julio de 1988 (F. Moschione y J. San Cristóbal en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

Especímenes (1): MACN-Or-8502

■ CUCLILLO OJO COLORADO | *Coccyzus erythrophthalmus* | V

Distribución: Se reproduce en una amplia región del S de Canadá y centro de Estados Unidos. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el NO y centro de Sudamérica (Payne [1997] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 4. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho adulto colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 6 de febrero de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 49).

2. Un individuo anillado por Carlos Gerow en la provincia de Jujuy en el año 1977 (C. Gerow en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

3. Un individuo observado por Pablo Grilli en la seccional Caimancito del PN Calilegua, Jujuy el 19 de marzo de 2008 (Camperi et al. [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140; P. Grilli in litt.).

4. Mencionada sin detalles para la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione et al. [2011] XIV Reunión Argentina de Ornitología. Formosa).

Especímenes (1): MACN-Or-38254



Figura 49. Cuclillo Ojo Colorado *Coccyzus erythrophthalmus*, MACN-Or-38254, arroyo Urugua-í, km 30, Misiones, 6 de febrero de 1958 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ AÑAPERO CHICO | *Chordeiles pusillus* | R

Distribución: En forma fragmentada en Colombia, Venezuela, Surinam, Brasil, Bolivia y Argentina (Cleere [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un nido activo hallado por Ernesto Krauczuk en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones el 23 de octubre de 1995. La hembra y el huevo fueron colectados la noche del 31 de octubre, y el espécimen se encuentra depositado en el MACN (Krauczuk [2000] *Ornitología Neotropical* 11: 85-86; Figura 50).

2. Un total de 17 individuos y 5 nidos hallados en la reserva Campo San Juan, departamento Candelaria, Misiones entre marzo de 1996 y noviembre de 2001 (Krauczuk [2013] *Atualidades Ornitológicas* 173: 58-68).

3. Varios individuos y un nido hallados por Ernesto Krauczuk y Alejandro Bodrati en Campo Prates, departamento Concepción, Misiones el 14 y 15 de noviembre de 2003 (Bodrati [2005] en Di

Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; A. Bodrati *in litt.*).

4. Un individuo observado por Germán Pugnali en Barra Concepción, departamento Concepción, Misiones el 27 de enero de 2004 (ebird.org/checklist/S26704685).

5. Tres individuos observados por Néstor Fariña, Olga Villalba y Juan Klavins en la reserva natural Rincón de Santa María, Corrientes el 10 de abril de 2014 (Pagano *et al.* [2017] *Nuestras Aves* 62: 14-17).

6. Dos individuos observados (uno de ellos filmado) por Luis Pagano y Alejandro Bodrati sobrevolando el poblado de Garruchos, departamento Santo Tomé, Corrientes el 14 de septiembre de 2016 (Pagano *et al.* [2017] *op. cit.*).

7. Un individuo en vuelo observado por Luis Pagano y Alejandro Bodrati en la ruta nacional n°12 sobre el arroyo Estepa, departamento Capital, Misiones en diciembre de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

8. Un ejemplar grabado por Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 29 de noviembre de 2018 (N. Fariña *in litt.*).

9. Dos individuos observados por Julián Baigorria en la estancia Santa Cecilia, departamento Candelaria, Misiones el 10 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S85057904).

Comentarios: Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): MACN-Or-66407



Figura 50. Añapero Chico *Chordeiles pusillus*, MACN-Or-66407, reserva Campo San Juan, Misiones, 1 de noviembre de 1995 (Diego Monteleone)

■ VENCEJO NEGRUZCO | *Cypseloides fumigatus* | R

Distribución: Poblaciones dispersas en el E de Bolivia, E de Paraguay, NE de Argentina y SE de Brasil llegando hasta Rio Grande do Sul (Chantler [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Mencionada sin detalles por Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102; [1939] *Revista de la Sociedad Científica del Paraguay* 4: 3-49).

2. Una observación sin detalles proveniente de Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en noviembre de 1974 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

3. Cinco individuos observados por David Stejskal y John Coons en el PN Iguazú, Misiones el 11 de diciembre de 1993 (ebird.org/checklist/S40954283).

4. Unos pocos individuos observados por Carlos Ferrari en el PP Salto Encantado, Misiones el 28 de enero de 1997 (ebird.org/checklist/S19501689).

5. Cuatro individuos observados en vuelo por Alejandro y Guillermo Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 12 de marzo de 1997 (Pearman *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 351-359; Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).
6. Dos individuos observados en vuelo por Mark Pearman y Germán Pugnali en la seccional 101 del PP Urugua-í, Misiones el 16 de abril de 2001 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
7. Cuatro individuos observados por Mark Pearman en el PP de la Araucaria, Misiones el 23 de enero de 2002 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
- 8-9. Más de cinco individuos posados observados por Mark Pearman, Ignacio Roesler y Aldo Chiappe en el PP Salto Encantado, Misiones el 25 y 26 de enero de 2002 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
10. Registrada por David Stejskal en el PN Iguazú, Misiones el 11 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S52693196).
11. Mencionada sin detalles para el PP de la Araucaria, Misiones entre los años 2000 y 2002 (Krauczuk & Baldo [2004] *Atualidades Ornitológicas* 119: 1-43).
12. Dos individuos posados observados por Mark Pearman y un grupo de observadores en el PP Salto Encantado, Misiones el 8 de noviembre de 2003 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
13. Ocho individuos posados observados por Mark Pearman y un grupo de observadores en el PP Salto Encantado, Misiones el 27 de octubre de 2004 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
14. Más de cinco individuos posados (y al menos un nido ocupado) observados por Ignacio Roesler y Leif Gabrielsen en el PP Salto Encantado, Misiones el 1 de diciembre de 2004 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*). La fotografía mencionada en el texto no se encuentra disponible.
15. Un ejemplar en el nido fotografiado por Juan I. Areta en el salto Krysiuk, departamento Oberá, Misiones el 11 de enero de 2005 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
16. Un individuo con nido hallado por Juan I. Areta y Hernán Povedano en la reserva privada Valle de Cuñá Pirú, departamento Cainguás, Misiones el 13 de enero de 2005 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
17. Registrada por Luis Fernández en Puerto Rico, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 22 de enero de 2005 (ebird.org/checklist/S24928839).
18. Registrada por Hernán Alvarado en el PN Iguazú, Misiones el 9 de enero de 2006 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=490957).
19. Ocho individuos observados en vuelo por Juan I. Areta en el PP de la Araucaria, Misiones el 12 de septiembre de 2006 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
20. Cinco individuos observados en vuelo por Juan I. Areta en el PN Iguazú, Misiones el 12 de agosto de 2007 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
21. Tres nidos activos hallados por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 13 de noviembre de 2007 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
22. Varios individuos observados por Diego Caiafa en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 26 de enero de 2008 (ebird.org/checklist/S62696260).
23. Varios individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 17 de octubre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
- 24-25. Entre dos y cuatro individuos observados por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 25 y 26 de octubre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
26. Un nido ocupado fotografiado por Juan I. Areta en el salto Golondrina, departamento Guaraní, Misiones el 19 de noviembre de 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).
27. Varios registros de entre dos y seis individuos efectuados por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones en octubre y noviembre entre los años 2006 y 2008 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*; Bodrati *et al.* [2010] *op. cit.*).
28. Un nido activo hallado por Mark Pearman en el PP Salto Encantado, Misiones el 2 de noviembre de 2009 (Pearman *et al.* [2010] *op. cit.*).