

29. Mencionada sin detalles para la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones entre los años 2009 y 2011 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).
30. Al menos un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en marzo de 2012 (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones; ramonmollerjensen.com).
31. Un ejemplar fotografiado por Eduardo Militello en la RNE San Antonio, Misiones el 11 de septiembre de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=26147).
32. Un ejemplar fotografiado por Gustavo Durán en el PN Iguazú, Misiones el 25 de abril de 2015 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=97618).
33. Seis individuos observados por Guillermo Martínez en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 24 de octubre de 2015 (ebird.org/checklist/S25570506).
34. Un total de quince individuos observados por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 27 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S38593187). Las fotografías no se encuentran disponibles.
35. Registrada por Rosana Ursino en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 4 de abril de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=424186).
36. Un total de cinco individuos observados por Peter Colasanti en el PN Iguazú, Misiones el 22 de octubre de 2016 (ebird.org).
37. Un individuo observado por Gustavo Durán en el PN Iguazú, Misiones el 27 de noviembre de 2016 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=511749).
38. Dos o tres individuos observados por Luis Pagano entre la ruta nacional n°14 y el arroyo del Medio, departamento Leandro Alem, Misiones el 21 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).
39. Un ejemplar sobre su nido observado y fotografiado por Luis Pagano en el salto Krysiuk, departamento Oberá, Misiones el 21 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).
- 40-41. Hasta cinco individuos por día observados por Francisco Cornell en el PN Iguazú, Misiones el 5 y 6 de agosto de 2017 (ebird.org).
42. Dos individuos observados por Francisco González Táboas en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 9 de agosto de 2017 (ebird.org/checklist/S38568405).
43. Un individuo observado por Luis Tejo en Chacra Mariposa, departamento Oberá, Misiones el 20 de noviembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=843149).
44. Hasta seis individuos observados y fotografiados por Luis Pagano y otros observadores cerca de El Alcázar, departamento Libertador General San Martín, Misiones en marzo de 2019 (L. Pagano *obs. pers.*).
45. Dos parejas observadas por Patricio Ramírez Llorens y Bernabé López-Lanús en la propiedad Las Ratras de Forestal Belga SA, departamento San Pedro, Misiones el 24 de octubre de 2019 (ebird.org/checklist/S61820898).
46. Un número no determinado de ejemplares fotografiados por Pablo Meoniz en el PN Iguazú, Misiones el 1 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S61284990; Figura 51).
47. Dos individuos observados por Patricio Ramírez Llorens y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 2 de noviembre de 2019 (ebird.org/checklist/S63961511).
48. Tres individuos observados por Pablo Meoniz en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 3 de noviembre de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1181199).
49. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 25 de enero de 2020 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=378441).
50. Dos individuos observados por Julián Quillén Vidoz y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 24 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S65013654).
51. Tres individuos observados por Marcelo Gavensky, Julián Baigorria y un grupo de observadores en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 23 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79955131).



Figura 51. Vencejo Negruzco *Cypseloides fumigatus*, PN Iguazú, Misiones, 1 de noviembre de 2019 (Pablo Meoniz)

52. Un individuo observado por Julian Baigorria, Diego Oscar y un grupo de observadores en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de agosto de 2021 (ebird.org/checklist/S93380246). Las fotografías no se encuentran disponibles.

53. Registrada por Pablo Meoniz en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 14 de septiembre de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1466482).

54. Unos tres individuos fotografiados por Mark Pearman, Martín Toledo y Damián Lozano en la ruta nacional n°12, departamento San Ignacio, Misiones el 16 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S94749966). Por el momento las fotografías no se encuentran disponibles.

55. Dos individuos observados por Santiago Torres en el PN Iguazú, Misiones el 19 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1503177).

Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Roberto Dabbene ([1917] *Hornero* 1: 3-8) menciona para esta especie las localidades de Tapia y Tafi Viejo, departamentos Trancas y Tafi Viejo respectivamente, Tucumán sin mencionar especímenes. Un año más tarde, el mismo Dabbene ([1918] *Hornero* 1: 193) describe el nido y los huevos de *Cypseloides fumigatus* provenientes de los “cerros de Tucumán”. Ambos reportes quizás provengan de Lillo ([1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221), aunque claramente es una confusión con el VENCEJO PARDO *Cypseloides rothschildi*. La referencia para Santa Ana, departamento Río Chico, Tucumán también debería tratarse como *C. rothschildi* (Baer [1904] *Ornis* 12: 209-234). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

■ PICAFLOR AMATISTA | *Calliphlox amethystina* | R

Distribución: Mayormente en el N y E de Sudamérica llegando hasta la región SE de Brasil. Una población se extiende desde el N de Bolivia por el O hasta Perú y Ecuador (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Un macho colectado por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 11 de septiembre de 1915 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr.* Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se habría depositado en la COFML, pero lamentablemente no pudo ser hallado en dicha colección (Sebastián Aveldaño *in litt.*).

3. Un macho joven colectado por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 13 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). El espécimen se habría depositado en la COFML, pero lamentablemente no pudo ser hallado en dicha colección (Sebastián Aveldaño *in litt.*).

4. Un macho adulto colectado por Eduardo Del Ponte y Alberto Aiello en el arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones el 2 de octubre de 1947 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Un macho joven colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 9 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

6-7. Una hembra joven y otra adulta colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 24 y 25 de febrero de 1952 respectivamente (Partridge [1954] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

8. Un macho joven colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 28 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

9. Una hembra colectada por William Partridge en el km 30 de arroyo Urugua-í, Misiones el 4 de octubre de 1954 (Navas & Bó [1993] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 16: 36-50).

10-11. Dos machos colectados por William Partridge en el km 30 de arroyo Urugua-í, Misiones el 10 y 13 de octubre de 1954 (Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

12. Un macho colectado por William Partridge en el km 30 del arroyo Urugua-í, Misiones el 1 de noviembre de 1957 (Navas & Bó [1993] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

13. Registrada por Pablo Cano en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1988 (P. Cano en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

14-15. Un macho observado por Claudio Maders en el PP Caá Yari, Misiones el 8 de octubre de 2006 (Bodrati *et al.* [2008] *Nuestras Aves* 53: 39-41). El mismo fue fotografiado por Carlos Ferrari y Silvia Vitale el 12 de octubre de 2006, y luego por Germán Pugnali junto a una hembra el 24 de octubre del mismo año. Claudio Maders y Gastón Di Santo la registraron en el sitio hasta noviembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S16281071).

16. Observada en reiteradas ocasiones por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el PP Caá Yari, Misiones durante noviembre de 2007 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*).

17. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 13 y 14 de noviembre de 2008 (Bodrati *et al.* [2008] *op. cit.*; Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64).

18. Una hembra fotografiada por Rodrigo y Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2011 (Castillo *et al.* [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 88: 1-4).

19. Un individuo observado por Eugenia Boggiano en el PP Salto Encantado, Misiones el 9 de febrero de 2020 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1229275).

20. Una hembra fotografiada por Leandro Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 7 de abril de 2021 (Castillo [2021] *Nuestras Aves* 66: 103-104).

Comentarios: La referencia del PICAFLOR ENANO *Microstilbon burmeisteri* para Posadas, departamento Capital, Misiones (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366), en realidad podría corresponder a esta especie (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA).

Especímenes (9): MACN-Or-30604, MACN-Or-33530, MACN-Or-33531, MACN-Or-33532, MACN-Or-33533, MACN-Or-36648, MACN-Or-36649, MACN-Or-36650, MACN-Or-38308

■ POLLONA AFRICANA | *Porphyrio alleni* | V

Distribución: Amplia distribución en el África subsahariana, además de Madagascar, islas Comoras e isla Mauricio (Taylor [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Restos de un ejemplar hallados por B. Brown en Royal Bay, Georgias del Sur en diciembre de 1984 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). Los mismos se encuentran depositados en el NHMUK.

Comentarios: La especie fue determinada en base a las medidas del ala (159 mm) y el pico (24,5 mm) (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*). Recientemente fotografiada en la isla Fernando de Noronha, Brasil (Scaldaferro Bonfa & Pivovar Plotecya [2020] *Cotinga* 42: 119-120).

Especímenes (1 esqueleto): NHMUK-s/n

■ CHORLO DE ESPOLÓN | *Vanellus cayanus* | R

Distribución: Tierras bajas en la mitad N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Incluida por Arnaldo de Winkelried Bertoni para la avifauna argentina, sin detalles (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Una hembra adulta colectada por Johan Mogensen sobre la costa del río Paraná en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 15 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *Argentinas Dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML (Figura 52).

3. Mencionada sin detalles para las provincias de Misiones y Chaco (Zotta & Da Fonseca [1936] *Hornero* 6: 343-364).

4. Un individuo observado por Flavio Moschione en el arroyo Pepirí Mini, Misiones el 1 de enero de 1987 (F. Moschione en Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).

5. Un ejemplar fotografiado por Miguel González en Capitán Pagé, departamento Rivadavia, Salta el 26 de diciembre de 2005 (Jensen & Areta [2007] *Hornero* 22: 55-57).

6. Un individuo observado por Alejandro Bodrati sobre la costa del río Paraná muy cerca de la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 16 de agosto de 2010 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).

Comentarios: Incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir hasta ese momento evidencia alguna (ver Jensen & Areta [2007] *op. cit.*). Esta especie se consideraba como errante en las islas Malvinas, de donde Charles Abbott habría obtenido un ejemplar que luego fue enviado a Inglaterra (Abbott [1861] *Ibis* 3: 149-167; Sclater [1861] *Proceedings of the Zoological Society of London* 29: 45-47). Este autor en realidad hace referencia al TERO



Figura 52. Chorlo de Espolón *Vanellus cayanus*, COFML-SHIPTON-668, Puerto Segundo, Misiones, 15 de marzo de 1917 (Sebastián Avelaño, Instituto Miguel Lillo)

Vanellus chilensis, como lo demuestra Richard Sharpe en su lista sinonímica del catálogo del museo británico (Sharpe [1896] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 24. London; Hein van Grouw in litt.).

Especímenes (1): COFML-SHIPTON-668

■ PLAYERO ESQUIMAL | *Numenius borealis* | R

Distribución: En el pasado nidificante al NO de Canadá y quizás Alaska. En la época no reproductiva ocupaba las pampas entre el S de Brasil y el centro de Argentina (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Referida por Charles Darwin para “Buenos Ayres”, sin más detalles (Gould [1841] *The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle. Part III. Birds*. London).

2. Un ejemplar colectado por Robert Packe en las islas Malvinas, sin fecha (Sclater [1860] *Proceedings of the Zoological Society of London* 28: 382-391; Abbott [1861] *Ibis* 3: 149-167). El espécimen al parecer se encuentra perdido en la actualidad.

3-4. Grandes bandadas observadas por Henry Durnford en el valle del río Chubut, Chubut entre el 8 y el 10 de octubre de 1877 (Durnford [1878] *Ibis* 20: 389-406). Dos ejemplares fueron colectados el 8 de octubre y los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK.

5. Un ejemplar colectado en “Buenos Ayres” el 9 de octubre de 1878, sin más detalles. El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK.

6. Enrique Lynch Arribálzaga lo incluye para la avifauna de Baradero, partido homónimo, Buenos Aires con el nombre de *Tryngites brevirostris* (Lynch Arribálzaga [1878] *El Naturalista Argentino*. Tomo I. Entrega 11: 330-336).

7. Grandes bandadas observadas por Walter Barrows en Concepción del Uruguay, departamento Uru-

guay, Entre Ríos el 9 de septiembre de 1880 (Barrows [1884] *Auk* 1: 313-319). Un ejemplar fue colectado y el espécimen se encuentra depositado en el MCZ.

8. Un ejemplar colectado por Walter Barrows en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, Entre Ríos el 7 de octubre de 1880. El espécimen se encuentra depositado en el MCZ.

9. Registrada por Walter Barrows casi a diario en el trayecto entre Azul y Bahía Blanca, Buenos Aires hasta fines de febrero de 1881 (Barrows [1884] *op. cit.*). En esta expedición un ejemplar fue colectado por dicho observador en “*Sauce Chico, Potrero de Claraz*”, Buenos Aires el 17 de febrero de 1881. El espécimen se encuentra depositado en el MVZ.

10-11. Dos ejemplares colectados en “*La Plata*”, Buenos Aires en diciembre de 1895. Los especímenes se encuentran depositados en el FMNH.

12. William Hudson ([1920] *Birds of La Plata*. Dent & Sons) lo menciona como “bastante común en las pampas, apareciendo de septiembre a octubre en pequeñas bandadas de 30 o 40 hasta 100 ejemplares”. Al parecer este autor no observó la especie personalmente, ya que no brinda mayores detalles.

13. Un macho colectado por Hermann Burmeister en las “*llanuras del río Salado, Buenos Aires*”, sin fecha. El espécimen se encuentra depositado en NMNH.

14. Unos 20 o 30 individuos observados por Ernest Gibson cerca de la estancia Linconia, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 13 de febrero de 1899 (Gibson [1920] *Ibis* 62: 1-97).

15-16. Una pequeña bandada observada por Maurice Arthur Runnacles cerca de la estancia Linconia, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 8 de abril de 1901. Aparentemente el mismo observador volvió a registrar algunos individuos en El Palenque, partido de General Lavalle, Buenos Aires el 16 de abril del mismo año (Gibson [1920] *op. cit.*).

17. Un ejemplar proveniente de Necochea, partido homónimo, Buenos Aires sin fecha (Steullet & Deautier [1935-1946] *Obra del Centenario del Museo de La Plata* 1: 1-1006). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

18. Un ejemplar colectado por Rollo Beck en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 29 de septiembre de 1914 (Murphy [1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 1. American Museum of Natural History). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

19. Mencionada por Percival Reynolds como “observado en Sowchen” alrededor del año 1915, y posteriormente incluida en un listado que el mismo observador le enviara a A.T. Waldron en junio de 1932 (Humphrey *et al.* [1970] *Birds of Isla Grande [Tierra del Fuego]*. Smithsonian Institution). Estos autores suponen que dicha localidad se encuentra cerca o dentro de la estancia Viamonte, departamento Río Grande, Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* [1970] *op. cit.*).

20. Un grupo de cinco o seis individuos observados (uno colectado) por Juan Daguerre en Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires el 7 de febrero de 1923. Publicaciones posteriores mencionan la captura como del año 1924 (Dabbene [1924] *Hornero* 3: 284; Forbush [1929] *Birds of Massachusetts and other New England states. Part 1*. Norwood Press). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

21. Una hembra colectada por Juan Daguerre en la estancia El Toro de la localidad de Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires el 11 de enero de 1925 (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 420; Forbush [1929] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

22. Un macho joven colectado por Juan Daguerre en la estancia El Toro de la localidad de Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires en octubre de 1927. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

23. Un espécimen (MACN-Or-1083) sin datos de localidad ni colector se encuentra en exhibición en el MACN. Suponemos que fue obtenido en territorio argentino.

24. Un individuo observado por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires en enero de 1937 (Wetmore [1939] *Auk* 56: 475-476).

25-26. Dos o tres individuos observados por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires el 16 de febrero de 1937; y otro tres días más tarde en la misma localidad (Wetmore [1939] *op. cit.*).

27. Un individuo observado por Ernest Ronald Runnacles en General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires el 17 de enero de 1939 (Wetmore [1939] *op. cit.*).

28. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).

29. Un grupo de cuatro individuos observado por Pablo Michelutti en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 13 de octubre de 1990 (Michelutti [1991] *Nuestras Aves* 25: 25).

30. Mencionada con dudas por Daniel Paz Barreto para el arroyo Maquinchao, Río Negro (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros). Curiosamente esta especie no es mencionada por este autor en un trabajo posterior (Paz Barreto [1997] *Aves de la provincia de Río Negro II. Localidades Confirmadas*. Consejo de Ecología y Medio Ambiente. San Carlos de Bariloche).

Comentarios: Henry Seebohm menciona la colecta de ejemplares por parte de H.M. Harrison “cerca de Buenos Aires” (Seebohm [1888] *The geographical distribution of the family Charadriidae*. Henry Sotheman & Co.). En realidad este explorador obtuvo especímenes en Uruguay, los cuales fueron enviados a Inglaterra (Hahn [1963] *Where is that vanished bird?: an index to the known specimens of the extinct and near extinct North American species*. Royal Ontario Museum; Aspiroz & Martínez-Curci [2018] en Aspiroz et al. [editores] *Libro Rojo de las Aves del Uruguay*. DINAMA & DINARA. Montevideo). Considerada Posiblemente Extinta a nivel nacional (MAYDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (15): MACN-Or-1083, MACN-Or-15761, MACN-Or-16680, MACN-Or-35682, MLP-Or-25, AMNH-752067, FMNH-426467, FMNH-426468, MCZ-31206, MCZ-31207, MVZ-106842, NHMUK-1885.11.20.182, NHMUK-1885.11.20.183, NHMUK-1878.1.25.21, NMNH-66523

■ PLAYERITO MENUDO | *Calidris minuta* | V

Distribución: Nidifica en el extremo N de la región Paleártica. Luego de la etapa reproductiva se distribuye en Europa, África, oriente medio e India (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Una hembra adulta colectada por Peter Prince en Bird Island, Georgias del Sur el 28 de



Figura 53. Playerito Menudo *Calidris minuta*, NHMUK-2001.33.1, Bird Island, Georgias del Sur, 28 de diciembre de 1977 (The Natural History Museum)

diciembre de 1977 (Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27; Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 53).

Comentarios: El primer registro para Sudamérica corresponde a un ejemplar fotografiado por Carlos Araujo Gussoni en la isla Fernando de Noronha, Brasil el 9 de octubre de 2018 (Araujo Gussoni [2019] *Atualidades Ornitológicas* 207: 28).

Especímenes (1): NHMUK-2001.33.1

■ BECASA GRIS | *Limnodromus griseus* | V

Distribución: Nidifica en el O (subespecie *caurinus*), centro (subespecie *hendersoni*) y E (subespecie *griseus*) de Norteamérica. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el sur ocupando México, el Caribe y el N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Miguel Comaleras en la estancia Cari Lauquen de la localidad de San Antonio, partido de Maipú, Buenos Aires el 25 de octubre de 1942 (Zotta [1942] *Hornero* 8: 171-178). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 54).

2. Dos individuos observados por Claës Olrog en el cabo San Antonio, partido de La Costa, Buenos Aires en noviembre de 1962 (Olrog [1967] *Hornero* 10: 292-298).

3-4. Registrada en el lago Mascardi del PN Nahuel Huapi, Río Negro en los veranos de 1969 y 1970 (Conterras *et al.* [1980] *Historia Natural* 8: 41-48).

5. Un ejemplar fotografiado por Samuel Narosky en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires




Figura 54. Becasa Gris *Limnodromus griseus*, MACN-Or-28739, San Antonio, Buenos Aires, 25 de octubre de 1942 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

el 6 de diciembre de 1977 (Narosky [1983] *Hornero* 12. Número Extraordinario: 74-76; Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).

6. Un individuo observado por Alejandro Ronchetti en la RM Ribera Norte, partido de San Isidro, Buenos Aires en noviembre de 1983 (Barbetti *et al.* [1985] *Refugio Educativo de la Ribera Norte*. Fundación Vida Silvestre Argentina; Gasparri *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 234: 1-43).

7-8. Mencionada sin detalles por Pablo Michelutti para la costa sur de la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba. En el mismo trabajo se comenta un registro dudoso proveniente de La Paqueta, departamento San Justo, Córdoba en el año 1978 (Yzurieta [1995] *Manual de Reconocimiento y Evaluación Ecológica de las Aves de Córdoba*. Gobierno de Córdoba).

9. Un individuo observado por Daniel Blanco, Germán Pugnali y Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires entre el 10 y el 12 de octubre de 1987 (Blanco *et al.* [1988] *Punta Rasa: su importancia en la conservación de las aves migratorias*. International Council for Bird Preservation).

10-12. Un total de seis individuos observados por Daniel Blanco, Germán Pugnali y Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires durante enero de 1988. El conteo máximo fueron cuatro *Limnodromus* en una transecta realizada el 23 de enero de 1988 (Blanco *et al.* [1988] *op. cit.*).

13. Un individuo observado por Jim Rising en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 1 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).

14. Un individuo observado y escuchado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 8 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).

15. Mencionada como de presencia ocasional en la laguna Chasicó, partido de Villarino, Buenos Aires sin mayores detalles (Zapata [1998] *Natura Neotropicalis* 29: 155-161).

16. Dos individuos observados por un grupo de investigadores en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 1 de marzo de 2009 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47; ebird.org/checklist/S20166118).

17. Un individuo observado por un grupo de investigadores en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 1 de agosto de 2010 (Rodríguez *et al.* [2010] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S20164602).

18. Un ejemplar observado y fotografiado por Facundo Gandoy, Emiliano Depino, Giselle Mangini y Federico Brissón Egli en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 13 de noviembre de 2011 (Gandoy *et al.* [2014] *Nuestras Aves* 59: 21-24).

19. Un ejemplar fotografiado por Sergio Passafaro en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 20 de septiembre de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=62926).

20. Un ejemplar filmado y fotografiado por Luis Pagano y Cecilia Chiale en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 18 de abril de 2015 (youtube.com/watch?v=QLDb67ph4E; ebird.org/checklist/S72548907). El mismo fue comunicado como *Limnodromus scolopaceus*, pero posteriores revisores concluyeron que se trataría de *L. griseus*.

21-22. Dos ejemplares fotografiados por Guillermo Spajic en el puerto de San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 2 de enero de 2020 (ebird.org/checklist/S62933086). Ambos permanecieron durante varios días y pudieron ser registrados por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org). Quizás los mismos individuos fueron relocalizados en el sitio por Carlos Ferrari el 3 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S77209618).

Taxonomía: Las diferencias poblacionales y taxonómicas del género *Limnodromus* fueron estudiadas en detalle por Frank Pitelka ([1950] *University of California Publications in Zoology* 50: 1-108). Para una discusión sobre identificación ver Jaramillo & Henshaw ([1991] *Birding World* 8: 221-228), Chandler ([1998] *British Birds* 91: 93-106) y Lee & Birch ([2006] *Birding* 38 [5]: 34-42).

Comentarios: El único ejemplar obtenido fue motivo de discusión (ver Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), y aún se requieren mayores estudios para descartar con seguridad a la BECASA PICO LARGO *Limnodromus scolopaceus* (L. Pagano *obs. pers.*; Álvaro Jaramillo *in litt.*). Claudio Bertonatti y Patricio Sutton reportan un ejemplar fotografiado en Mar Chiquita, partido homónimo, Buenos Aires el 5 de abril de 1985 (Bertonatti & Sutton [1986] *Nuestras*

Aves 10: 12-13). La fotografía se encuentra depositada en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP, y en realidad corresponde a una BECASA DE MAR *Limosa haemastica*.

Especímenes (1): MACN-Or-28739

■ BECASINA GRANDE (Becasina Fueguina) | *Gallinago stricklandii* | R

Distribución: Patagonia austral e islas adyacentes, incluyendo las islas Malvinas (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Émile Oustalet menciona que no fue encontrada por la expedición francesa, pero la incluye en un cuadro (junto a *Gallinago nobilis*) para “Terre de Feu, Terre des États y Patagonie au sud do Rio Negro” (Oustalet [1891] *Mission scientifique du Cap Horn. 1882-1883. Tome VI. Première Partie*). Esto fue parcialmente repetido por Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).

2. Mencionada para las islas Malvinas como una especie rara que ocasionalmente nidifica (Bennett [1926] *Ibis* 68: 306-333).

3. Un individuo observado por Claës Olrog cerca de Las Cotorras, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego entre el 5 y el 11 de febrero de 1940 (Olrog [1948] *Acta Zoológica Lilloana* 5: 437-531).

4. Mencionada como hipotética para Tierra del Fuego (Humphrey *et al.* [1970] *Birds of Isla Grande [Tierra del Fuego]*. Smithsonian Institution).

5. Un individuo aparentemente fotografiado por Carlos Fermani en el río Ovando del PN Tierra del Fuego, Tierra del Fuego en octubre o noviembre de 1993 (Fabián Bugnest *en* Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales*. LOLA). La fotografía no se encuentra disponible.

6. Registrada por Paul Sweet en el cerro Perito Moreno, departamento Bariloche, Río Negro sin fecha (P. Sweet *en* Kovács *et al.* [2005] *Manual Ilustrado de las aves de la Patagonia*. Río Negro).

7. Kovács *et al.* ([2005] *op. cit.*) la mencionan para la isla de los Estados, islotes del canal de Beagle y ocasionalmente Tierra del Fuego e islas Malvinas.

8. Mencionada sin detalles para el norte de la isla grande de Tierra del Fuego e islas Malvinas (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA).

9. Registrada por Pedro Blendinger en Lapataia, PN Tierra del Fuego, Tierra del Fuego el 23 de febrero de 1993 (Blendinger [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).

10. Registrada con dudas por Philip Humphrey en la isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego durante el mes de abril sin especificar el año (P. Humphrey *en* Chebez & Bertonatti [1994] *La avifauna de la isla de los Estados, islas de Año Nuevo y mar circundante [Tierra del Fuego, Argentina]*. LOLA).

11. Un ejemplar fotografiado por Dag Petersen en Sea Lion Island, islas Malvinas en enero de 1998 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). La fotografía no se encuentra disponible.

12. Dos individuos sin confirmar observados por Jon Fjeldså en el lago Roca del PN Los Glaciares, Santa Cruz sin fecha (J. Fjeldså *en* Imberti [2003] *Cotinga* 19: 15-24).

13. Un individuo observado por Pablo Sturzenbaum y Paola Imberti en la estancia Cancha Carrera, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 13 de febrero de 2001 (P. Sturzenbaum y P. Imberti *en* Imberti [2003] *op. cit.*).

14. Un ejemplar fotografiado por Mike Morrison cerca de Cape Pembroke, islas Malvinas el 29 de diciembre de 2004. El mismo fue relocalizado en el sitio pocos días después (Woods [2017] *op. cit.*). La fotografía no se encuentra disponible.

15-16. Mencionada sin detalles para la península Mitre y el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego (Schiavini [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

17. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain y Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

18. Un ejemplar fotografiado por Mark Pearman en la isla de los Estados, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 14 de diciembre de 2012 (igoterra.com/taxon/view/3841/Gallinago-stricklandii; M. Pearman *in litt.*).

19. Un ejemplar fotografiado por Ulises Balza en la isla de los Estados (54°44'27"S 63°49'47"W), departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 13 de diciembre de 2019 (ebird.org/checklist/S62548904; Figura 55).

20. Un individuo observado por Ulises Balza en la isla de los Estados (54°44'14"S 63°49'19"W), departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 17 de diciembre de 2019 (U. Balza *in litt.*).

21. Un ejemplar capturado y fotografiado por Esteban Daniels y Jorge López Moreno en Ushuaia, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 12 de mayo de 2022 (ebird.org).

Comentarios: Roberto Dabbene ([1910] *op. cit.*) menciona a *Gallinago nobilis* (= *Gallinago stricklandii*) con localidad Bahía Orange aludiendo al trabajo de Émile Oustalet ([1891] *op. cit.*), aunque este sitio en realidad pertenece al territorio chileno. Un ejemplar colectado por Robert Fitzroy en Tierra del Fuego se encuentra depositado en el NHMUK y es posible que provenga del territorio chileno (Hein Van Grouw *in litt.*). Robin Woods ([2017] *op. cit.*) menciona datos inéditos y comentarios de antiguos pobladores de las islas Malvinas que la nombran localmente como *Jack Snipe*.

Tanto Claës Olrog ([1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324) como Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) suponen que el ejemplar fotografiado en Río Grande, departamento homónimo, Tierra del Fuego el 24 de octubre de 1974 (Abramson [1977] *Auk* 94: 357) corresponde a *Gallinago stricklandii*. Las fotografías depositadas en el United States Geological Survey confirman que en realidad se trata de la BECASINA PATAGÓNICA *Gallinago magellanica* (Figura 13). Del mismo modo, la fotografía de Lars Petersen presentada por Di Giacomo ([2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas) también corresponde a *Gallinago magellanica*.

Un ejemplar fotografiado por Jorge Veiga, Marcos Babarskas y Pablo Acerbo en la laguna Varvarco Tapia, departamento Minas, Neuquén el 31 de enero de 1997 (Acerbo [2000] *Aves del Río Neuquén*. AIC; Veiga *et al.* [2005] *Aves de la provincia de Neuquén*. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. Editorial RyC). La fotografía publicada corresponde a *Gallinago magellanica*. Bernabé López-Lanús (en Chebez *et al.* [1998] *op. cit.*) menciona haber registrado la especie cerca del paso Tromen, Chile en enero de 1993. Llamativamente Veiga *et al.* ([2005] *op. cit.*) utilizan este registro para incluirla dentro del PN Lanín, Neuquén. Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).



Figura 55. Becasina Grande *Gallinago stricklandii*, isla de los Estados, Tierra del Fuego, 13 de diciembre de 2019 (Ulises Balza)

■ **PLAYERITO PICO CURVO** | *Xenus cinereus* | V

Distribución: Se reproduce en una extensa área de la región Paleártica y luego migra hacia las costas de África, Australia, India y el SE asiático (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Hernán Rodríguez Goñi en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires en diciembre de 1987 y enero de 1988 (Pugnali *et al.* [1988] *Nótulas Faunísticas* 13: 1-2; Figura 56).

2. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en Saladillo, partido homónimo, Buenos Aires en diciembre de 1990 (B. López-Lanús en Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).



Figura 56. Playerito Pico Curvo *Xenus cinereus*, Punta Rasa, Buenos Aires, 10 de enero de 1988 (Hernán Rodríguez Goñi)

■ **GAVIOTA SOMBRÍA** | *Larus fuscus* | V

Distribución: Especie politípica del N de Europa y Rusia. Durante el invierno migra hacia África y el S de Asia, llegando regularmente a la costa atlántica de Norteamérica (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Una hembra joven colectada por Emiliano Mac Donagh en el faro Segunda Barranca de la bahía San Blas, partido de Patagones, Buenos Aires el 26 de marzo de 1931 (Steullet & Deautier [1939] *Notas del Museo de La Plata* 4: 245-249). El espécimen se encuentra depositado en el MLP (Figuras 57-58).

Taxonomía: Este ejemplar fue estudiado y determinado por Robert Murphy, quien además sugirió que por el tamaño del pico podría corresponder a la subespecie *graellsii* (R. Murphy en Steullet & Deautier [1939] *op. cit.*).

Comentarios: Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las Aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) consideran este registro como posiblemente erróneo.

Especímenes (1): MLP-Or-6366



Figuras 57. Gaviota Sombria *Larus fuscus*, MLP-Or-6366, bahía San Blas, Buenos Aires, 26 de marzo de 1931 (Diego Monteleone)



Figura 58. Arriba: Gaviota Cocinera *Larus dominicanus*. Abajo: Gaviota Sombria *Larus fuscus*, MLP-Or-6366, bahía San Blas, Buenos Aires, 26 de marzo de 1931 (Diego Monteleone)

■ GAVIOTÍN CHICO BOREAL | *Sternula antillarum* | V

Distribución: La subespecie nominal se reproduce en el S de Estados Unidos y el Caribe, y luego realiza una migración llegando al N de Brasil (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Claës Olrog en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, Buenos Aires el 1 de febrero de 1958 (Olrog [1969] *Neotrópica* 15: 7-8). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2. Un individuo observado por Samuel Narosky en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 11 de mayo de 1986 (Narosky & Sutton [1991] *Nuestras Aves* 25: 28-29).

3. Hasta cinco individuos observados (uno de ellos fotografiado) por Patricio Sutton y Claudio Bertonatti en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 2 de mayo de 1988 (Narosky & Sutton [1991] *op. cit.*). Al parecer las fotografías no se encuentran disponibles.

4. Un inmaduro observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 5 de enero de 1993 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).

5. Un individuo observado por David Fisher en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 24 de noviembre de 1998 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).

6. Un ejemplar fotografiado por Germán Pugnali y otros observadores en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 26 de noviembre de 2005 (ebird.org/checklist/S26700237).

7. Un ejemplar fotografiado por Claudia Mora y Santos Di Mauro en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 12 de diciembre de 2010 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=26443; Figura 59).

Taxonomía: Durante mucho tiempo considerada conespecífica con el GAVIOTÍN COMÚN *Sternula albifrons* (Massey [1976] *Auk* 93: 760-773; Massey & Atwood [1978] *Bird-Banding* 49: 360-371; Gochfeld & Burger [1996] *op. cit.*). Ambas especies tradicionalmente en el género *Sterna*, aunque recientes trabajos moleculares proponen la reutilización de *Sternula* para los “pequeños gaviotines blancos” (Bridge *et al.* [2005] *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35: 459-469).

Comentarios: Según Olrog ([1969] *op. cit.*) es muy posible que algunos gaviotines citados para las costas de Uruguay y Argentina como GAVIOTÍN DE RÍO *Sternula superciliaris*, en realidad pertenezcan a *Sterna albifrons* (= *Sternula antillarum*). Para una discusión sobre identificación ver Hayes ([2001] *Cotinga* 15: 10-13).

Especímenes (1): COFML-10832



Figura 59. Gaviotín Chico Boreal *Sternula antillarum*, Punta Rasa, Buenos Aires, 12 de diciembre de 2010 (Santos Di Mauro)

■ GAVIOTÍN NEGRO | *Chlidonias niger* | V

Distribución: La subespecie *surinamensis* nidifica en una amplia región de Norteamérica, y luego de la etapa reproductiva migra hacia Centroamérica y N de Sudamérica (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho en plumaje de reposo colectado por Johan Mogensen en Tres Pozos, Jujuy el 18 de octubre de 1928 (Olrog [1969] *Neotrópica* 15: 7-8). En la etiqueta figura la localidad “Los Pozos, Jujuy”, aunque muy probablemente se refiera a Tres Pozos, departamento General José de San Martín, Salta (ver Dabbene [1915] *Physis* 1: 532-533; Mogensen [1930] *Argentinæ dyr.* Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 60).

2-3. Un individuo en vuelo observado por Samuel Narosky en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 21 de enero de 1970. Dos días más tarde, este observador halló dos individuos junto a otros gaviotines en la misma localidad (Narosky [1971] *Hornero* 11: 129-130).

4. Dos individuos observados (macho colectado) por Julio Contreras en la laguna del Viborón, departamento Maipú, Mendoza el 5 de diciembre de 1976 (Contreras [1979] *Historia Natural* 1: 1-3). El espécimen habría sido depositado en el IADIZA, pero actualmente se desconoce su paradero (José Benjamin Bender *in litt.*; Yolanda Davies *com. pers.*).

5. Dos individuos observados en la desembocadura del río Segundo, departamento San Justo, Córdoba en marzo de 1977 (Nores & Yzurieta [1979] *Hornero* 12: 45-52).

6. Registrada por Claës Olrog y Elba Pescetti en el embalse San Felipe, departamento Chacabuco, San Luis el 20 de febrero de 1981 (C. Olrog y E. Pescetti en Nellar Romanella [1993] *Aves de la provincia de San Luis. Lista y Distribución.* San Luis).

7. Registrada en la RP Llancanelo, Mendoza antes de 1983 (Aramburu [1983] *Lista preliminar de avifauna de la laguna Llancanelo*; Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75).

8-9. De dos a cuatro ejemplares observados en la laguna de Soto, departamento Capital, Corrientes en enero y febrero de 1984 (Contreras & Contreras [1984] *Historia Natural* 3: 248).

10. Un adulto en plumaje nupcial fotografiado en la RP Llancanelo, Mendoza el 10 y 11 de abril de 1984 (Martínez *et al.* [1985] *Historia Natural* 5: 25-28). La fotografía no se encuentra disponible.

11. Tres individuos observados por Olga León y Sergio Díaz Neto al sur de Puerto Vilelas, departamento San Fernando, Chaco el 1 de abril de 1988 (León & Díaz Neto [1988] *Nótulas Faunísticas* 12: 1-2).



Figura 60. Gaviotín Negro *Chlidonias niger*, COFML-13107, Tres Pozos, Jujuy, 18 de octubre de 1928 (Luis Pagano)

Esta parece ser la fuente de la posterior mención del valle del río Paraná (Chatellenaz [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 527-550).

12. Un individuo observado en el dique Cruz de Piedra, departamento Capital, San Luis el 11 de noviembre de 1990. El ave permaneció tres días en el mismo sitio (Nellar Romanella [1993] *op. cit.*).

13. Un individuo en plumaje de reposo observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 26 de diciembre de 1991 (Jaramillo [2000] *Cotinga* 14: 33-38).

14. Un individuo en plumaje de reposo observado por Álvaro Jaramillo en Punta Rasa, partido de La Costa, Buenos Aires el 31 de diciembre de 1992 (Jaramillo [2000] *op. cit.*).

15-18. Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) mencionan cuatro registros inéditos para la provincia de Buenos Aires, sin mayores detalles: observada por Davis Finch en Punta Rasa, partido de la Costa; observada por Mariano Martínez en la albúfera Mar Chiquita, partido homónimo; observada por Adrián Di Giacomo en el puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón y observada por Horacio Rodríguez Moulin en General Lavalle, partido homónimo.

19. Un individuo volando sobre el río Paraguay frente a Puerto Fotheringham, departamento Laishí, Formosa el 30 de diciembre de 1994 (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

20. Un grupo de tres individuos observado por Alejandro Bodrati en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, Buenos Aires el 28 de septiembre de 1998 (A. Bodrati en Ferrari & Henschke [2002] *Nuestras Aves* 44: 19-20).

21. Dos individuos observados por Carlos Ferrari y Christian Henschke en la RE Costanera Sur, Buenos Aires el 29 de octubre de 2000 (Ferrari & Henschke [2002] *op. cit.*).

22. Mencionada sin detalles para el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47).

23. Un adulto en plumaje de reposo observado por Oscar Quiroga y Martín Alcalde en Cuyo, departamento Banda, Santiago del Estero el 24 de noviembre de 2012 (Quiroga *et al.* [2015] *Nuestras Aves* 60: 59-60).

24. Un ejemplar fotografiado por Miguel Ansenuza en la desembocadura del río Xanaes, departamento San Justo, Córdoba el 6 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S77135258).

Taxonomía: La subespecie americana *Chlidonias niger surinamensis* fue propuesta como especie válida, pero actualmente no es reconocida como tal (Heath *et al.* [2020] en Billerman [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology). Además de las múltiples guías de campo, para una discusión sobre identificación del género ver Alström ([1989] *British Birds* 82: 296-319).

Comentarios: Algunas observaciones sin evidencia podrían corresponder al GAVIOTÍN ALAS BLANCAS *Chlidonias leucopterus*. El GAVIOTÍN CARA BLANCA *Chlidonias hybridus* ha sido fotografiado recientemente en Paraguay (Clay [2016] *Neotropical Birding* 19: 56-58; Clay *et al.* [2017] *Revista Brasileira de Ornitología* 25: 128-136), por lo tanto no debe ser descartado a la hora de identificar estas confusas especies.

Especímenes (1): COFML-13107

■ PINGÜINO CRESTUDO | *Eudyptes sclateri* | V

Distribución: Su área de cría ocupa mayormente las islas Bounty y Antípoda al SE de Nueva Zelanda (Spencer Davis [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Un ejemplar hallado en West Point Island, islas Malvinas en noviembre de 1961. El

mismo regresó todas las temporadas entre los años 1962 y 1966. En las dos últimas se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aparentemente sin éxito (Napier [1968] *British Antarctic Survey Bulletin* 16: 71-72).

2. Un individuo observado en New Island, islas Malvinas en la temporada 1980/81 (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).

3. Un ejemplar hallado en Pebble Island, islas Malvinas en enero de 1997 y entre noviembre de 1997 y enero de 1998. El mismo fue fotografiado por Martin Scott en diciembre de 1997 (Anónimo [1998] *Birding World* 11: 258).

4. Un ejemplar (probablemente el mismo de la observación anterior) registrado en Pebble Island, islas Malvinas entre 1997 y 2008. En las temporadas 2005/06 y 2007/08 se apareó con un PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome*, aparentemente sin éxito (Morrison et al. [2006] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 6: 12-14; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC; ebird.org).

5. Un ejemplar fotografiado por Mike y Donna Evans en Port Harriet, islas Malvinas el 9 de octubre de 2005 (Woods [2017] *op. cit.*).

6. Un ejemplar fotografiado por Guillermo Rivera y un grupo de observadores en Puerto San Julián, departamento Magallanes, Santa Cruz el 28 de febrero de 2008 (Darrieu et al. [2008] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 10: 111-145; G. Rivera *in litt.*; Figura 61).

7. Un ejemplar hallado por Roxana Goronas en la isla Pingüino, departamento Deseado, Santa Cruz el 21 de febrero de 2017 (ebird.org/checklist/S34873988). El mismo permaneció en el sitio hasta marzo y luego fue fotografiado en Las Grutas, departamento San Antonio, Río Negro el 13 de diciembre de ese año (Área Natural Protegida Bahía de San Antonio).



Figura 61. Pingüino Crestado *Eudyptes sclateri*, Puerto San Julián, Santa Cruz, 28 de febrero de 2008 (Guillermo Rivera)

■ PINGÜINO CARA BLANCA | *Eudyptes schlegeli* | V

Distribución: Se reproduce únicamente en las islas Macquarie e islotes adyacentes al SO de Nueva Zelanda (Crossin et al. [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Un individuo capturado y fotografiado por Peter Prince y otros investigadores en Bird Island, Georgias del Sur el 28 y 29 de febrero de 1984 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104). Las fotografías no se encuentran disponibles.

2. Tres parejas halladas por Ian Strange nidificando en las islas Malvinas antes de 1987 (Strange [1987] *The Falkland Islands and Their Natural History*. David & Charles; Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).

3. Un individuo observado por Philip Miller en Cape Dolphin, islas Malvinas en abril de 1992 (Woods



Figura 62. Pingüino Cara Blanca *Eudyptes schlegelii*, New Island, islas Malvinas, 18 de enero de 2011 (Nina Dehnhard)

[2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

4. Un individuo observado por Keith Reid y otros observadores en Bird Island, Georgias del Sur el 30 de diciembre de 1992 (Prince & Croxall [1996] *op. cit.*).

5. Dos individuos observados en Bird Island, Georgias del Sur en noviembre de 1998 (Clarke *et al.* [2012] *British Birds* 105: 118-144; Andrew Clarke *in litt.*).

6. Un individuo observado en Bird Island, Georgias del Sur en febrero de 2000 (Clarke *et al.* [2012] *op. cit.*; Andrew Clarke *in litt.*).

7. Un subadulto fotografiado por Allan White en Pebble Island, islas Malvinas el 4 de enero de 2005 (Morrison *et al.* [2006] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 6: 12-14). La fotografía no se encuentra disponible.

8-9. Un individuo observado en Bird Island, Georgias del Sur en abril y noviembre de 2008 (Clarke *et al.* [2012] *op. cit.*; Andrew Clarke *in litt.*).

10. Un ejemplar fotografiado por Nina Dehnhard en New Island, islas Malvinas el 18 de enero de 2011 (Dehnhard *et al.* [2012] *Marine Ornithology* 40: 95-98; Figura 62). Este ejemplar quizás fue el reportado por Tony Chater para enero de ese año en el mismo sitio (Morrison & Henry [2012] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 16: 6-9).

11. Un ejemplar fotografiado por María Regina Silva en West Point Island, islas Malvinas el 27 de enero de 2011 (ebird.org/checklist/S34324944).

12. Un ejemplar fotografiado por Daniel López Velasco en Elephant Island, Península Antártica el 22 de noviembre de 2017 (ebird.org/checklist/S65232178).

13. Un ejemplar fotografiado por Micky Reeves, Martin Anstee y Andy Pollard en Sea Lion Island, islas Malvinas el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76851649).

14. Un ejemplar fotografiado por Alan Henry, David Carter y Ryan Hawksworth en Kidney Cove, islas

Malvinas el 12 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S81164287). Muy probablemente el mismo ejemplar registrado nuevamente en el sitio el 24 de febrero del mismo año (ebird.org/checklist/S82364790).

Taxonomía: En el pasado considerada una forma de PINGÜINO FRENTE DORADA *Eudyptes chrysolophus*, con una baja distancia genética entre ambos (Baker *et al.* [2006] *Proceedings of the Royal Society B* 273: 11-17).

Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Ian Strange ([2013] *Sea Swallow* 62: 62-66) reporta la presencia de la especie en Beauchêne Island, islas Malvinas sin hacer referencia a publicaciones previas y presentando una fotografía sin fecha. Las observaciones realizadas en Bird Island, Georgias del Sur probablemente correspondan al mismo ejemplar. La especie fue catalogada como No Confirmada para las islas Malvinas (Woods [2017] *op. cit.*). Un inmaduro colectado en el estrecho de Magallanes 20 km al norte de Punta Arenas, Chile al parecer es el primer registro en el continente sudamericano (Matus & Jaramillo [2008] *Cotinga* 30: 34-40).

■ PINGÜINO PICO GRUESO | *Eudyptes pachyrhynchus* | V

Distribución: Se reproduce en la isla sur de Nueva Zelanda, como así también en las islas Solander, Codfish y Stewart (Mattern [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Un ejemplar proveniente de la bahía King George, islas Malvinas sin fecha de captura



Figura 63. Pingüino Pico Grueso *Eudyptes pachyrhynchus*, NHMUK-s/n, islas Malvinas (The Natural History Museum)



Figura 64. Pingüino Pico Grueso *Eudyptes pachyrhynchus*, UMZC-1/Sph/2/b/3, islas Malvinas (Museum of Zoology, University of Cambridge)

ni datos de colector (Woods [1988] *Guide to Birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 63).

2. Un ejemplar proveniente de “*Falkland Islands*” sin fecha ni datos de colector. La identificación del mismo fue confirmada por Colin Miskelly (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El espécimen se encuentra depositado en el UMZC (Figura 64).

Comentarios: La especie fue catalogada como No Confirmada para las islas Malvinas (Woods [2017] *op. cit.*).

Especímenes (2): NHMUK-s/n, UMZC-1/Sph/2/b/3

■ PINGÜINO DE SNARES | *Eudyptes robustus* | V

Distribución: Nidificante endémico del archipiélago de Snares al S de Nueva Zelanda (Mattern [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Timothy Lamey en New Island, islas Malvinas el 10 diciembre de 1988 (Lamey [1990] *Notornis* 37: 78).

2. Registrada por Ann Crawford en Pebble Island, islas Malvinas el 10 de febrero de 2008 (ebird.org/checklist/S10344084).

3. Un adulto fotografiado por Laurent Demongin en New Island, islas Malvinas el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2008 (Demongin *et al.* [2010] *Wilson Journal of Ornithology* 122: 190-193; Figura 65).

4. Un inmaduro fotografiado por Laurent Demongin en New Island, islas Malvinas el 24 y 25 de diciembre de 2008 (Demongin *et al.* [2010] *op. cit.*).

5. Un ejemplar fotografiado por Mariana Martínez en el PN Monte León, Santa Cruz el 26 de noviembre de 2013. El mismo permaneció en el área al menos hasta el 9 de diciembre de ese año (ebird.org/checklist/S72780147).

6. Dos individuos observados (uno fotografiado) por Adam y Alison Howe en Black Point, islas Malvi-



Figura 65. Pingüino de Snares *Eudyptes robustus*, New Island, islas Malvinas, 30 de noviembre de 2008 (Laurent Demongin)

nas el 21 de enero de 2014 (Morrison [2014] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands* 2013. Falklands Conservation; Morrison [2014] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 21: 16-17).

7. Un ejemplar fotografiado por Ariel Renán Alonso en Cabo Santo Domingo, departamento Río Grande, Tierra del Fuego el 20 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51989793). La identificación fue confirmada por Santiago Imberti y Colin Miskelly (*in litt.*).

8. Un ejemplar observado por Canela Fernández en la estancia Palermo Aike, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 19 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79741173).

Comentarios: Un adulto fotografiado por Fabio Olmos en Pebble Island, islas Malvinas el 11 y 12 de enero de 2006 fue mencionado como *Eudyptes robustus* (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros), y posteriormente reidentificado como PINGÜINO PENACHO AMARILLO *Eudyptes chrysocome filholi* (ebird.org/checklist/S39208395).

■ ALBATROS CORONA BLANCA | *Thalassarche steadi* | R

Distribución: Nidifica en las islas Disappointment, Auckland, Bollons y Antípodas al S de Nueva Zelanda. Luego se distribuye por los mares australes siendo común en la costa occidental de Sudamérica, especialmente el centro y S de Chile (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar hallado en una colonia de ALBATROS CEJA NEGRA *Thalassarche melanophrys* en Bird Island, Georgias del Sur durante febrero y octubre 2003. El mismo fue analizado genéticamente e identificado como *Thalassarche steadi* (Phalan *et al.* [2004] *Emu* 104: 359-361). Posteriormente se apareó con una hembra de *T. melanophrys* desde la temporada 2007/08 generando pichones esa temporada y las dos siguientes (Clarke *et al.* [2012] *British Birds* 105: 118-144).

2. Un ejemplar hallado muerto por Els Vermeulen y Alejandro Cammareri en San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro el 4 de marzo de 2008 (Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

Taxonomía: Seguimos los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies distintas: *T. cauta*, *T. steadi*, *T. salvini* y *T. eremita*. Al igual que en otras especies del grupo, la identificación específica de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25).

Comentarios: Adultos observados cerca de las islas Malvinas podrían haber pertenecido a esta especie (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee). Clarke *et al.* ([2012] *op. cit.*) lo consideran como un visitante raro en las islas Georgias del Sur, probablemente desde la pequeña población que migra hacia aguas templadas del océano Atlántico sur. Es posible que la mayoría de los ejemplares inmaduros registrados frente a la costa de Buenos Aires pertenezcan a esta especie (ver *Taxa No Asignados a Nivel de Especie*).

Especímenes (1): MACN-Or-69369

■ PAÍÑO VIENTRE BLANCO | *Fregetta grallaria* | R

Distribución: Regiones subtropicales del hemisferio sur. La subespecie *leucogaster* nidifica en las islas Saint Paul, Amsterdam y Tristan da Cunha de los océanos Índico y Atlántico (Onley & Scofield [2010]

Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar capturado y dibujado por Sidney Parkinson a bordo del HMS *Endeavour* en la desembocadura del río de la Plata (37°S) en diciembre de 1768 (Salvin [1876] *Ornithological Miscellany* 1: 223-238, 249-257). Al parecer el espécimen no fue conservado, ya que no se encuentra en las colecciones del NHMUK (Hein Van Grouw *in litt.*).

2. Registrada por Robert Murphy al norte de las islas Georgias del Sur el 15 de marzo de 1914 (Murphy [1914] *Auk* 31: 439-457).

3. Un individuo observado por John Dearborn y William Townsend al noroeste de las islas Georgias del Sur (52°20,7'S 40°05,9'W) el 10 de mayo de 1975 (Eakin *et al.* [1986] *Antarctic Research Series* 44: 69-86).

4. Un individuo observado por Stan da Prato unos 320 km al noreste de Cape Pembroke, islas Malvinas en agosto de 1983 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

5. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 24 de febrero de 1990 (Gregory [1994] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 12-20).

6. Un individuo observado por Mike Winter y William Bourne entre 110 y 150 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 3 de marzo de 1990 (Woods [2017] *op. cit.*).

7-8. Dos individuos registrados en la zona de los 61°S 62°W y 62°S 62°W el 29 de noviembre de 1992 (Orgeira [1997] *Hornero* 14: 184-192; Orgeira [2001] *Ornitología Neotropical* 12: 45-55; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

9-16. Ocho individuos registrados en la zona de los 45°S 51°W el 24 de diciembre de 1992 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

17-19. Tres individuos registrados en la zona de los 38°S 53°W el 2 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

20. Un individuo registrado en la zona de los 39°S 59°W el 3 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

21-22. Dos individuos registrados en la zona de los 46°S 56°W el 11 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

23-24. Dos individuos registrados en la zona de los 49°S 54°W el 12 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

25. Un individuo registrado en la zona de los 56°S 48°W el 13 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

26-27. Dos individuos registrados en la zona de los 60°S 44°W el 14 de noviembre de 1994 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

28. Un individuo registrado en la zona de los 54°S 61°W el 11 de enero de 1995 (Orgeira [1997] *op. cit.*; Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

29. Un individuo registrado en la zona de los 41°S 61°W el 30 de noviembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

30-31. Dos individuos registrados en la zona de los 52°S 62°W el 2 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

32. Un individuo registrado en la zona de los 60°S 46°W el 6 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

33-46. Catorce individuos registrados en la zona de los 61°S 54°W el 7 de diciembre de 1995 (Orgeira [2001] *op. cit.*; José L. Orgeira IAA *in litt.*).

47-69. Un total de 23 individuos observados al norte y al este de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero de 2001 (Woods [2017] *op. cit.*).

70. Un individuo observado por Santiago Imberti entre la isla de los Estados y las islas Malvinas el 3 de diciembre de 2004 (ebird.org/checklist/S27200236).

71-72. Dos individuos observados por Santiago Imberti entre 350 y 500 km al sudeste de Cape Pembroke, islas Malvinas el 13 de marzo de 2005 (S. Imberti *en Woods* [2017] *op. cit.*).

73. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).

74-77. Cuatro individuos registrados en la zona de los 60°S 56°W el 10 de marzo de 2009 (José L. Orgeira IAA *in litt.*).

78. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

79. Registrada por Pritam Baruah entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas el 11 de junio de 2013 (ebird.org/checklist/S59094522).

80. Un ejemplar fotografiado por Mike Greenfelder frente a la costa de Buenos Aires el 26 octubre de 2017 (ebird.org/checklist/S40137531).

81. Un ejemplar fotografiado por Doug Gochfeld unos 450 km al este de las islas Malvinas el 20 febrero de 2019 (ebird.org/checklist/S53642608).

Taxonomía: En el pasado tratada como una subespecie del PAÍÑO VIENTRE NEGRO *Fregetta tropica*. Steve Howell ([2010] *Dutch Birding* 32: 36-42) sugiere que existen unas cuatro o cinco especies de “paiños de vientre blanco”: tres en el océano Pacífico y una o dos en el océano Atlántico. Tentativamente los registros argentinos son asignados a la forma *Fregetta (grallaria) leucogaster* (Gould, 1844) que nidifica en las islas Tristan da Cunha, Gough, Amsterdam y Saint Paul.

Algunos autores sugieren que *melanoleuca* es una forma de vientre blanco del PAÍÑO VIENTRE NEGRO *Fregetta tropica*. En las islas Gough y Tristan da Cunha ocurre una confusa situación en donde coexisten dos formas con diferencias morfológicas, siendo las de Gough más pequeñas y de alas más cortas pero de patas más largas (Howell [2010] *op. cit.*).

Comentarios: Roberto Dabbene ([1922] *Hornero* 2: 241-254) menciona la forma *leucogaster* con relación al Atlántico sur, pero sin hacer referencia directa al territorio nacional. El mapa de esta especie presentado en dicho trabajo corresponde a la página 253 (uno de los mapas de la página anterior al parecer pertenece a *F. tropica*). Las observaciones efectuadas cerca de las islas Malvinas (White *et al.* [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee), fueron luego desestimadas por Woods ([2017] *op. cit.*).

■ PAÍÑO PINCOYA | *Oceanites pincoyae* | V

Distribución: Aguas alrededor de la isla de Chiloé y el seno de Reloncaví, Chile y zona adyacente de la Argentina (Harrison *et al.* [2013] *Auk* 130: 180-191).

Registros: 1. Una hembra joven colectada por Andor Kovács en El Bolsón, departamento Bariloche, Río Negro el 15 de febrero de 1972 (Pearman [2000] *Hornero* 15: 141-143). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2. Un macho adulto colectado por Andor Kovács en El Bolsón, departamento Bariloche, Río Negro el 5 de noviembre de 1983 (Pearman [2000] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un individuo observado por Félix Vidoz en el lago Puelo a la altura del arroyo Ocinao, PN Lago Puelo, Chubut el 5 de febrero de 1997 (F. Vidoz *in litt.*).

4. Un individuo observado por Félix Vidoz, Néstor Palmetti, César Vigueras y Marcelo Aravena cerca de Puerto Bueno, PN Lago Puelo, Chubut el 29 de noviembre de 2003 (F. Vidoz *in litt.*).

5. Un ejemplar colectado y fotografiado por Félix Vidoz y Alberto Boyer cerca de la Puntilla de las Papas, PN Lago Puelo, Chubut el 16 de noviembre de 2006 (F. Vidoz *in litt.*; Figuras 66-67). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.



Figuras 66-67. Paíño Pincoya *Oceanites pincoyae*, MACN-Or-71166, PN Lago Puelo, Chubut, 16 de noviembre de 2006 (Alberto Boyer)

6. Un ejemplar filmado por el guardaparque Nicolás Vallejo en el PN Lago Puelo, Chubut el 9 de febrero de 2014 (Félix Vidoz *in litt.*).

7. Un individuo observado por Félix Vidoz en el PN Lago Puelo, Chubut el 28 de abril de 2015 (F. Vidoz *in litt.*).

8. Un ejemplar fotografiado por el guardaparque Nicolás Vallejo en el PN Lago Puelo, Chubut el 18 de septiembre de 2017 (Félix Vidoz *in litt.*).

9. Un ejemplar fotografiado por Julián Torres en el PN Lago Puelo, Chubut el 3 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76758738). El registro figura como “no confirmado” por dicha fuente.

Taxonomía: Los especímenes provenientes de El Bolsón, Río Negro fueron publicados como los primeros PAÍÑO DE ELLIOT *Oceanites gracilis* de Argentina (Pearman [2000] *op. cit.*). Estos actualmente constituyen los paratipos de esta especie recientemente descrita para la ciencia (Harrison *et al.* [2013] *op. cit.*).

Comentarios: Balín Sívori, uno de los antiguos dueños del lago Esperanza, departamento Cushamen, Chubut comentó observar “varias veces sobre las olas al tormentín, un pajarito que caminaba sobre el agua cuando el lago estaba picado” (Félix Vidoz *in litt.*). Un espécimen de *Oceanites* capturado en el PN Nahuel Huapi, Río Negro permaneció depositado en el MP (Christie *et al.* [2004] *Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía*. LOLA), pero actualmente se encuentra perdido (Ignacio Roesler *in litt.*).

Especímenes (3): MACN-Or-52481, MACN-Or-53381, MACN-Or-71166

■ PAÍÑO CARA BLANCA | *Pelagodroma marina* | R

Distribución: Mayormente en mares templados y subtropicales del hemisferio sur. La subespecie nominal se reproduce en las islas Tristan da Cunha y Gough del océano Atlántico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).

Registros: 1. El ejemplar tipo provino de una captura y dibujos realizados por Sidney Parkinson a bordo del HMS *Endeavour* en diciembre de 1768. Joannis Latham ([1790] *Index Ornithologicus*. Volume II)

menciona la localidad como “mar austral, 37°S”. Posteriormente Osbert Salvin ([1876] *Ornithological Miscellany* 1: 223-238, 249-257) la determina como en la desembocadura del río de la Plata a los 37°S. Al parecer el espécimen no fue conservado, ya que no se encuentra en las colecciones del NHMUK (Hein Van Grouw *in litt.*).

2. Registrada por el capitán Richard Päfsler frente a la costa patagónica (46,8°S 63°W) el 9 de mayo de 1913 (Päfsler [1915] *Ornithologische Monatsberichte* 23: 59-61). Esta quizás sea la fuente del comentario de Rodolphe Meyer de Schauensee ([1970] *A guide to the birds of South America*. Wynnewood. Livingston) con referencia a las aguas patagónicas.

3. Mencionada por Carlos Marelli para la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires (Marelli [1924] *Memorias del Ministerio de Obras Públicas 1922-1923*: 597-665). Esto fue repetido por Ringuelet & Aramburu ([1957] *Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires* 119: 1-94).

4. Mencionada sin detalles para las aguas frente a Mar del Plata, Buenos Aires (Meyer de Schauensee [1970] *op. cit.*).

5. Incluida para la avifauna argentina como visitante de altamar, sin mayores detalles (Olrog & Capllonch [1986] *Historia Natural. Suplemento 2*: 1-41).

6. Tres individuos observados a los 45°52'S 51°23'W el 24 de diciembre de 1992 (Montalti & Orgeira [1997] *Marine Ornithology* 25: 67).

7. Un individuo observado por William Curtis 230 km al norte de Cape Dolphin, islas Malvinas el 26 de septiembre de 1994 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

8. Un individuo observado al sur de Tierra del Fuego (55°04'S 66°07'W) el 4 de junio de 1995 (Montalti & Orgeira [1997] *op. cit.*).

9. Un número no precisado de individuos observados por Henrik Kylin frente a la costa de Buenos Aires entre los 39°36'S 57°46'W y 39°59'S 58°11'W el 20 de noviembre de 2007 (Kylin [2013] *Ornis Svecica* 23: 117-122).

10. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

Comentarios: A. K. Ross ([1986] *Sea Swallow* 35: 66-67) describe esta especie como una de las presas obtenidas por un HALCÓN PEREGRINO *Falco peregrinus* unos 32 km al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 26 de marzo de 1986. Lamentablemente los restos no fueron conservados y la identidad del ave permanece sin confirmar (Woods [2017] *op. cit.*). Si bien optamos por incluir esta especie en la lista argentina, es imprescindible obtener mayor documentación que permita aclarar su estatus en aguas territoriales. El registro mapeado por Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides) seguramente corresponda a alguna de las citas mencionadas arriba.

■ PAÍÑO BOREAL | *Oceanodroma leucorhoa* | V

Distribución: Su área de cría comprende las costas de los océanos Atlántico y Pacífico norte, mientras que durante el invierno boreal se desplaza hacia mares tropicales. Las principales zonas de invernada de la población atlántica son el golfo de Guinea y las aguas frente a Brasil y Sudáfrica (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar capturado y fotografiado por Steffen Hahn y Petra Quillfeldt en la península Potter de la isla King George, Shetland del Sur el 21 de febrero de 1996 (Hahn & Quillfeldt [1998] *Marine Ornithology* 26: 80; Figura 68).

2. Dos individuos observados por Santiago Imberti unos 240 km al sudeste de Miramar, Buenos Aires (40°20'S 57°07'W) el 14 marzo de 2000 (Imberti [2002] *Marine Ornithology* 30: 32-33).

3. Un individuo observado unas 120 millas al este de Puerto Stanley, islas Malvinas el 27 de marzo de 2003 (Black *et al.* [2004] *Rare and vagrant birds in the Falkland Islands 2003*. Falklands Conservation).

4. Mencionada sin detalles para la provincia de Río Negro (Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

Taxonomía: A veces incluida dentro del género *Hydrobates*. Especie politípica y de compleja variación geográfica, la forma nominal habita en el océano Atlántico (Ainley [1980] *Auk* 97: 837-853).

Comentarios: El ave capturada en Shetland del Sur (Hahn & Quillfeldt [1998] *op. cit.*) presentaba parche de incubación, insinuando que podría haber nidificado en esas islas.



Figura 68. Paño Boreal *Oceanodroma leucorhoa*, King George Island, Shetland del Sur, 21 de febrero de 1996 (Steffen Hahn y Petra Quillfeldt).

■ PARDELA PATAS ROSAS | *Ardenna creatopus* | V

Distribución: Nidifica en las islas Juan Fernández y Mocha, en el océano Pacífico frente a Chile. Luego de la reproducción se desplaza hacia el norte llegando hasta Alaska (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Guillermo Harris en Punta Conos ubicada en el golfo San José, departamento Biedma, Chubut en mayo de 1981 (Mazar Barnett & Navas [1998] *Hornero* 15: 43-44). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 69).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Puffinus* (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

Comentarios: Un individuo observado por David Doolittle en aguas del canal de Beagle frente a la isla Picton, Chile puede considerarse un registro limítrofe (ebird.org/checklist/S65973546).

Especímenes (1): MACN-Or-52790



Figura 69. Pardela Patas Rosas *Ardenna creatopus*, MACN-Or-52790, Punta Conos, Chubut, mayo de 1981 (Diego Monteleone)

■ PIQUERO DEL CABO | *Morus capensis* | V

Distribución: Se reproduce exclusivamente en las costas de Namibia y Sudáfrica. Fuera de la temporada reproductiva se dispersa hasta el golfo de Guinea y Mozambique (Carboneras [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado por Patrick Bergkamp en San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro el 7 y 12 de noviembre de 1992 (Bergkamp [1995] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 115: 71).

2. Un ejemplar fotografiado por Margarita Acuña en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 21 de enero de 1995 (Ramírez Llorens [1996] *Hornero* 14: 67-68).

3. Un ejemplar fotografiado por María Eugenia Echave, Patricia González y Vanesa Calvo en la bahía San Antonio, departamento homónimo, Río Negro el 19 de noviembre de 1995 (P. González *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La fotografía fue publicada posteriormente con una fecha errónea (Povedano [2016] *Aves de la provincia de Río Negro*. La Plata; Patricia González *in litt.*).

4. Un individuo observado por Patricia González, María Eugenia Echave y Vanesa Calvo en la bahía San Antonio, departamento San Antonio, Río Negro el 31 de octubre de 1996 (P. González *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

5. Un ejemplar fotografiado en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 23 de noviembre de 2007 (Rebstock *et al.* [2010] *Ostrich* 81: 167-169).

6. Un individuo observado en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 29 de noviembre de 2007 (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).



Figura 70. Piquero del Cabo *Morus capensis*, Punta León, Chubut, 17 de noviembre de 2008 (Walter Svagelj)

7-8. Un ejemplar fotografiado por Walter Svagelj en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 17 de noviembre de 2008 (Figura 70). Posiblemente el mismo individuo fue observado en dicha localidad el 28 de noviembre de ese año (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).

9. Un ejemplar fotografiado en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 25 de diciembre de 2008 (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*).

10. Un ejemplar fotografiado por Patricia González, Gimena Mora y Matías Suárez en Punta Villarino, departamento San Antonio, Río Negro el 5 de marzo de 2011. Dos días más tarde fue observado por Mirta Carbajal en la restinga Los Álamos, departamento San Antonio, Río Negro (Povedano [2016] *op. cit.*).

Comentarios: Todos los registros en territorio argentino corresponden a individuos adultos. Las observaciones realizadas en Punta León y Punta Tombo, Chubut muy probablemente correspondan al mismo ejemplar (Rebstock *et al.* [2010] *op. cit.*). Un ejemplar fotografiado por Steve James en Las Grutas, departamento San Antonio, Río Negro en abril y junio de 2020 posiblemente se trate de esta especie (James [2020] *Neotropical Birding* 27: 5-13; ebird.org/checklist/S69762379).

■ PIQUERO PARDO | *Sula leucogaster* | V

Distribución: Especie politípica ampliamente distribuida en regiones tropicales. La subespecie nominal ocupa el Caribe y el océano Atlántico llegando hasta las costas de Brasil (Carboneras [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un adulto obtenido por César Hyppolite Bâcle en “Buenos Aires (Argentina)”, sin fecha (Hellmayr & Conover [1948] *Catalogue of birds of the Americas*. Zoological Series. Volume XIII. Part I). El espécimen se encuentra depositado en el MHNG.

2. Un juvenil capturado en el río de la Plata, Buenos Aires el 11 de julio de 1952. El mismo murió tres días después en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, y la fotografía del espécimen montado fue debidamente publicada (Haedo Rossi [1956] *Hornero* 10: 166-167). Este ejemplar al parecer se encuentra perdido en la actualidad, ya que no se encuentra en el MACN y tampoco en las colecciones del zoológico de Buenos Aires (Yolanda Davies y Rodrigo Fariña *in litt.*).

3. Un ejemplar observado por Pablo Canevari en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires en febrero de 1975 (P. Canevari *en* Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

4-5. Un ejemplar y dos huevos colectados por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas el 3 de septiembre de 1966 y en octubre del mismo año respectivamente (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). Ambos fueron publicados como obtenidos en “Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen” (Kinzelbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016*. Zoologische Sammlung der Universität Rostock. Basilikenpresse). El espécimen (ZSRO-744) contiene los datos “Falkland-Inseln 03.09.1966”, aunque preferimos tratarlo como un registro hipotético o probablemente erróneo.

Comentarios: Prosper Garnot ([1826] *Annales des Sciences Naturelles* 7: 39-59) mencionó a *Sula fiber* (= *Sula leucogaster*) como uno de los tres cormoranes que habitan las islas Malvinas, en su visita al archipiélago entre noviembre y diciembre de 1822. Esta cita fue repetida en numerosos trabajos, hasta que finalmente Michael Carins ([1974] *Ardea* 62: 242-245) realiza un minucioso análisis concluyendo que las aves descritas por Garnot corresponden a inmaduros de CORMORÁN CUELLO NEGRO *Phalacrocorax magellanicus*. Los datos del espécimen del MHNG podrían referirse al sitio de compra e incluso obtenido en otras localidades visitadas por el colector como Centroamérica, Brasil o Senegal (Laurent Vallotton *in litt.*).

Especímenes (1): MHNG-156.065