

■ **GUANAY** | *Phalacrocorax bougainvillii* | **R**

Distribución: Costa de Perú y N de Chile, con una población aislada en las costas del centro de Argentina (Orta [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Francisco Erize en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en enero de 1967 (Erize [1970] *Animals* 13: 235-237; Erize [1972] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 117-118).

2-3. Registrada en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en febrero de 1968 y febrero de 1969 (Francisco Erize en Boswall & Pritherch [1972] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 118-129).

4. Una hembra colectada por Jorge Rodríguez Mata en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 22 de diciembre de 1969. En ese momento había unas 50 parejas nidificando en el sitio (Anónimo [30.12.1969] *Diario Jornada*. Trelew & Rawson; Navas [1970] *Neotrópica* 16: 11-16; Erize [1972] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Unas diez parejas observadas y un macho colectado por Claës Olrog en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 14 de enero de 1971 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 267-274). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

6. Un total de diez nidos hallados por Jeffery Boswall y Robin Prytherch en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut entre el 13 y el 19 de noviembre de 1971 (Boswall & Prytherch [1972] *op. cit.*).

7. Algunas parejas observadas por Jeffery Boswall, Donald MacIver y Douglas Fisher en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut entre el 10 y el 26 de octubre de 1972 (Boswall [1973] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 93: 33-36).

8. Unos 100 nidos observados por Mauricio Rumboll y Joseph Jehl en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 21 y 22 de noviembre de 1973 (Jehl & Rumboll [1976] *Transactions of the San Diego Society of Natural History* 18: 145-154).

9. Mencionada por Mauricio Rumboll como nidificando en bajo número en Cabo Dos Bahías, departamento Florentino Ameghino, Chubut sin fecha (Jehl & Rumboll [1976] *op. cit.*).

10. Varios ejemplares fotografiados y veinte anillados por Juan Daciuk en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en enero de 1974 (Daciuk [1977] *Hornero* 11: 349-360; Daciuk [1977] *Hornero* 11: 361-376).

11. Un macho joven y una hembra adulta colectados por Andor Kovács en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 26 de abril de 1978. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

12. Un macho adulto colectado por Andor Kovács en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 5 de noviembre de 1978. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

13. Un pequeño grupo fotografiado por Juan C. Chebez en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1978 (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).

14. Varios nidos fotografiados por Martín de la Peña en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 5 de noviembre de 1979 (de la Peña [1980] *Historia Natural* 1: 109-112).

15-17. Tres ejemplares adultos registrados en Punta León, departamento Rawson, Chubut durante las temporadas 1980/81 y 1981/82. La población de este sitio alcanzó los 9 ejemplares en el periodo 1982/83 (Malacalza [1984] *Contribución N°84*. CeNPat. Conicet).

18-19. Un total de 33 parejas registradas en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut durante las temporadas 1980/81 y 1981/82 (Malacalza [1984] *op. cit.*).

20. Siete parejas nidificando en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut durante la temporada 1982/83 (Malacalza [1984] *op. cit.*).

21. Varios ejemplares fotografiados por Carlos Saibene y Samuel Narosky en Punta Tombo, departa-

mento Florentino Ameghino, Chubut el 15 de noviembre de 1983. En ese momento había entre 7 y 10 nidos en el lugar (C. Saibene *in litt.*; ver también de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 3: 1-165). Las fotografías se encuentran depositadas en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP.

22. Un total de ocho individuos (tres parejas puras y dos parejas mixtas con el CORMORÁN REAL *Phalacrocorax albiventris*) registradas en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1992 (Malacalza y Bertellotti [2001] *Ornitología Neotropical* 12: 83-86).

23-24. Un total de nueve parejas (tres en Punta León y seis en Punta Lobería, Chubut) censadas entre los años 1993 y 1995 (Yorio [1998] *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural; Yorio [1999] *Bird Conservation International* 9: 299-314). Es probable que algunas de las aves registradas en Punta Lobería correspondan a híbridos entre esta especie y *Phalacrocorax albiventer* (Malacalza & Bertellotti [2001] *op. cit.*).

25. Un individuo observado por Juan Manuel Grande en Punta León, departamento Rawson, Chubut el 29 de noviembre de 1999 (ebird.org/checklist/S31832035).

26. Cuatro individuos puros hallados en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut en diciembre de 1999. Dos de ellos estaban formando parejas mixtas con *Phalacrocorax albiventer* y los otros dos con híbridos entre *P. bougainvillii* x *P. albiventer* (Malacalza & Bertellotti [2001] *op. cit.*; Bertellotti *et al.* [2003] *Biodiversity and Conservation* 12: 743-747).

27. Cinco individuos (una pareja pura y tres individuos apareados con *Phalacrocorax albiventer* o con híbridos) observados por Germán Pugnali y otros observadores en Punta Lobería, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 18 de noviembre de 2002 (Pugnali [2002] *Nuestras Aves* 44: 6-7).

28. Cuatro individuos observados en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego entre el 9 y el 18 de noviembre de 2002 (Savigny *et al.* [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).

29. Walter Svagelj comenta que actualmente existe “un único individuo adulto de Guanay” en Punta León, departamento Rawson, Chubut sin mayores detalles (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Comentarios: Claës Olrog ([1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264) menciona que fueron unas 200 parejas las que se encontraban nidificando en Punta Tombo, Chubut en diciembre de 1969. El espécimen NMNH-A15682 posee una localidad errónea, tal como figura en su etiqueta (Christopher Milenksy *in litt.*). Los especímenes DMNS-16282 y DMNS-16719 corresponden a inmaduros de CORMORÁN CUELLO NEGRO *Phalacrocorax magellanicus* (Andrew Doll *in litt.*). Para un resumen sobre el estado de las poblaciones de cormoranes en la costa patagónica ver Frere *et al.* ([2005] *Hornero* 20: 35-52). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *op. cit.*).

Especímenes (5): MACN-Or-51508, MACN-Or-52482, MACN-Or-52483, MACN-Or-52484, CO-FML-13155

■ ÁGUILA MONERA | *Morphnus guianensis* | R

Distribución: Desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Sudamérica, la Amazonía, SE de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: 1. Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216) la incluye para “Paraguay y Misiones Argentinas”, y comenta la colecta de un ejemplar en la frontera entre Paraguay y Argentina (27°18’S) en octubre de 1887. Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención



Figura 71. Águila Monera *Morphnus guianensis*, MJF-s/n, Cerro Azul, Misiones, entre 1980 y 1981 (Diego Monteleone)

de Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). El espécimen al parecer se encuentra perdido.

2. Un ejemplar colectado en Cerro Azul, departamento Leandro Alem, Misiones entre fines de 1980 y mayo de 1981 (Cecilia Foerster *com. pers.*). El espécimen se encuentra depositado en el MJF (Figura 71).

3. Una pareja observada por Mauricio Rumboll y Roberto Straneck en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1980 (Olrog [1985] en Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors*. ICBP Technical Publication N°5).

4. Un individuo observado por Javier Pereira y Pablo Rodríguez en el PP Uruguayí, Misiones el 23 de mayo de 1996 (J. Pereira y P. Rodríguez en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).

5. Un individuo observado por Mark Pearman en el PP El Piñalito, Misiones el 26 de septiembre de 1999 (Pearman [2001] *Cotinga* 16: 76-80).

6. Registrada por Ricardo Melsew y Agustín Paviolo en el PN Iguazú, Misiones sin fecha ni otros detalles (Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).

Comentarios: La observación realizada por Freddy Burgos cerca de Tobuna, departamento San Pedro, Misiones (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros) fue finalmente descartada por el mismo observador (Freddy Burgos *in litt.*). El espécimen depositado en el MJF ya había sido mencionado en la literatura (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*; Chebez [2008] *op. cit.*). La proveniencia y fecha de dicho espécimen fueron recientemente aclaradas mediante una entrevista con la curadora del Museo de la Selva Juan Foerster (Cecilia Foerster *com. pers.*). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): MJF-s/n

■ **HARPIA** | *Harpia harpyja* | **R**

Distribución: Desde el S de México y Centroamérica hasta el N de Sudamérica, SE de Brasil, Paraguay y N de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: 1-2. Mencionada para Chaco y Orán por Martín de Moussy, sin mayores detalles (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères). Estas localidades fueron repetidas por varios autores posteriores.

3. Un ejemplar colectado en la “sierra de Misiones” en el año 1887 (Bertoni [1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-216). Este dato quizás sea la fuente para la posterior mención de San Pedro, departamento homónimo, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). El espécimen al parecer se encuentra perdido en la actualidad.

4. Observada por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1923 (F. Kruse en Forcelli et al. [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30).

5. Un individuo adulto observado por Claës Olrog en la frontera entre Tucumán y Salta en octubre de 1950 (Olrog [1950] *Acta Zoológica Lilloana* 9: 471-474).

6. Un ejemplar cazado en Campo Grande, departamento Cainguás, Misiones sin más detalles (Foerster [1972] *Neotrópica* 18: 146-148). Al parecer el espécimen no fue conservado.

7. Un ejemplar capturado y mantenido vivo durante una semana en Eldorado, departamento homónimo, Misiones sin fecha (Foerster [1972] *op. cit.*). Aparentemente el espécimen no fue conservado.

8. Una hembra juvenil capturada por Otto Krausmann en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones y entregada a Juan Foerster el 25 de mayo de 1972 (Foerster [1972] *op. cit.*). El ejemplar permaneció durante años en el zoológico Zoo Bal Park de esa localidad, hasta que finalmente murió en julio de 2001 (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros; Guillermo Gil *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el CNH.

9. Una hembra adulta colectada en Palmera Fondo, departamento San Pedro, Misiones en abril de 1958 (Navas & Bó [1991] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 95-106). Al parecer había sido capturada viva por Müller en el km 46 de la ruta provincial n°17 entre Eldorado y Bernardo de Irigoyen, Misiones en el año 1958 (Federico Kruse en Forcelli et al. [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

10. Un ejemplar colectado por Rubén Maletti en Cerro Moreno, departamento Cainguás, Misiones antes de 1980 (Chebez [1992] *op. cit.*; Ordano & Bosisio [1997] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 117: 77-79). El espécimen se encuentra depositado en el MFA.

11. Un individuo observado por Guillermo Gil, Justo Herrera, Carlos Galliari y Miguel Rinas en el arroyo Urugua-í, departamento Iguazú, Misiones el 22 de agosto de 1986 (Chebez [1992] *op. cit.*).

12. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa, en base a la literatura previa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52).

13. Un antiguo nido hallado en el paraje Campana (26°47'S 54°55'W), departamento San Pedro, Misiones el 28 de abril de 1987. El mismo se encontraba activo al menos hasta julio de 1984, y un juvenil fue capturado a unos 2 km del lugar a fines de 1987 (Chebez et al. [1990] *Hornero* 13: 155-158).

14. Un pichón capturado cerca del arroyo del Niño, departamento Eldorado, Misiones en noviembre de 1987. El nido fue visitado por Juan C. Chebez el 24 de abril de 1988 (Chebez et al. [1990] *op. cit.*). El ejemplar aún permanece en el zoológico Zoo Bal Park de Montecarlo, departamento homónimo, Misiones (Guillermo Gil *in litt.*).

15. Un antiguo nido hallado en la sierra Morena, departamento Iguazú, Misiones el 4 de septiembre de 1988. En el lugar se encontró un pichón lastimado que murió al poco tiempo, y cuyo espécimen permaneció en el centro de visitantes del PP Urugua-í, Misiones (Chebez et al. [1990] *op. cit.*). El espécimen al parecer se encuentra perdido (Guillermo Gil *in litt.*).

16. Un nido exitoso hallado en el establecimiento María Magdalena, departamento Eldorado, Misiones a fines de 1990. El mismo fue estudiado por Eduardo De Lucca y otros investigadores entre agosto de 1991 y marzo de 1992 (De Lucca [1996] *Hornero* 14: 70-72). Algunas fotografías obtenidas por Daphne Cooper de Colcombette fueron publicadas posteriormente (Chebez [2008] *op. cit.*).
17. Registrada en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 19 de junio de 1995 (Mark Pearman en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Puerto Iguazú).
18. Registrada por O. Barquinero en el puente de los López, departamento San Pedro, Misiones en el año 1997 (O. Barquinero en Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
19. Un nido caído hallado por Jorge Anfuso sobre el arroyo Victoria cerca de Pozo Azul, departamento San Pedro, Misiones en el año 1999. El pichón al parecer fue capturado y vendido en la zona de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Brasil (Anfuso *et al.* [2008] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 21: 1-13).
20. Un juvenil filmado por Luis Sáenz en el campo Los Palmitos, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en noviembre de 2003. Posteriormente se lo volvió a hallar junto a un nido y dos adultos, que fueron estudiados por Jorge Anfuso y otros investigadores entre marzo y noviembre de 2004 (Anfuso *et al.* [2008] *op. cit.*).
21. Un adulto observado por Claudio Maders y Hugo Geier al sur del PP Esmeralda cerca de la comunidad Tacuarujú, Misiones en el año 2004 (Boدراتi *et al.* [2005] en Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).
22. Mencionada sin detalles para el camino hacia la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones (Ricardo Melsew en Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
23. Una pareja observada por Ignacio Roesler, Mark Pearman y Emilio Jordan en el PN Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2007 (I. Roesler en Anfuso *et al.* [2008] *op. cit.*).
24. Un adulto observado por Alejandro Bodrati en el límite entre la reserva natural Guaraní y la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 26 de junio de 2012 (Bodrati [2016] *Nuestras Aves* 61: 26).
25. Un individuo adulto observado por Horacio Matarasso y un grupo de observadores en el PN Iguazú, Misiones el 23 de julio de 2013 (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EV-VEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN; ebird.org/checklist/S21045549).
26. Un ejemplar inmaduro colectado en la provincia de Misiones, sin datos de fecha ni colector (Daniel Acosta *com. pers.*). El espécimen se encuentra exhibido en el CNH.

Comentarios: Claës Olrog ([1950] *op. cit.*) menciona un ejemplar inmaduro cazado en la localidad de Timbó, departamento Burruyacu, Tucumán e incorporado a la COFML el 10 de agosto de 1949. Este ejemplar fue reidentificado como ÁGUILA CORONADA *Buteogallus coronatus* (Chebez [1995] *Nuestras Aves* 31: 21-23). Los registros recientes de una hembra adulta provenientes del PN Calilegua, Jujuy no fueron incluidos debido a que existen dudas con respecto al origen del ave (Morales *et al.* [2019] *Nuestras Aves* 64: 8-10). Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (4): MACN-Or-38203, MFA-ZV-2020, CNH-s/n, CNH-s/n

■ ÁGUILA CRESTUDA NEGRA | *Spizaetus tyrannus* | R

Distribución: Desde México hasta el N de Sudamérica, SE de Brasil, Paraguay y NE de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

- Registros:** 1. Una hembra adulta colectada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 2 de abril de 1912 (Dabbene [1916] *Physis* 2: 428; Mogensen [1930] *Argentinas dyr.* Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Shipton de la FML.
2. Un ejemplar colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones el 14 de septiembre de 1912 (Dabbene [1916] *op. cit.*; Dabbene [1926] *Hornero* 3: 390-396). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
3. Un individuo observado por William Partridge en el PN Iguazú, Misiones con fecha 3 de septiembre sin precisar el año (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 23: 21-24).
4. Un individuo observado en dos ocasiones por Andrés Gaii en el arroyo Uruguayí, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 1948 (Gaii [1952] *Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte 1.* Mundo Agrario. Editorial Haynes).
5. Un individuo observado por un grupo de cazadores en la provincia de Misiones, en octubre de 1949. El mismo intentó ser colectado, aunque sin éxito (Gaii [1952] *op. cit.*).
6. Un ejemplar colectado por Pedro Kowaliczin en Campo Viera, departamento Oberá, Misiones en junio de 1984 (Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30). El espécimen permaneció depositado en el CHMO, pero actualmente se desconoce su paradero (Graciela Ayala *in litt.*).
7. Un individuo observado sobre la ruta nacional n°11 unos 50 km al norte de la ciudad de Formosa, departamento Formosa, Formosa el 21 de noviembre de 1985 (Salvador & Narosky [1987] *Nuestras Aves* 13: 9-11).
8. Un ejemplar herido cerca del arroyo Bonito de la localidad de Montecarlo, departamento homónimo, Misiones a fines de 1987. El mismo permaneció en el zoológico Zoo Bal Park de esa localidad al menos hasta septiembre de 1988 (Chebez [1989] *Nuestras Aves* 20: 6-7).
9. Un juvenil capturado en Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones en el año 1990 (Jorge Anfuso *in litt.*). El mismo permaneció durante años en el centro de recría Güirá Oga de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones (ver Cámara [1996] *Nuestras Aves* 35: 17-20).
10. Un individuo observado por Flavio Moschione en la RP Guaycolec, Formosa el 5 de mayo de 1991 (F. Moschione *en* Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes.* Fundación de Historia Natural Félix de Azara).
11. Un individuo observado por Jorge Anfuso en el PN Iguazú, Misiones en octubre de 1991 (J. Anfuso *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina.* LOLA).
12. Una pareja observada por Jorge Anfuso en el PN Iguazú, Misiones el 15 y 17 de noviembre de 1991 (J. Anfuso *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
13. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
14. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 3 de junio de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
15. Dos adultos observados por Julián Baigorria y Facundo Barbar en el departamento General Manuel Belgrano (26°01'31,5"S 54°37'W), Misiones el 26 de marzo de 2004 (Baigorria *et al.* [2008] *Nuestras Aves* 53: 36).
16. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el PP Moconá, Misiones el 14 de julio de 2004 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1058380).
17. Una pareja observada por Agustín Quaglia en el departamento General Manuel Belgrano (26°01'01,8"S 54°07'35,3"W), Misiones el 22 de septiembre de 2004 (Baigorria *et al.* [2008] *op. cit.*).
18. Un individuo observado cerca del paraje El Socorro del PP Esmeralda, Misiones en febrero de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
19. Un adulto grabado por Alejandro Bodrati en la seccional 101 del PP Uruguayí, Misiones el 4 de junio de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*; xeno-canto.org/707448).
20. Un individuo observado por Daniel Almirón y Norberto Oste en el establecimiento San Jorge,

departamento Iguazú, Misiones el 9 de septiembre de 2008 (ebird.org/checklist/S20171928).

21. Un adulto observado por Emilio White en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 2009 (Bodrati *et al.* [2012] *Nuestras Aves* 57: 63-79).

22. Un adulto observado por Alejandro Bodrati, Juan I. Areta y Emilio White en la posada Puerto Bemberg, departamento Iguazú, Misiones el 28 de noviembre de 2009 (Bodrati *et al.* [2012] *op. cit.*).

23. Un adulto observado en el PP Cruce Caballero, Misiones el 5 de diciembre de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64). El año 2010 referido en el artículo es un error (Alejandro Bodrati *com. pers.*).

24. Un ejemplar fotografiado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 10 agosto de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=23066).

25. Un individuo observado por Matías Martínez en arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones en el año 2013 (Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).

26. Un individuo observado por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 8 de mayo de 2013 (ebird.org/checklist/S14043258).

27. Mencionada sin detalles para la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo).

28. Varias observaciones y fotografías de una pareja y un juvenil en Puerto Esperanza, departamento Iguazú, Misiones entre agosto de 2014 y abril de 2015 (Martínez [2016] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 189: 1-7). Los ejemplares continúan siendo registrados en dicha localidad (ebird.org).

29. Un individuo observado por Gabriel Moresco en el PN Iguazú, Misiones el 4 de noviembre de 2016 (G. Moresco *en* Casado [2016] *Especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN).

30. Un adulto fotografiado por Gabriel Acevedo en el PN Iguazú, Misiones el 27 de agosto de 2018 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=283757).

31. Un ejemplar escuchado por Giselle Mangini y Juan Manuel Fernández en la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 5 de septiembre de 2018 (ebird.org/checklist/S48548512).

32. Un individuo observado por Fernando Cabral y Elvis Ramírez en la seccional Uruzú del PP Uruguayí, Misiones el 6 de octubre de 2018 (ebird.org/checklist/S49000345).

33. Un adulto fotografiado por Sergio Moya al sudoeste de Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones el 18 de septiembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76265112).

34. Un ejemplar grabado por Miguel Castelino y otros observadores en la seccional Uruzú del PP Uruguayí, Misiones el 8 de mayo de 2021 (ebird.org/checklist/S87505625). Por el momento la grabación no se encuentra disponible.

35. Registrada por Marcelo Gavensky en el PN Iguazú, Misiones el 15 de mayo de 2021 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=1402812).

35. Un ejemplar fotografiado por Ramón Moller Jensen en la reserva privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 30 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S92503600).

36. Un ejemplar grabado por Fernando Cabral en el PP Caá Yari, Misiones el 19 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S95450279). Por el momento la grabación no se encuentra disponible.

37. Un ejemplar fotografiado por Marcos Lartigau en la reserva privada San José, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 6 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=471667).

38. Un ejemplar fotografiado por Ignacio Marcilese en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 19 de mayo de 2022 (ebird.org/checklist/S110694915).

Comentarios: Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (2): MACN-Or-8395, COFML-SHIPTON-060

■ AGUILUCHO GRIS | *Buteo nitidus* | R

Distribución: La subespecie *pallidus* en Bolivia, S de Brasil y N de Argentina (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C. London).

Registros: 1. Mencionada por Eduardo Holmberg para la fauna argentina, sin detalles (Holmberg [1898] en de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires).

2. Un adulto colectado por Johan Mogensen en Las Palmas, departamento Bermejo, Chaco el 5 de junio de 1915 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). El espécimen se encuentra depositado en la colección Ship-ton de la FML (Figura 72).

3. Mencionada por Andrés Gai para el departamento 9 de Julio, Santa Fe (Gai [1950] *Hornero* 9: 121-164).

4. Un adulto observado por Claës Olrog en la sierra de Calilegua, departamento Ledesma, Jujuy en noviembre de 1971 (Olrog [1985] en Newton & Chancellor [editores] *Conservation Studies on Raptors*. ICBP Technical Publication N°5).

5-7. Individuos adultos observados por Claës Olrog en el extremo oriental de la provincia de Chaco en octubre de 1974, noviembre de 1976 y noviembre de 1981 (Olrog [1985] *op. cit.*).

8-9. Mencionada sin detalles para el oeste de Castelli, departamento General Güemes, Chaco y para el centro de dicha provincia (Contreras *et al.* [1990] *Atlas Ornito-geográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina*. Vol. 1. No Passeriformes. Fundación Vida Silvestre Argentina).

10-12. Un total de tres individuos observados en el sector oriental de la provincia de Formosa entre junio de 1984 y octubre de 1993 (Contreras [1993] *Nótulas Faunísticas* 39: 1-4).

13. Mencionada sin detalles para el noroeste de la provincia de Corrientes (Contreras *et al.* [1994] *Nótulas Faunísticas* 52: 1-8).

14. Observada en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes en enero de 1990 (Contreras *et al.* [1994] *op. cit.*).

15. Un individuo observado por Yolanda Davies en Profundidad, departamento Candelaria, Misiones el 29 de marzo de 1993 (Contreras *et al.* [1994] *op. cit.*).

16. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 7 de junio



Figura 72. Aguilucho Gris *Buteo nitidus*, COFML-SHIPTON-510, Las Palmas, Chaco, 5 de junio de 1915 (Sebastián Avelaño, Instituto Miguel Lillo)

de 1995 (López-Lanús [1997] *Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina*. LOLA).

17. Una pareja observada por Bernabé López-Lanús en el PN Río Pilcomayo, Formosa el 27 de julio de 1995 (López-Lanús [1997] *op. cit.*).

18. Un individuo observado por Pedro Blendinger en la finca El Oculito (23°05'S 64°32'W), departamento Orán, Salta entre el 13 y el 16 de enero de 2001 (Malizia *et al.* [2005] *Ornitología Neotropical* 16: 231-251; P. Blendinger *in litt.*).

19. Un individuo observado por Germán Pugnali en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 23 de octubre de 2003 (ebird.org/checklist/S26745026).

20. Un individuo observado por Martín Manassero y Horacio Luna en el paraje San Juan, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de octubre de 2005 (Luna & Manassero [2008] *Nuestras Aves* 52: 12-13).

21. Una pareja observada por Martín Manassero y Horacio Luna en la estancia Santa María, departamento General Obligado, Santa Fe el 19 de agosto de 2006 (Luna & Manassero [2008] *op. cit.*).

22. Registrada en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes entre septiembre de 2003 y abril de 2004 (Capllonch *et al.* [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 483-498).

23. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Capióvi, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 15 de mayo de 2015 (ebird.org/checklist/S23490999).

Taxonomía: Para un estudio sobre poblaciones ver Millsap *et al.* ([2011] *Condor* 113: 326-339). Estos autores afirman que las subespecies *plagiatus* (desde Estados Unidos hasta el noroeste de Costa Rica) y *nitidus* (desde el sudoeste de Costa Rica hasta el norte de Argentina) deberían ser consideradas especies distintas.

Comentarios: Ignacio Roesler y Matías Juhant ([2004] *I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces*. La Plata) sospechan que los registros de *Buteo nitidus* en el PN Calilegua, Jujuy podrían ser confusiones con el AGUILUCHO ALAS ANCHAS *Buteo platypterus*. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): COFML-SHIPTON-510

■ MARTÍN PESCADOR ENANO | *Chloroceryle aenea* | R

Distribución: La subespecie nominal desde Costa Rica hasta la mitad N de Sudamérica, incluyendo N de Bolivia, Paraguay, N de Argentina y centro-sur de Brasil (Woodall [2001] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 6. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado por Judith Hutton en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1981 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).

2. Un ejemplar hallado muerto por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 28 de julio de 1988 (Castelino [1990] *Nótulas Faunísticas* 21: 1-2). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 1993 (F. Moschione *en Mazar Barnett & Pearman* [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

4. Un individuo observado por Robert Williams, Natasha White y Guy Kirwan en el PN Iguazú, Misiones el 16 de marzo de 1997 (Williams & White [1997] *Cotinga* 8: 91).

5. Registrada por José Vizcaichi en la laguna Galarza, departamento Santo Tomé, Corrientes en el año 2005 (J. Vizcaichi *en López-Lanús* [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

- 6-7. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati sobre la ruta provincial n°22, departamento San Pedro, Misiones el 25 de mayo y el 18 de julio de 2009 (A. Bodrati *en de la Peña* [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 7: 1-344). Uno de los avistajes se efectuó cerca del poblado de Cruce Caballero (26°36'13"S 53°55'00"W) (A. Bodrati *in litt.*).
8. Un ejemplar fotografiado por Juan Díaz Colodrero en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes en septiembre de 2011 (J. Díaz Colodrero *in litt.*).
9. Un individuo observado por Juan Díaz Colodrero en el arroyo Uruzú del PP Urugua-í, Misiones sin fecha (J. Díaz Colodrero *in litt.*).
10. Una pareja observada (macho fotografiado) por Emilio Gonzáles en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 27 de marzo de 2012. Los ejemplares permanecieron durante varios días en la zona (Gonzáles & Giraudo [2014] *Nuestras Aves* 59: 9-11).
11. Una hembra hallada muerta en el PN Iguazú, Misiones sin fecha. La misma fue ingresada a la colección del MACN el 5 de mayo de 2012 (Sebastián Cabanne *com. pers.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
12. Una hembra fotografiada por Diego Xargay en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 14 de abril de 2014 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=48455).
13. Una hembra observada por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes el 13 de septiembre de 2016 (L. Pagano *obs. pers.*).
14. Una hembra fotografiada por Juan Carlos Lancioni y Diego Pérez en la laguna Iberá, departamento San Martín, Corrientes el 26 de mayo de 2018 (ebird.org/checklist/S70572200).
15. Un macho fotografiado por Walter Jacobo en Bahía Carayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 28 de marzo de 2019 (ebird.org/checklist/S54513339).
16. Un ejemplar fotografiado por Natalia Tenaglia en el portal Cambyretá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 22 de julio de 2019 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=405494).
17. Un ejemplar fotografiado por Alejandra Boloqui, Sabina de Lucca y Diego Demarco en la reserva privada Don Luis, departamento Ituzaingó, Corrientes el 28 y 29 de julio de 2020 (ebird.org/checklist/S71899021).

Especímenes (2): MACN-Or-53351, MACN-Or-72906

■ CHARAO | *Amazona pretrei* | R

Distribución: Restringida a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina en el SE de Brasil. Ocasionalmente ingresa al E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Forshaw & Knigth [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Francisco Manuel Rodríguez en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en diciembre de 1909. El mismo había sido publicado como de “octubre de 1909” (Orfila [1938] *Hornero* 7: 1-21). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 73).

2. Un macho colectado en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en septiembre de 1917 (Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP). El espécimen no pudo ser hallado en la colección del MACN.

3. Grandes bandadas observadas por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1924 (F. Kruse *en Forcelli et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta).

4. Un individuo observado por Juan C. Chebez en el arroyo Urugua-í cerca del barrero Palacio, departamento Iguazú, Misiones en febrero de 1980 (Chebez *et al.* [1981] *Iguazú* 1: 1-98; Chebez [1985] *Nuestras Aves* 6: 17-19).



Figura 73. Charao *Amazona pretrei*, MACN-Or-8080, Santa Ana, Misiones, diciembre de 1909 (Luis Pagano)

5. Tres individuos observados por Hernán Fernández en el PP de la Araucaria, Misiones en marzo de 1995 (H. Fernández en Wege & Long [1995] *Key Areas for threatened birds in the Neotropics*. BirdLife Conservation Series N°5; Chebez et al. [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA).
6. Tres individuos observados por Federico Bruno y Ramón Olivera en el PP de la Araucaria, Misiones el 13 de mayo de 2000 (F. Bruno en Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
7. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PP de la Araucaria, Misiones el 3 de marzo de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
8. Dos individuos observados por Pablo Grilli en el PP de la Araucaria, Misiones en abril de 2005 (P. Grilli *in litt.*).

Comentarios: Tommaso Salvadori ([1891] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 20. London) cita un ejemplar del “Río de la Plata”. Este espécimen al parecer se encuentra perdido, aunque existe otro con la misma localidad (Knox & Walters [1994] *Extinct and Endangered Birds in the Collections of The Natural History Museum*. The British Ornithologists’ Club. Occasional Publications N°1; Hein van Grouw *in litt.*). Un ejemplar adulto sin número, fecha ni datos de colector se encuentra depositado en el MACN y figura como proveniente de “Tucumán”. Los ejemplares sin datos depositados en el MRAC al parecer se encuentran actualmente en el CNH (Chebez [1994] *op. cit.*; Damián Lozano y Daniel Acosta *in litt.*).

El registro efectuado por Flavio Moschione y Leonardo Pastorino al norte de Garuhapé, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 11 de diciembre de 1982 (Collar et al. [1992] *op. cit.*) fue posteriormente rectificado como perteneciente al LORO VINOSO *Amazona vinacea* (Alejandro Bodrati *com. pers.*). De la misma manera, la observación de Flavio Moschione y Javier San Cristóbal al sur de Candelaria, departamento homónimo, Misiones el 18 de julio de 1987 (Collar et al. [1992] *op. cit.*;

Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros) también correspondía a *Amazona vinacea* (Segovia & Cockle [2012] *Hornero* 27: 27-37).

Mencionada con dudas para el PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación efectuada por David Corfield y Judith Hutton el 2 de enero de 1992 (Gómez & Babarskas [1992] en Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz *et al.* ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): MACN-Or-8080

■ LORO NUCA ESCAMADA | *Amazona mercenarius* | V

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el N de Bolivia, entre los 1500-3000 msnm (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Georg Hieronymus en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en el año 1872 (Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 74).

Comentarios: Nores & Yzurieta ([1994] *Bird Conservation International* 4: 313-328) mencionan la fecha de captura como del año 1882. Según las colecciones botánicas depositadas en el herbario CORD (UNC-Conicet), Georg Hieronymus visitó junto a Paul Lorentz la zona de Orán en el año 1873 (ver además Vervoorst [1972] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 49: 63-75).

Especímenes (1): MZUC-886



Figura 74. Loro Nuca Escamada *Amazona mercenarius*, MZUC-886, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, año 1872 o 1873 (Luis Pagano)

■ GUACAMAYO AZUL | *Anodorhynchus glaucus* | R

Distribución: Anteriormente en el SE de Paraguay, NE de Argentina, SE de Brasil y NO de Uruguay (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1-2. José Sánchez Labrador ([1767] *Peces y aves del Paraguay natural ilustrado*. Editorial Castex) la menciona como abundante en la orilla oriental del río Uruguay y rara en las selvas del río Paraguay aproximadamente entre los años 1753 y 1767. El mismo autor comenta que durante esos años existía un ejemplar aparentemente domesticado en la reducción jesuítica La Concepción de

Nuestra Señora (actualmente Concepción de la Sierra), departamento Concepción, Misiones.

3-4. Algunas parejas observadas por Félix de Azara entre los 27° y 29° de latitud sur. Este autor comenta que los pobladores lo mencionan hacia el sur hasta los 33°30'S, lo que correspondería a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe (Azara [1805] *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Rio de la Plata*. Volumen 3. Imprenta de la viuda de Ibarra).

5. Un número no determinado de ejemplares colectados por Alcide d'Orbigny en Rincón San Luis, ubicado cerca de la estancia Rincón de Luna y el río Batel (= Esteros del Batel), Corrientes en julio de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MNHN (Figura 75).

6. Mencionada por Alcide d'Orbigny ([1835-1847] *op. cit.*) como observada y colectada en Paso Reito cerca del río Santa Lucía, Corrientes en julio de 1827. Los ejemplares no fueron conservados o se encuentran perdidos en la actualidad.

7. Un número no determinado de ejemplares obtenidos por Alcide d'Orbigny en los alrededores de Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *op. cit.*). Las aves fueron utilizadas como alimento por los integrantes de la expedición.

8. Varias parejas observadas por Alcide d'Orbigny en una navegación por el río Paraná desde Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí hasta Itá Ibaté, departamento General Paz, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *op. cit.*).



Figura 75. Guacamayo Azul *Anodorhynchus glaucus*, MNHN-ZO-MO-2003-3617, Corrientes, julio de 1827 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)

9. Mencionada por Alcide d'Orbigny como habitante a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay entre los 27° y 31° de latitud sur (A. d'Orbigny en Saint-Hilaire [1837-1838] *Histoire naturelle des perroquets*. Levrault). En el río Paraná la localidad más austral mencionada por este viajero es Santa Lucía (29°S), departamento Lavalle, Corrientes. Por lo tanto las mayores latitudes deberían corresponder al río Uruguay (Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP).

10. Un ejemplar colectado supuestamente por Flamant en “Corrientes”, sin fecha (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*). El mismo perteneció a la colección de Adolphe Boucard y fue presentado por Philip Sclater ante la Sociedad Zoológica de Londres en el año 1879 (Sclater [1879] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1879: 551). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN.

11. Un ejemplar proveniente de “*Frontière du Paraguay, Rep. Argentine*”, sin más detalles (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MHNG, y fue ingresado a los catálogos de dicha colección alrededor de julio de 1831 (Laurent Vallotton *in litt.*).

12-13. Dos ejemplares colectados por Thomas Jefferson Page en “Corrientes” el 1 de agosto de 1854 (Page [1859] *La Plata, the Argentine confederation, and Paraguay*. Harper & Brothers). La localidad concreta aparentemente sería el arroyo Riachuelo, departamento Capital, Corrientes (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el NMNH.

14. Un ejemplar supuestamente colectado por Thomas Jefferson Page cuya etiqueta dice “*Exploration of the Paraná: Capt. T.J. Page*”. Posteriormente fue agregada la leyenda “*March 1860*”, lo que sugiere una proveniencia diferente (Collar *et al.* [1992] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.

15. Mencionada por Martín de Moussy para la provincia de Corrientes, sin mayores detalles (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères).

16. Mencionada como *Ara glauca* por el comandante Luis Fontana con referencia a la región chaqueña (Fontana [1881] *El gran chaco*. Imprenta de Ostwald y Martínez).

17. Una pareja observada sobre el río Pilcomayo a los 23°S de latitud, Formosa (Baldrich [1890] *Las Comarcas Virgenes. El Chaco Central Norte*. Imprenta de Jacobo Peuser).

18. Mencionada por Arnaldo de Winkelried Bertoni ([1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102) como habitante de las costas de los ríos Paraná (27°S) y Uruguay (29°S).

19. Unas pocas parejas observadas por Félix Contreras cerca de Riachuelo, departamento Capital, Corrientes entre los años 1900 y 1915 (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Bertonatti [2016] en López de Casenave & González Táboas [editores] *Aves Argentinas: 100 años*. Aves Argentinas).

20. Una pareja nidificando observada por Floro Ramírez unos 8 km al noreste de la ciudad de Corrientes, departamento Capital, Corrientes alrededor del año 1930 (Bertonatti [2016] *op. cit.*).

Comentarios: La localidad de Iribicuá mencionada por Alcide d'Orbigny se encuentra aproximadamente a los 27°20'S 57°50'W, en lo que actualmente corresponde al departamento Itatí, Corrientes (Parchappe & d'Orbigny [1835] *Carte d'une partie de la Rép.que Argentine comprenant les provinces de Corrientes et des Missions dressé sur les lieux en 1828*. Levrault; Collar *et al.* [1992] *op. cit.*). Las colecciones del capitán Thomas Jefferson Page fueron estudiadas por John Cassin (Page [1859] *op. cit.*).

Las citas referidas a la provincia de Misiones son muy vagas y por lo tanto preferimos excluirlas del análisis. Roberto Dabbene ([1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513) menciona un reporte del río Uruguay, Misiones según Holmberg ([1898] en de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Sin embargo, este último autor no incluye mayores detalles. Julio y Andrés Contreras afirman que antiguos pobladores de Las Lomas, Corrientes recordaban haber visto esta especie en las afueras de la ciudad capital en las décadas de 1910 y 1920 (Chebez [1994] *op. cit.*; Bertonatti [2016] *op. cit.*).

Antonio Chacón comenta la presencia de esta especie en el arroyo Batel cerca de la localidad de Tala y en la desembocadura del arroyo Garapé, Corrientes en 1967 y 1968 respectivamente. El mismo autor

menciona que pescadores deportivos observaron dos loros con las características de *Anodorynchus glaucus* en el río Itá Ibaté, Corrientes entre los años 1984 y 1985 (Bertonatti [2016] *op. cit.*). Considerada Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (6): MHNG-133.31, MNHN-ZO-MO-2003-3614, MNHN-ZO-MO-2003-3617, NMNH-20944, NMNH-256884, NMNH-256885

■ MARACANÁ LOMO ROJO | *Primolius maracana* | R

Distribución: Mayormente en el E de Brasil hasta Mato Grosso do Sul y São Paulo, E de Paraguay y NE de Argentina (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Santiago Venturi en Iguazú, Misiones el 8 de marzo de 1897. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

2. Un ejemplar supuestamente colectado por Hermann Burmeister en la provincia de Misiones en agosto de 1899 (Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un macho colectado por Roberto Dabbene en Iguazú, Misiones en octubre de 1900 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366; Orfila [1936] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

4-5. Dos hembras colectadas en “Salto Iguazú, Misiones” el 2 y 11 de agosto de 1910. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.

6. Un ejemplar colectado al parecer por Francisco Manuel Rodríguez en “Misiones” en marzo de 1911. El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

7. Un ejemplar colectado por Roberto Dabbene en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en septiembre de 1912 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Orfila [1936] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en las colecciones, aunque existe un ejemplar montado sin datos (MACN-Or-1697a) que podría pertenecer a dicha expedición.

8. Un macho colectado por Johan Mogensen en Iguazú, Misiones el 5 de febrero de 1917. El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.

9-10. Un macho y una hembra colectados por Johan Mogensen en Iguazú, Misiones el 6 de febrero de 1917 (Orfila [1936] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

11. Numerosos individuos observados por Johan Mogensen en los Saltos del Iguazú, Misiones el 11 de marzo de 1917 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Si bien este autor menciona haberle disparado a algunos ejemplares, no fueron hallados especímenes para esa fecha y localidad.

12-13. Dos hembras colectadas por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 6 y 7 de abril de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en la colección Shipton de la FML.

14. Un ejemplar colectado por Johan Mogensen en Puerto Segundo (actualmente Puerto Esperanza), departamento Iguazú, Misiones el 12 de abril de 1917 (Mogensen [1930] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.

15-17. Dos machos y una hembra colectados por James Lee Peters en “Puerto Aguirre” (actualmente Puerto Iguazú), Misiones el 14 de julio de 1920. Los especímenes se encuentran depositados en el MCZ.

18. Un ejemplar colectado por Juan Haider en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en enero de 1925 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS.

19-20. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por Francisco Manuel Rodríguez en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 3 de septiembre de 1932 (Navas & Bó [1988] *Comunicaciones*

Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo 166: 1-10). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

21-22. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por Francisco Manuel Rodríguez en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 16 de septiembre de 1932 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

23. Registrada en forma habitual por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en el año 1935 (F. Kruse en Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta; Chebez [1992] *Aprona* 21: 12-30).

24. Una hembra colectada por Serafín Pierotti en San Antonio, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 14 de octubre de 1946. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

25. Un macho colectado por Serafín Pierotti en el arroyo del Tigre, departamento San Ignacio, Misiones el 25 de septiembre de 1947 (Nores & Yzurieta [1994] *Bird Conservation International* 4: 313-328; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

26. Un ejemplar colectado por Tomas de Apóstol en Manantiales, departamento Mburucuyá, Corrientes en el año 1947 (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28; Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen había sido depositado en el MAB, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad (Raúl Aguirre Barrios *in litt.*).

27-30. Cuatro especímenes (3 machos y una hembra) colectados por Alberto Anziano en el Alto Iguazú, Misiones en noviembre de 1948 (Chebez [1992] *op. cit.*; Gelain [2008] *Xolmis* 3: 7-16). Los especímenes se encuentran depositados en el MP.

31. Un ejemplar colectado por Andrés Gai y William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 10 de noviembre de 1949 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

32. Un macho colectado por Andrés Gai y William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 5 de marzo de 1950 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

33. Un macho colectado por William Partridge en el km 60 del río Iguazú, Misiones el 9 de marzo de 1951 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

34-35. Grandes bandadas observadas por William Partridge en Puerto Bemberg (actualmente Puerto Libertad), departamento Iguazú, Misiones en enero y agosto de 1951 (Partridge [1990] *Nuestras Aves* 22: 20-24).

36-37. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 y 20 de febrero de 1952 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

38. Una hembra colectada por Marcelino Salas en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 29 de abril de 1952 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

39. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 21 de octubre de 1953 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

40. Un macho colectado por Serafín Pierotti en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones el 16 de septiembre de 1956 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

41. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 17 de marzo de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

42-43. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 18 de marzo de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

44-45. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Urugua-í, Misiones el 26 de marzo de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

- 46-47. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguay, Misiones el 27 de abril de 1958. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.
48. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguay, Misiones el 26 de mayo de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
- 49-50. Una hembra y un macho colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguay, Misiones el 6 y 17 de julio de 1958 respectivamente. Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.
51. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguay, Misiones el 1 de agosto de 1958. El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.
52. Una hembra colectada por Alberto Anziano en el Alto Iguazú, Misiones en el año 1958 (Gelain [2008] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MP.
53. Registrada por Don Eckelberry aparentemente en forma regular en el PN Iguazú, Misiones durante un viaje realizado en el año 1959 (Eckelberry [1965] *The Wilson Journal of Ornithology* 77: 111).
- 54-55. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguay, Misiones el 5 de mayo de 1959. Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
56. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 10 de junio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
- 57-60. Tres machos y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 29 de junio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
61. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 8 de julio de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
62. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 1 de agosto de 1959 (Navas & Bó [1988] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
- 63-64. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 13 y 28 de agosto de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el LACM.
65. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
66. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 13 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
- 67-68. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 14 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
69. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 15 de septiembre de 1959 (Nores & Yzurieta [1994] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el LACM.
70. Una hembra colectada por Andor Kovács en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 8 de julio de 1969. El espécimen se encuentra depositado en el LSUMZ.
71. Un ejemplar colectado en Gobernador Lanusse, departamento Iguazú, Misiones en la década de 1970 (Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*). El espécimen permaneció en la colección personal de Mariano Chudy, pero desconocemos su actual localización.
72. Registrada por Martín de la Peña en el PN Iguazú, Misiones el 10 de febrero de 1973 (M. de la Peña en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA; de la Peña [2013] *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológica).

73. Un grupo de seis ejemplares fotografiados en la baja cuenca del arroyo Uruguay-i cerca del barrero Palacio, departamento Iguazú, Misiones en febrero de 1980 (Chebez [1992] *op. cit.*). La fotografía nunca fue publicada y no se encuentra disponible en la actualidad.

74. Dos parejas observadas por Federico Kruse en Montecarlo, departamento homónimo, Misiones en diciembre de 1984 o enero de 1985 (F. Kruse en Forcelli *et al.* [1985] *op. cit.*; Chebez [1992] *op. cit.*).

75. Una bandada observada por Hugo Chaves en la reserva privada Lapacho Cué, arroyo Piray Mini, departamento Eldorado, Misiones en el año 1990 (H. Chaves en Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

76. Un ejemplar macho colectado en “Salto Iguazú”, sin más datos. El espécimen se encuentra depositado en el FMNH.

Comentarios: El espécimen COFML-6404 fue publicado como proveniente de Argentina, pero en realidad fue obtenido por Serafín Pierotti en San Antonio do Sudoeste, Paraná, Brasil (ver Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). Existe un registro sin confirmar por Ignacio Roesler y otros observadores en el PP Moconá, Misiones en julio de 1999; y otro por Paula Bertolini en el PP Cruce Caballero, Misiones (Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*). Bodrati *et al.* ([2006] *Hornero* 21: 37-43) realizan una compilación de registros, comentan la situación actual de la especie y las posibles causas de su extinción en el territorio nacional. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (64): MACN-Or-5493, MACN-Or-2786a, MACN-Or-2786a, MACN-Or-2786a, MACN-Or-2786a, MACN-Or-4785, MACN-Or-31810, MACN-Or-32412, MACN-Or-32910, MACN-Or-33482, MACN-Or-33483, MACN-Or-33892, MACN-Or-34126, MACN-Or-39245, MACN-Or-41681, MACN-Or-41682, COFML-4887, COFML-6543, COFML-10279, COFML-15403, COFML-15404, COFML-SHIPTON-631a, COFML-SHIPTON-631b, MLP-Or-s/n (= 107), MP-260, MP-261, MP-262, MP-263, MP-264, MAS-Or-1173, AMNH-474146, AMNH-769458, AMNH-769459, AMNH-769460, AMNH-769461, AMNH-769477, AMNH-769478, AMNH-769479, AMNH-769480, AMNH-769481, AMNH-769482, AMNH-769483, FMNH-50290, FMNH-57796, FMNH-58906, LACM-47017, LACM-47018, LACM-47019, LACM-47020, LACM-47021, LACM-47022, LACM-47023, LACM-47024, LACM-47025, LACM-47026, LACM-47027, LACM-47028, LACM-47029, LACM-47030, LACM-47031, LSUMZ-69173, MCZ-85215, MCZ-85216, MCZ-85217

■ GUACAMAYO ROJO | *Ara chloropterus* | R

Distribución: Extensa región del centro de Sudamérica, desde Colombia y Venezuela hasta el S de Brasil, E de Bolivia, Paraguay y N de Argentina (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Mencionada por Florián Paucke ([1942] *Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios Mocobies, 1749-1767*. Universidad Nacional de Tucumán) refiriéndose a cierta región del noreste de Argentina.

2. Una pareja observada (uno de ellos colectado) por Alcide d'Orbigny en una navegación por el río Paraná desde Iribicuá (unas siete leguas al este de Itatí), departamento Itatí hasta Itá Ibaté, departamento General Paz, Corrientes en diciembre de 1827 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris). Apparently el espécimen no fue conservado (Patrick Bousses *in litt.*).

3-4. Mencionada por Martín de Moussy para la provincia de Misiones y el valle de Orán en la provincia de Salta (de Moussy [1860] *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Tome Deuxieme. Librairie de Firmin Didot Frères).

5. Mencionada por Luis Fontana con referencia a la región chaqueña (Fontana [1881] *El Gran Chaco*. Imprenta de Ostwald y Martínez).

6. Dos especímenes y un cráneo obtenidos por Justo González Acha en el Alto Pilcomayo, Formosa sin fecha (Holmberg [1887] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 19: 1-388; Holmberg [1898] en de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Al parecer dichos especímenes se encuentran perdidos en la actualidad.

7. Registrada por Antonio Pitaluga en el riacho Quiá, Chaco sin fecha (Holmberg [1887] *op. cit.*).

8. Dos juveniles capturados por Carlos Rodríguez Lubary en Santa Ana, departamento Candelaria, Misiones en el año 1883 (Holmberg [1887] *op. cit.*). Se desconoce el destino de estos ejemplares.

9. Observada regularmente por Arnaldo de Winkelried Bertoni en vuelo sobre el río Paraná, desde la costa argentina hacia Paraguay a la altura de Puerto Bertoni. Dicha localidad se encuentra frente al departamento Iguazú, Misiones. Este

autor menciona además la captura de un ejemplar en el Alto Paraná, Paraguay (26°53') en junio de 1891 (Bertoni [1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-213).

10. Mencionada por Santiago Venturi para el Chaco Austral, sin más detalles (S. Venturi en Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).

11. Un macho colectado por Ulpiano Cáseres en la provincia de Formosa en diciembre de 1917 (Dabbene [1918] *Hornero* 1: 98; Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

12. Mencionada por Ernesto Lynch Arribáza para la zona del río Bermejo en la región chaqueña, sin mayores detalles (Lynch Arribáza [1920] *Hornero* 2: 85-98).

13. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 2: 1-40).

14. Tres individuos observados por Federico Kruse en Puerto Delicia, departamento Eldorado, Misiones en el año 1942 (F. Kruse en Forcelli *et al.* [1985] *Viaje a Misiones. Informe final*. Fundación Vida Silvestre Argentina & Proyecto Nauta).

15. Un macho colectado por Hermina Solari (o Solari) en Posadas, departamento Capital, Misiones en diciembre de 1952 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS, y su etiqueta figura como colectado en diciembre de 1932 (Figura 76).



Figura 76. Guacamayo Rojo *Ara chloropterus*, MAS-Or-1172, Posadas, Misiones, diciembre de 1932 o 1952 (Diego Monteleone)

16-19. Al menos cuatro registros realizados por el cuerpo de guardaparques en la RN Iguazú, Misiones entre los años 1989 y 1990 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

20-21. Al parecer dos individuos distintos observados por Sergio Acosta sobrevolando la RN Iguazú, Misiones en julio de 1992 y el 18 de septiembre del mismo año (S. Acosta *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

22. Una pareja observada por Carlos Saibene, Sergio Acosta y Walter Maciel en el PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 1992 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

23. Un individuo observado en vuelo por Ángel Caradonna en el km 6 de la ruta nacional n°12, departamento Iguazú, Misiones el 6 de mayo de 1993 (A. Caradonna *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

24. Dos individuos observados por José Calo en el río Iguazú inferior, km 12, departamento Iguazú, Misiones el 5 de octubre de 1993 (Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

25. Un individuo observado en vuelo por Ángel Caradonna en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1994 (A. Caradonna *en* Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).

26. Registrada por Horacio Foerster en el PP Urugua-í, Misiones sin fecha (Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).

27. Un individuo observado por Patricio Ramírez Llorens y Jessica Cañete en el PN Iguazú, Misiones en marzo de 2016 (P. Ramírez Llorens y J. Cañete *en* Casado [2016] *Especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN).

Comentarios: Con respecto a la mención de Roberto Dabbene, llamativamente la especie no es incluida por Ernst Hartert y Santiago Venturi ([1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Chebez & Casañas ([2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina) asumen que el ejemplar obtenido por Bertoni fue colectado en la costa argentina del río Paraná. Las observaciones recientes del PN Iguazú, Misiones podrían corresponder a ejemplares escapados de cautiverio. Descartamos los registros correspondientes a la reintroducción efectuada en los Esteros del Iberá, Corrientes. Considerada Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (2): MACN-Or-9298, MAS-Or-1172

■ TICOTICO CEJA BLANCA | *Anabacerthia amaurotis* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 5 de agosto de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2-3. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 y 7 de septiembre de 1959 (Partridge [1961] *op. cit.*). Un espécimen se encuentra depositado en el MACN y el restante en la COFML (Figura 77).

4. Un individuo observado en el arroyo Urugua-í, Misiones el 19 de julio de 1993 (Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser Mergus octosetaceus in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).

5. Un individuo observado por Ignacio Roesler y Diego Monteleone en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones en diciembre de 1998 (D. Monteleone *obs. pers.*).

6. Un ejemplar observado y grabado en la reserva privada Yaguaroundí, departamento Guaraní, Misiones el 4 de febrero de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).

7-9. Un total de tres individuos observados en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 y 20 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

10. Un individuo observado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 16 de febrero de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

11-13. Tres individuos observados en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 4 y 5 de abril de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

14. Un individuo observado por Tim Perkins en el rincón sudoeste del PP Urugua-í, Misiones el 30 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

15. Un ejemplar observado y grabado en el PP Urugua-í, Misiones el 31 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).

16. Una pareja observada por Alejandro Bodrati, José Segovia y Luis Pagano en la RB Yaboty, Misiones el 24 de agosto de 2007 (A. Bodrati *in litt.*).

17. Un individuo observado por Daniel Almirón en la reserva privada Refugio Tangará, departamento Guaraní, Misiones entre el 16 y el 19 de enero de 2010 (ebird.org/checklist/S27385603).

18. Un individuo observado por Gina Sheridan en el PP Urugua-í, Misiones el 6 de noviembre de 2012 (ebird.org/checklist/S19102791).

19. Un individuo observado por Adam Timpf y David Bell en el PP Urugua-í, Misiones el 7 de febrero de 2016 (ebird.org/checklist/S27387958).

20. Dos individuos observados por Martín López Aguirre en la seccional Uruzú del PP Urugua-í, Misiones el 21 de febrero de 2020 (ebird.org/checklist/S103904022).

Comentarios: Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (3): MACN-Or-39385, MACN-Or-39386, COFML-13397



Figura 77. Ticótico Ceja Blanca *Anabacerthia amaurotis*, MACN-Or-39386, Tobuna, Misiones, 4 de septiembre de 1959 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ CANASTERO ESTRIADO | *Pseudasthenes humicola* | R

Distribución: Centro de Chile desde Antofagasta a Malleco, hasta los 2200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada por Luis Fontana para la provincia de Mendoza, sin detalles (Fontana [1908] *Enumeración sistemática de las aves de la región andina*. Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan; Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513).

2. Una hembra colectada por Carlos Reed en la provincia de Mendoza en marzo de 1911 (Reed [1916] *Las aves de la provincia de Mendoza*. Museo Educacional de Mendoza; Cory & Hellmayr [1925] *Catalogue of birds of the Americas*. Zoological Series. Volume XIII. Part IV). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH (Figura 78).

Comentarios: La inclusión de *Synallaxis humicola* por parte de Alcide d'Orbigny para la provincia de Corrientes (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris), muy probablemente se refiera al CANASTERO CHAQUEÑO *Asthenes baeri* (Hellmayr [1921] *Novitates Zoologicae* 28: 230-276). Virgilio Roig ([1965] *Boletín de Estudios Geográficos*

49: 175-222) menciona para esta especie la localidad de Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, Mendoza sin hacer referencia a ningún espécimen. Este autor lo describe como “frecuente en toda la precordillera” y lo mapea para gran parte de dicha provincia.

Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) incluyen a este espécimen como “capturado en Potrerillos, sin fecha”, sospechando que pudo haber sido colectado por Luis Fontana. En los datos de etiqueta no figura el colector, pero la letra y el tipo de etiqueta coinciden con las de Carlos Reed depositadas en el MLP (L. Pagano obs. pers.). El nido hallado por Martín de la Peña en Potrerillos, Mendoza en enero de 1984 (de la Peña [1987] *Nidos y Huevos de las Aves Argentinas*. Ediciones Lux) fue reidentificado como perteneciente a la BANDURRITA PATAGÓNICA *Ochetorhynchus phoenicurus* (M. de la Peña in litt.).

Especímenes (1): NMNH-237185



Figura 78. Canastero Estriado *Pseudasthenes humicola*, NMNH-237185, Mendoza, marzo de 1911 (Smithsonian Institution, National Museum of Natural History)

■ TESORITO | *Phibalura flavirostris* | R

Distribución: Restringida a la región SE de Brasil, E de Paraguay y Misiones en Argentina, mayormente por debajo de los 1400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para el norte de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2-3. Dos machos colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 14 y 15 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*. Zoología 3: 87-153). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

4. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 19 de febrero de 1952 (Partridge [1954] op. cit.). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 de febrero de 1952 (Partridge [1954] op. cit.). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

- 6-12. Siete ejemplares colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 3 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). Cinco especímenes se encuentran depositados en el MACN, uno en la COFML y el restante en el MLP.
13. Una hembra colectada por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 5 de marzo de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
14. Registrada por Samuel Narosky en el PN Iguazú, Misiones el 12 de junio de 1975 (S. Narosky en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
- 15-20. Un total de seis ejemplares anillados por Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (M. Christie en Saibene *et al.* [1996] *op. cit.*).
- 21-22. Dos ejemplares colectados por A. Pohorilow al norte de Campo Viera, departamento Oberá, Misiones en octubre de 1983 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros). Los especímenes se encuentran exhibidos en el CHMO.
23. Una pareja observada por Gustavo Herrera en el límite sur del PP Cruce Caballero, Misiones el 18 de marzo de 1994 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=470942).
24. Mencionada por Paula Bertolini para el PP Cruce Caballero, Misiones (Bertolini [1998] *Documento base para la discusión del plan de manejo del Parque Provincial Cruce Caballero*. PRODIA-MERNR; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
25. Un individuo observado por Freddy Burgos y otros observadores en el PP de La Araucaria, Misiones el 12 de julio de 2001 (Krauczuk & Baldo [2004] *Atualidades Ornitológicas* 119: 1-43; ebird.org/checklist/S44607195).
26. Un individuo observado por Gabriel Capuzzi en el PP de la Araucaria, Misiones el 30 de agosto de 2002 (G. Capuzzi en Bodrati & Cockle [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 243-258).
27. Una pareja observada en el PP Cruce Caballero, Misiones el 24 de junio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
28. Un macho observado en el PP de la Araucaria, Misiones 7 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
29. Una pareja observada en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
30. Una hembra observada en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones el 23 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
31. Una pareja observada en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 10 de mayo de 2005 (Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
32. Una pareja observada por Néstor Fariña en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 15 de agosto de 2005 (N. Fariña en Bodrati & Cockle [2006] *op. cit.*).
33. Una pareja observada por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 unos 7 km al sudeste del PP Cruce Caballero, departamento San Pedro, Misiones el 16 de julio de 2008 (A. Bodrati *com. pers.*).
34. Una pareja observada por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 8 de agosto de 2008 (A. Bodrati *com. pers.*).
35. Un grupo de seis machos y tres hembras observados por Alejandro Bodrati 1 km al oeste de Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 de marzo de 2009 (A. Bodrati *com. pers.*).
36. Dos machos y una hembra observados por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 cerca del paraje Alegría, departamento San Pedro, Misiones el 24 de marzo de 2009 (A. Bodrati *com. pers.*).
37. Un ejemplar fotografiado por Gabriel San Juan y Eduardo Zanin en el PP Puerto Península, Misiones el 27 de abril de 2011 (San Juan & Zanin [2011] *EcoRegistros Revista* 1. Artículo 11).
- 38-39. Un ejemplar fotografiado por Leonardo Wolf en el PN Iguazú, Misiones el 7 de julio de 2011. El mismo observador la volvió a registrar en el invierno de 2012 en dicha localidad, aunque sin poder documentarla (L. Wolf *in litt.*).

40. Un ejemplar fotografiado por Luis Cañete en el PN Iguazú, Misiones el 25 de mayo de 2012 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=380823).

41. Un ejemplar fotografiado por Adrián Castillo en la reserva privada Mainumby, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 12 de junio de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] XVII *Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú; facebook.com/rmainumby).

42. Registrada por Julián Baigorria en la reserva privada Karadya, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en septiembre de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] *op. cit.*; Julián Baigorria *in litt.*).

43. Un individuo observado por Luis Pagano y Alejandro Bodrati en el km 1050 de la ruta nacional n°14, departamento San Pedro, Misiones el 27 de noviembre de 2018 (L. Pagano *obs. pers.*).

44. Un ejemplar fotografiado por Víctor Vega y Martín López Aguirre en el PN Iguazú, Misiones el 28 de julio de 2019 (ebird.org/checklist/S59856101).

45. Un individuo observado por Mark Pearman, Martín Toledo y Damián Lozano en la reserva privada Curindy, departamento Libertador General San Martín, Misiones el 16 de septiembre de 2021 (ebird.org/checklist/S94749961).

Taxonomía: Recientemente se propuso considerar como especie válida la forma boliviana *Phibalura flavivirostris boliviana* (Hennessey [2011] *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 454-458). Una supuesta hembra de *Phibalura flavivirostris boliviana* observada por Jorge Baldo cerca de San Lucas, departamento Valle Grande, Jujuy. Finalmente dicho registro fue descartado por el mismo observador (J. Baldo *in litt.*).

Especímenes (14): MACN-Or-33624, MACN-Or-33625, MACN-Or-33626, MACN-Or-33627, MACN-Or-33628, MACN-Or-33630, MACN-Or-33632, MACN-Or-33633, MACN-Or-33634, MACN-Or-33635, COFML-11109, MLP-Or-12589, CHMO-s/n, CHMO-s/n

■ PÁJARO CAMPANA | *Procnias nudicollis* | R

Distribución: Desde el NE de Brasil hasta el E de Paraguay y NE de Argentina, hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Escuchada en raras ocasiones por Florencio de Basaldúa en la provincia de Misiones, durante un viaje realizado entre los años 1897 y 1898 (de Basaldúa [1901] *Pasado, presente y porvenir del territorio nacional de Misiones*. La Plata).

2. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

3. Un ejemplar colectado por Andrés Gai en Cerro Azul, departamento Leandro Alem, Misiones en enero de 1945 (Pereyra [1951] *Hornero* 9: 291-347). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

4. Un macho joven colectado por William Partridge en Puerto Bossetti, km 30, Misiones el 13 de julio de 1958 (Navas & Bó [1988] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 11-37). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

5. Una pareja observada por Julio Contreras en Eldorado, departamento homónimo, Misiones el 12 de mayo de 1971 (J. Contreras en Herrera [1995] *Nuestras Aves* 31: 19-20).

6. Una hembra joven colectada por la Dirección Provincial de Recursos Naturales en el “departamento Iguazú, Misiones” el 5 de marzo de 1975 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). El espécimen se encuentra depositado en el MAS.

7. Una pareja observada por Julio y Andrés Contreras en Rincón de Santa María, Paso Mbaracayá, departamento Ituzaingó, Corrientes el 17 de enero de 1978 (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 61-70; Herrera [1995] *op. cit.*).

8. Un individuo escuchado por Martín de la Peña en el PN Iguazú, Misiones el 12 de octubre de 1981 (M. de la Peña en Herrera [1995] *op. cit.*).

9. Un individuo escuchado por Justo Herrera y Daniel Somay en el PN Iguazú, Misiones el 7 de agosto de 1983 (J. Herrera y D. Somay en Herrera [1995] *op. cit.*).
10. Un individuo escuchado por Justo Herrera en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1985 (J. Herrera en Herrera [1995] *op. cit.*).
11. Un individuo escuchado por Juan C. Chebez y Miguel Rinas en el PP Cruce Caballero, Misiones en noviembre de 1985 (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros)
12. Un individuo observado por Segismundo Welcz, León Florentín y Horacio Foerster en el PP Mocoaná, Misiones el 13 de noviembre de 1989 (S. Welcz, L. Florentín y H. Foerster en Chebez [1994] *op. cit.*).
13. Dos individuos observados por Andrés Johnson y Daphne Cooper de Colcombette en Eldorado, departamento homónimo, Misiones en octubre de 1990 (A. Johnson y D. Cooper de Colcombette en Chebez [1994] *op. cit.*; Herrera [1995] *op. cit.*).
14. Dos individuos escuchados por Pablo Giorgis en el PN Iguazú, Misiones el 20 de agosto de 1991 (P. Giorgis en Herrera [1995] *op. cit.*).
15. Un macho adulto observado por Gustavo Herrera en el PN Iguazú, Misiones el 7 de mayo de 1992 (Herrera [1995] *op. cit.*).
16. Registrada por Justo Herrera en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 25 de agosto de 1996 (J. Herrera en Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).
17. Registrada en el arroyo Yacuy del PN Iguazú, Misiones el 5 de agosto de 1998 (DRNEA-CIES [1997/98] *Registros de especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Iguazú*. APN; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
18. Registrada por Jorge Anfuso en el centro de recría Güirá Oga de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones en el año 1998 (J. Anfuso en Chebez & Casañas [2000] *op. cit.*).
19. Un grupo registrado por Germán Pugnali en el río Iguazú superior, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 29 de junio de 2003 (ebird.org/checklist/S26708065).
20. Dos o tres machos escuchados por Luis Pagano en el PP Moconá, Misiones el 17 de julio de 2004 (L. Pagano *obs. pers.*).
21. Varios ejemplares observados y grabados en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones entre el 26 y el 29 de septiembre de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).
22. Un individuo escuchado por Agustín Zarco y Gustavo Aprile en la reserva privada Yacutinga, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 17 de septiembre de 2006 (ebird.org/checklist/S70618518).
23. Cuatro individuos observados por Ricardo Melsew y Cecilia Belloni sobre la ruta nacional n°101 del PN Iguazú, Misiones en julio de 2012 (Palacio *et al.* [2016] *Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) del Parque Nacional Iguazú. Año 2010-2015*. APN).
24. Tres individuos observados por Justo Herrera sobre la ruta nacional n°101 del PN Iguazú, Misiones en agosto de 2012 (Palacio *et al.* [2016] *op. cit.*).
25. Unos ocho individuos (dos machos adultos vocalizando, juveniles y hembras) fotografiados por Emilio White en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones en agosto de 2012. Las aves permanecieron durante aproximadamente un mes en el sitio (E. White *in litt.*; Figura 79).
26. Un ejemplar grabado por Sebastián Cabanne, Pablo Tubaro y Ana Barreira en la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 24 de septiembre de 2012. La grabación se encuentra depositada en la Colección de Sonidos del MACN.
27. Escuchada por Guillermo Gil y Marcelo Cavicchia entre el arroyo Yacuy y la seccional Apepú, PN Iguazú, Misiones en julio de 2013 (Palacio *et al.* [2016] *op. cit.*; Administración de Parques Nacionales [2017] *Plan de Gestión Parque Nacional Iguazú. Período 2017-2023*. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable & APN).
28. Un total de tres individuos vocalizando cerca de la seccional Apepú del PN Iguazú, Misiones el 4



Figura 79. Pájaro Campana *Procnias nudicollis*, establecimiento San Jorge, Misiones, agosto de 2012 (Emilio White)

de septiembre de 2013 (DNREA [2013] *Apepú 2013. Campaña de Invierno, Parque Nacional Iguazú*. APN).

29. Un ejemplar fotografiado por Adrián Castillo en la reserva privada Mainumby, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de agosto de 2016 (Baigorria & Castillo [2017] *XVII Reunión Argentina de Ornitología*. Puerto Iguazú; Julián Baigorria *in litt.*).

30. Escuchada por Pablo Serur en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 15 de septiembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=616797).

31. Escuchada por Pablo Serur en la reserva privada Surucuá, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 5 de noviembre de 2018 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=834480).

32. Un macho observado por Emilio White en el establecimiento San Jorge, departamento Iguazú, Misiones en mayo de 2020 (E. White *in litt.*).

33. Un macho inmaduro grabado por Mauricio Martínez en el PN Iguazú, Misiones el 19 de agosto de 2020. El ejemplar permaneció en el sitio los días posteriores y pudo ser registrado por otros observadores (ebird.org/checklist/S72609997).

34. Un ejemplar fotografiado por Sergio Moya en el PN Iguazú, Misiones el 18 de julio de 2021 (ebird.org/checklist/S92268241).

Comentarios: El espécimen MACN-Or-63403 con localidad Iguazú, Misiones proviene de un decomiso y se desconoce su origen (Yolanda Davies *com. pers.*). El ejemplar inmaduro sin datos exhibido en el CNH proviene de Paraguay (Amado Martínez *com. pers.*). Escuchada durante septiembre en las islas y las costas argentina y brasilera del río Iguazú, Misiones (Rogelio Ymbernón *en* Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64). Registrada con cierta regularidad en la zona del *perobal* del PN Iguazú, Misiones durante el otoño e invierno (Gabriel Moresco *in litt.*). Considerada En Peligro a nivel nacional (MayDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (3): MACN-Or-35963, MACN-Or-38530, MAS-Or-4512

■ BAILARÍN CASTAÑO | *Piprites pileata* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando hasta Misiones, Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 3 de septiembre de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2-3. Un macho observado por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el PP Caá Yari, Misiones entre el 26 y el 28 de abril de 2006. Posteriormente Néstor Fariña obtuvo grabaciones en el mismo sitio el 22 de mayo de 2006, escuchando otro individuo a la distancia. Claudio Maders y Gastón Di Santo volvieron a registrar el ave el 24 y 29 de mayo del mismo año (Maders *et al.* [2007] *Ornitología Neotropical* 18: 127-131).

4. Un individuo escuchado por Claudio Maders en un segundo territorio del PP Caá Yari, Misiones el 30 de abril de 2006 (Maders *et al.* [2007] *op. cit.*).

5. Una pareja observada (macho y nido fotografiados) en el PP Caá Yari, Misiones entre el 11 y el 24 de octubre de 2006. El nido fue hallado en el suelo el 31 de octubre de ese año, siendo colectado y depositado en el MLP (Cockle *et al.* [2008] *Cotinga* 29: 166-168).

6-7. Una hembra observada y un segundo individuo escuchado por Claudio Maders y Gastón Di Santo en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 13 de octubre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *Cotinga* 31: 95-100).

8. Una pareja observada por Claudio Maders y Gastón Di Santo en el límite entre el PP Caá Yari y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 11 de noviembre de 2006 (Cockle *et al.* [2008] *op. cit.*; Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).

9. Una pareja observada por Alejandro Bodrati y Néstor Fariña en otro sector del límite entre el PP Caá Yari y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 5 de junio de 2007 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).

10-11. Un macho fotografiado y otro individuo escuchado cerca del arroyo San Juan de la reserva natural Papel Misionero, departamento Guaraní, Misiones el 31 de agosto de 2009 (Bodrati *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 76-78).

Comentarios: Omitimos las observaciones publicadas en internet debido a que corresponden a los mismos territorios e individuos descriptos en los trabajos mencionados. Considerada En Peligro Crítico a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina (2015)*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (1): MACN-Or-39436

■ MOSQUETA PECHO PARDO | *Hemitriccus obsoletus* | R

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando al extremo NE de Argentina, entre los 500-2300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1-2. Observada por Carlos Saibene y Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 4 de mayo y el 21 de julio de 1991 (Saibene & Castelino [1993] *Hornero* 13: 308).

3. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati y Juan I. Areta en el PP Esmeralda, Misiones el 18 de septiembre de 2005 (Bodrati & Areta [2006] *Ornitología Neotropical* 17: 597-600).

4. Un ejemplar grabado por Alejandro Bodrati en el PP Caá Yari, Misiones el 8 de mayo de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *Nuestras Aves* 54: 3-5). En esta localidad fue registrada en forma regular por varios ob-