

servadores entre mayo de 2006 y septiembre de 2009 (ebird.org).

5. Un individuo escuchado y observado por Alejandro Bodrati, Kristina Cockle y Néstor Fariña en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 7 de noviembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).

6. Hasta cuatro individuos observados por Ernesto Krauczuk en la reserva privada Selva Paranaense Don Otto, departamento Eldorado, Misiones el 27 de diciembre de 2006 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).

7. Un ejemplar grabado y fotografiado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle en la reserva privada Refugio Tangará, departamento Guaraní, Misiones el 9 de febrero de 2007 (Bodrati *et al.* [2009] *op. cit.*).

8. Un ejemplar observado y grabado por Alejandro Bodrati en el arroyo Paraíso, límite entre el PP Caá Yari y la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 22 de mayo de 2011 (A. Bodrati *in litt.*).

9. Un individuo observado por Alejandro Bodrati y Luis Pagano en el arroyo Paraíso del PP Caá Yari, Misiones el 16 de abril de 2013 (A. Bodrati *in litt.*).

10. Un individuo observado y escuchado por Julián Quillén Vidoz en el PP Caá Yari, Misiones el 5 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24577773).

11. Un ejemplar observado y fotografiado por Facundo Di Sallo y Alejandro Bodrati en el PP Caá Yari, Misiones el 4 de noviembre de 2020 (ebird.org/checklist/S76463287; Figura 80). El mismo posee un territorio en el lugar y fue relocalizado por otros observadores (ebird.org).

Comentarios: Incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) asumiendo que uno de los ejemplares hallados en el PN Iguazú, Misiones había sido grabado (Saibene & Castelino [1993] *op. cit.*). Por el contrario, estos autores no obtuvieron grabaciones de la especie (Miguel Castelino *en* Bodrati & Areta [2006] *op. cit.*). La mayoría de los registros ocurren en un sector restringido del arroyo Paraíso, departamento Guaraní, Misiones y seguramente representan una pequeña población local.



Figura 80. Mosqueta Pecho Pardo *Hemitriccus obsoletus*, PP Caá Yari, Misiones, 4 de noviembre de 2020 (Facundo Di Sallo)

■ FIOFÍO BELICOSO | *Elaenia chiriquensis* | R

Distribución: Desde Costa Rica y Panamá hasta el E de Sudamérica incluyendo el extremo NE de Argentina, mayormente por debajo de los 1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 8 de mayo de 1959 (Partridge [1964] *Neotrópica* 10: 41-48). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

- 2-3. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 13 y 14 de octubre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
4. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 27 de octubre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
5. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 17 de diciembre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
- 6-11. Cuatro machos y dos hembras colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 21 de diciembre de 1959 (Partridge [1964] *op. cit.*). Tres especímenes se encuentran depositados en el MACN y los restantes en el MLP.
12. Un macho colectado por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 21 de noviembre de 1960 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
- 13-15. Dos machos y una hembra colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 19 de enero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Dos especímenes se encuentran depositados en el MACN y el restante en el MLP.
- 16-17. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 20 y 23 de enero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
- 18-19. Dos machos colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 1 y 6 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
20. Una hembra colectada por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 20 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.
- 21-23. Un macho y dos ejemplares sin sexar colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 23 de febrero de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
- 24-25. Una hembra y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en el km 10 del arroyo Uruguayí, Misiones el 9 y 10 de marzo de 1961 (Partridge [1964] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.
26. Un macho colectado en el cerro Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy el 6 de enero de 1966 (Olrog & Contino [1966] *Neotrópica* 12: 66). El espécimen parece estar perdido en la actualidad.
- 27-29. Dos hembras y un macho colectados por Claës Olrog, Juan Simón Guanuco y Ricardo Ojeda en el arroyo Rosario, ruta provincial n°21, departamento San Pedro, Misiones el 25 de octubre de 1977. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
30. Un total de diez ejemplares anillados por Claës Olrog en el paraje Paraíso, departamento San Pedro, Misiones entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1977 (Patricia Capllonch *in litt.*).
31. Un ejemplar anillado por Carlos Gerow en El Cucho, departamento Palpalá, Jujuy el 21 de diciembre de 1978 (Patricia Capllonch *in litt.*).
32. Un ejemplar capturado y fotografiado por Patricia Capllonch en la estancia La Blanca, departamento Santo Tomé, Corrientes entre el 14 y el 21 de abril de 2004 (Capllonch *et al.* [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 483-498; Alderete & Capllonch [2010] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 58: 1-5).
33. Un ejemplar escuchado por Alejandro Bodrati cerca del puente internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 3 de septiembre de 2015 (A. Bodrati *en de la Peña* [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Nueva Serie* 9: 1-441).
- Comentarios:** Según Claës Olrog y Francisco Contino ([1966] *op. cit.*) el ejemplar colectado en Jujuy tenía un largo de cola de 71 mm. Esta medida es muy superior al rango de 62-64 mm dado por William Partridge para los machos adultos de Misiones (Partridge [1964] *op. cit.*), pero coincidiendo con el rango del FIOFÍO GRANDE *Elaenia spectabilis* (70-82,5 mm en machos; Zimmer [1941] *American Museum Novitates* 1108: 1-23). No existen medidas disponibles para los ejemplares anillados en Misiones, Jujuy

ni Corrientes (Patricia Capllonch *in litt.*). Mencionada como bastante común en las capueras y yerbales de Puerto Bemberg (actualmente Puerto Libertad), departamento Iguazú, Misiones (Partridge [1964] *op. cit.*).

Especímenes (27): MACN-Or-38539, MACN-Or-39542, MACN-Or-39543, MACN-Or-39544, MACN-Or-39546, MACN-Or-39548, MACN-Or-39550, MACN-Or-44777, MACN-Or-44778, MACN-Or-44779, MACN-Or-44780, MACN-Or-44781, MACN-Or-44782, MACN-Or-44783, MACN-Or-44784, MACN-Or-44785, MACN-Or-44787, MACN-Or-44788, MACN-Or-44789, COFML-14530, COFML-14531, COFML-14532, MLP-Or-12594, MLP-Or-12595, MLP-Or-13644, MLP-Or-13645, MLP-Or-13880

■ BURLISTO CABEZA GRIS | *Attila phoenicurus* | R

Distribución: Se reproduce en la región SE de Brasil, y posteriormente realiza una migración hacia el centro de la Amazonia (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 4 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 3: 87-153). El espécimen se encuentra depositado en el MLP.

2-3. Dos hembras colectadas por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 10 y 11 de febrero de 1952 (Partridge [1954] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

4-5. Un macho y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 20 de octubre de 1953. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

6-7. Dos machos colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 23 y 24 de octubre de 1953. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

8. Un macho colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 1953. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

9. Un ejemplar sin sexar colectado por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones en octubre de 1953. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

10-11. Un macho y una hembra colectados por William Partridge en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 28 de noviembre de 1954. Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

12. Un ejemplar colectado por Claës Olrog, Juan Simón Guanuco y Ricardo Ojeda sobre la ruta provincial n°21 unos 48 km al sudeste de San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 27 de octubre de 1977. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

13. Observada por Flavio Moschione en el arroyo Yabebiry, Misiones en el año 1987 (F. Moschione *en* Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).

14. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Narosky & Yzurieta [1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).

15. Observada en El Alcázar, departamento Libertador General San Martín, Misiones sin fecha (Adrián Di Giacomo *en* Chebez [1994] *op. cit.*).

16. Una pareja hallada por Mark Pearman a unos 9 km de Mesa Redonda, RB Yaboty, Misiones el 1 de febrero de 2004 (Bodrati *et al.* [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Mark Pearman *in litt.*; MLNS-139214). Las aves fueron registradas hasta marzo de ese año (Germán Pugnali y Daniel Almirón *en* ebird.org).



Figura 81. Burlisto Cabeza Gris *Attila phoenicurus*, reserva natural Guaraní, Misiones, 19 de noviembre de 2020 (Martjan Lammertink)

17. Dos individuos observados mientras vocalizaban en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 18 de julio de 2004 (Bodrati & Cockle [2006] *Cotinga* 26: 20-24).

18-21. Grabada por Alejandro Bodrati en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones en octubre de 2005, octubre de 2006 y octubre y noviembre de 2007 (A. Bodrati *com. pers.*).

22-24. Grabada por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones en los años 2013, 2014 y 2016 (A. Bodrati *com. pers.*).

25. Un macho colectado por Natalia García y Natalia Trujillo en el PN Mburucuyá, Corrientes el 28 de enero de 2015 (García *et al.* [2016] *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 68-71). La fecha publicada como “28 de mayo de 2015” es un error (N. García *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

26. Una pareja territorial registrada por Alejandro Bodrati y Facundo Di Sallo en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones en noviembre y diciembre de 2020 (A. Bodrati y F. Di Sallo *in litt.*; ebird.org; Figura 81).

27. Registrada por Santiago Torres y Wálter Gómez Umpierrez en la reserva natural Guaraní, departamento Guaraní, Misiones el 15 de noviembre de 2021 (ecoregistros.org). Probablemente el mismo ejemplar fotografiado por Diego Monteleone y Cagan Sekercioglu en dicha localidad el 21 de diciembre de 2021 (D. Monteleone *obs. pers.*; ebird.org).

Taxonomía: Anteriormente incluido en el género monotípico *Pseudattila*. Melvin Traylor ([1977] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 148: 129-184) la incorpora dentro del género *Attila*.

Comentarios: Un ejemplar observado por Hernán Povedano en el PN Iguazú, Misiones a comienzos de la década de 1990 necesita confirmación (H. Povedano *en* Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA). Considerada Insuficientemente Conocida a nivel

nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (13): MACN-Or-33637, MACN-Or-33638, MACN-Or-34334, MACN-Or-34335, MACN-Or-34336, MACN-Or-34337, MACN-Or-34338, MACN-Or-36871, MACN-Or-36872, MACN-Or-73447, COFML-11110, COFML-14511, MLP-Or-12590

■ BENTEVEO PICO FINO | *Pitangus lictor* | V

Distribución: Ampliamente distribuida en la mitad N de Sudamérica, mayormente por debajo de los 500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Samuel Narosky y Juan Klimaitis en Los Talas, partido de Berisso, Buenos Aires el 6 de mayo de 1979. El mismo fue colectado el 26 de mayo de ese año (Narosky [1983] *Hornero* 12. *Número Extraordinario*: 74-76; Klimaitis & Milat [1993] *Catálogo Sistemático de las Aves en Exhibición*. Museo Ornitológico Municipal de Berisso). El espécimen se encuentra depositado en el MOMB.

2. Un ejemplar fotografiado por Horacio Pomi en Los Talas, partido de Berisso, Buenos Aires el 13 de septiembre de 2012. El ave permaneció en el sitio al menos hasta noviembre de ese año, pudiendo ser registrada por otros observadores (Klimaitis *et al.* [2015] *Garganchillo. Nueva Serie* 7: 3-9; Figura 82).

Taxonomía: Durante mucho tiempo en el género *Philohydor*, creado en base a diferencias en la siringe y la forma del nido (Lanyon [1984] *American Museum Novitates* 2797: 1-28).

Especímenes (1): MOMB-171/79



Figura 82. Benteveo Pico Fino *Pitangus lictor*, Los Talas, Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (Cristian Klimaitis)

■ YETAPÁ CHICO | *Alectrurus tricolor* | R

Distribución: Especie típica del cerrado, ocupando el SE de Brasil, N de Bolivia y NE de Paraguay hasta los 1100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Alcide d'Orbigny en "Corrientes" entre marzo de 1827 y abril de 1828 (d'Orbigny [1835-1847] *Voyage dans l'Amérique Méridionale*. Paris). El espécimen se encuentra depositado en el MNHN (Figura 83).

2. Un ejemplar colectado por Roberto Dabbene en "Misiones" en octubre de 1900 (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 84).

3-5. Una hembra adulta, un macho inmaduro y un ejemplar sin sexar colectados por William Partridge en Parada Leis, departamento Capital, Misiones



Figura 83. Yetapá Chico *Alectrurus tricolor*, MNHN-ZO-MO-2003-2140, Corrientes, entre 1827 y 1828 (Patrick Boussès, Muséum National d'Histoire Naturelle)



Figura 84. Yetapá Chico *Alectrurus tricolor*. Izquierda: MACN-Or-5493, Misiones, octubre de 1900. Derecha: MACN-Or-734, sin datos (Diego Monteleone)

el 11 de julio de 1961 (Navas & Bó [1988] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 15: 11-37). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

6-7. Un adulto y un macho joven colectados por William Partridge en Parada Leis, departamento Capital, Misiones el 27 de julio de 1961 (Navas & Bo [1988] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

8. Un macho observado por Samuel Narosky cerca de Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 6 de septiembre de 1979 (S. Narosky, inédito).

9. Mencionada sin detalles para la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes (Chebez [2005] *Guías de las reservas naturales de la Argentina*. Tomo 3. Albatros).

10. Un macho adulto observado por José Vizcachipi sobre la ruta provincial n°40 cerca de la estancia La Clarita, departamento San Martín, Corrientes en octubre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] en Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).

11. Un macho observado por Alejandro Bodrati sobre la ruta nacional n°14 unos 10 km al noreste de San José, departamento Capital, Misiones el 22 de marzo de 2022 (Bodrati & Monteleone *en prep.*).

Comentarios: El espécimen macho adulto MACN-Or-734 podría ser parte de la expedición de Roberto Dabbene a la provincia de Misiones (Figura 84). Había sido incluida para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes en base a una observación de Judith Hutton en diciembre de 1990 (Gómez & Babarskas [1992] en Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN). Posteriormente Chatellenaz *et al.* ([2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160) la excluyen del listado asumiendo que se trató de un error. Considerada Posiblemente Extinta a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (7): MACN-Or-5493, MACN-Or-44607, MACN-Or-44608, MACN-Or-44609, MACN-Or-44610, MACN-Or-44611, MNHN-ZO-MO-2003-2140

■ GAUCHO ANDINO | *Agriornis albicauda* | R

Distribución: Local en los Andes desde Ecuador hasta el N Chile y NO de Argentina, mayormente entre los 2500-4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Luis Dinelli en el cerro Muñoz, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 25 de mayo de 1906 (Lillo [1909] *Apuntes de Historia Natural* 1: 21-26). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2. Una hembra colectada por Johan Mogensen en Aconquija, Tucumán el 12 de agosto de 1912. El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Un ejemplar colectado por Leo Miller y Howarth Boyle arriba de Tafi del Valle, departamento homónimo, Tucumán en abril de 1916 (Chapman [1926] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 55: 134-702; Zimmer [1937] *American Museum Novitates* 930: 1-27). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

4. Un ejemplar colectado por Johan Mogensen en Corral Quemado, departamento Belén, Catamarca el 4 de diciembre de 1918 (Collar *et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP). El espécimen se encuentra depositado en el MCZ.

5. Dos individuos observados por Claës Olrog en El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán en mayo de 1948 (Olrog [1949] *Acta Zoológica Lilloana* 7: 139-159). Al parecer una hembra fue capturada en dicha expedición el 19 de mayo de 1948, pero lamentablemente no pudo ser hallada en las colecciones.



Figura 85. Gaucho Andino *Agriornis albicauda*, quebrada del Corralito, Tucumán, 5 de abril de 2021 (Andrés Terán)

- 6-7. Dos ejemplares colectados por Claës Olrog arriba de Tafi del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 1 de junio de 1952. Nores & Yzurieta (*en* Collar *et al.* [1992] *op. cit.*) mencionan que fueron obtenidos en “mayo y junio de 1952”, información que parece errónea ya que no existirían especímenes de mayo de 1952. Los especímenes se encuentran depositados en la COFML.
8. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en el cerro Muñoz, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 30 de marzo de 1991 (Blendinguer [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).
9. Dos individuos observados por Robert Dobbs y Paul Martin en El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 21 de octubre de 1997 (ebird.org/checklist/S24357851).
10. Un individuo observado por Mark Pearman arriba de El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 30 de septiembre de 2001 (M. Pearman *in litt.*).
11. Dos individuos observados por Germán Pugnali en El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 9 de julio de 2003 (ebird.org/checklist/S26738733).
12. Un individuo observado por Santiago Imberti en El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán el 10 de agosto de 2003 (ebird.org/checklist/S27190137).
- 13-14. Registrada en La Ciénaga y en El Infiernillo, departamento Tafi del Valle, Tucumán entre los años 2003 y 2005 (Capllonch [2007] *Acta Zoológica Lilloana* 51: 151-160; Capllonch *et al.* [2011] *Acta Zoológica Lilloana* 55: 50-63).
15. Patricia Capllonch la menciona como de presencia habitual a lo largo de la ruta provincial n°307 en el valle de Tafi, departamento Tafi del Valle, Tucumán entre los meses de julio y agosto (Capllonch [2007] *op. cit.*).
16. Mencionada sin detalles para Caspalá y Santa Ana, departamento Valle Grande, Jujuy (Moschione [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de

Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Burgos *et al.* [2009] *Lista de las aves de la provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy).

17. Mencionada sin detalles para la RP Laguna Leandro, Jujuy (Moschione [2005] *op. cit.*; Burgos *et al.* [2009] *op. cit.*).

18-20. Mencionada sin detalles para el PN Los Cardones, la sierra de Santa Victoria y la sierra de Zenta, Salta (Moschione [2005] *op. cit.*).

21-26. Mencionada sin detalles para seis localidades de la provincia de Tucumán (Di Giacomo [2005] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

27-28. Dos individuos observados en el filo del Pantanito y en el cerro Picacho, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).

29. Mencionada para las inmediaciones del MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy sin detalles (Moschione *et al.* [2011] *Aves Argentinas* 30: 14-17).

30. Un adulto observado por Luis Pagano en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 17 de julio de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

31. Un individuo observado por Luis Pagano sobre la ruta provincial n°7 cerca del acceso a Lizoite, departamento Santa Victoria, Salta el 20 de julio de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

32. Un individuo observado por Mario Mosqueira en El Infiernillo, departamento Tafí del Valle, Tucumán el 14 de septiembre de 2017 (ebird.org/checklist/S39522999).

33. Un individuo observado por Nicolás Bejarano en Casa de Piedra, departamento Rosario de Lerma, Salta el 19 de mayo de 2018 (ebird.org/checklist/S51466169).

34. Un individuo observado por Pablo Grilli y Laura Dodyk al oeste de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51551098).

35. Un ejemplar filmado y fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy en la quebrada del Corralito, departamento Trancas, Tucumán el 22 de enero de 2021 (ebird.org/checklist/S79771703). En el lugar al parecer existe una pequeña población local, ya que las aves fueron nuevamente registradas por otros observadores (ebird.org; Figura 85).

Taxonomía: Anteriormente conocida como *Agriornis andicola* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).

Comentarios: Existen numerosas confusiones con la raza puneña del GAUCHO PARDO *Agriornis micropterus andicola* y con el GAUCHO SERRANO *Agriornis montanus*, por lo tanto las observaciones sin documentar deben tomarse con mucha cautela. El ave colectada por la expedición sueca en El Moreno, departamento Tumbaya, Jujuy (Lönnerberg [1903] *Ibis* 45: 441-471) probablemente corresponda a *Agriornis micropterus*. Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (6): MACN-Or-8633, COFML-00474, COFML-7969, COFML-7972, AMNH-141430, MCZ-99389

■ BURLISTO BOREAL | *Contopus virens* | V

Distribución: Nidifica en una extensa región al E de Estados Unidos. Posteriormente ocupa el NO de Sudamérica incluyendo N de Bolivia y SE de Perú (Watt *et al.* [2020] en Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Una pareja colectada por Gunnar Höy en San Ramón de la Nueva Orán, departamento

Orán, Salta el 12 de septiembre de 1978 (Höy [1981] *Historia Natural* 2: 43-44). Uno de los especímenes se encuentra depositado en el MACN (Figura 86).

2. Un ejemplar grabado y fotografiado por Oscar Spitznagel, Flavio Moschione y Juan I. Areta en El Gallinato, departamento La Caldera, Salta entre el 27 de febrero y el 3 de abril de 2016 (Spitznagel *et al.* [2018] *Cotinga* 40: 114-116; xeno-canto.org/402740).

3. Un individuo observado y escuchado por Flavio Moschione en Las Blancas, departamento Rosario de Lerma, Salta el 31 de marzo de 2020 (ebird.org/checklist/S66459170).

Especímenes (1): MACN-Or-53004



Figura 86. Burlisto Boreal *Contopus virens*, MACN-Or-53004, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, 12 de septiembre de 1978 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ ZORZAL AZULADO | *Turdus flavipes* | R

Distribución: La subespecie nominal en la región SE de Brasil, incluyendo el SE de Paraguay y Misiones en Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho adulto colectado por Gustavo Niederlein en “Pinar de San Pedro”, Misiones en septiembre de 1887 (Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 87).

2. Mencionada sin detalles para Iguazú, Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

3-4. Dos machos colectados en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 30 de octubre de 1953 (Chebez [1992] *Hornero* 13: 257-258; Navas & Bó [1993] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 16: 36-50). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

5-7. Tres machos colectados en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de octubre de 1953 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

8. Un macho colectado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 1 de noviembre de 1953 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.



Figura 87. Zorzal Azulado *Turdus flavipes*, MZUC-124, pinar de San Pedro, Misiones, septiembre de 1887 (Luis Pagano)



Figura 88. Zorzal Azulado *Turdus flavipes*, posada La Lorenza, Misiones, 25 de septiembre de 2016 (Emilio White)

9-12. Cuatro machos colectados en el km 30 del arroyo Uruguayí, Misiones el 6, 14, 25 y 28 de septiembre de 1954 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

13-14. Dos machos colectados en el km 30 del arroyo Uruguayí, Misiones el 2 y 12 de octubre de 1954 (Chebez [1992] *op. cit.*; Navas & Bó [1993] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

15. Mencionada por William Partridge para el PN Iguazú, Misiones durante una visita entre el 25 y el 27 de septiembre de 1959 (Chebez [1992] *op. cit.*).

16. Un ejemplar grabado y fotografiado por Leandro Castillo en la reserva privada de Vida Silvestre Uruguayí, departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 22 de noviembre de 2014 (Amicone [2015] *Vida Silvestre* 131: 22-26; xeno-canto.org/256917).

17. Un ejemplar fotografiado por Emilio White en la posada La Lorenza, departamento Iguazú, Misiones el 25 de septiembre de 2016. El ejemplar permaneció varios días en el lugar (E. White *in litt.*; Figura 88).

18. Un individuo escuchado y observado por Alejandro Bodrati en la propiedad Las Ratás de Forestal Belga SA, departamento San Pedro, Misiones el 13 de noviembre de 2021 (A. Bodrati *in litt.*).

Especímenes (13): MACN-Or-34486, MACN-Or-34487, MACN-Or-34488, MACN-Or-34489, MACN-Or-34490, MACN-Or-34491, MACN-Or-37184, MACN-Or-37185, MACN-Or-37186, MACN-Or-37187, MACN-Or-37188, MACN-Or-37189, MZUC-124

■ ARAÑERO ESTRIADO | *Setophaga striata* | V

Distribución: Se reproduce en una extensa franja desde Alaska al E de Canadá. Luego migra a través de Estados Unidos y el Caribe, ocupando el NO de Sudamérica hasta Bolivia (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un macho en plumaje reproductivo colectado en el km 30 del arroyo Uruguay, Misiones el 11 de enero de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

2. Un macho en plumaje reproductivo colectado en Tobuna, departamento San Pedro, Misiones el 31 de mayo de 1959 (Partridge [1961] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

3. Varios machos observados en los alrededores de Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires entre el 12 y el 15 de febrero de 1966 (Olrog [1967] *Acta Zoológica Lilloana* 22: 249-254; Olrog [1967] *Hornero* 10: 292-298).

4. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN).

5. Dos individuos observados por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 6 de enero de 1987 (F. Moschione en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú*, Misiones, Argentina. LOLA).

6. Un macho en plumaje reproductivo fotografiado por Francisco Erize en Colonia Carlos Pellegrini, departamento San Martín, Corrientes el 15 de abril de 2007 (Erize [2008] *Nuestras Aves* 53: 44).

7. Un macho observado por Alejandro Bodrati en San Pedro, departamento homónimo, Misiones el 25 de noviembre de 2010 (Bodrati [2012] *Nuestras Aves* 57: 13-14).

8. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 23 de noviembre de 2016 (Pagano & Bodrati *en prep.*).

9. Un macho en plumaje reproductivo fotografiado por Malena Ruzak en Leandro Alem, departamento homónimo, Misiones el 25 de mayo de 2019 (Ruzak & Moya [2020] *Nuestras Aves* 65: 71).

10. Un individuo en plumaje de reposo observado por Silvia Vitale y Carlos Ferrari en el portal Cambyretá, departamento Ituzingó, Corrientes el 16 de octubre de 2019 (ebird.org/checklist/S61371270).

11. Un macho inmaduro fotografiado por Marcos Enrique en cercanías de Miguel Torres, departamento General López, Santa Fe el 29 de mayo de 2020 (Enrique & Capovilla [2021] *Nuestras Aves* 66: 111).

Taxonomía: Conocido tradicionalmente como *Dendroica striata* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

Especímenes (2): MACN-Or-38936, MACN-Or-39683

■ DIADEMA | *Catamblyrhynchus diadema* | R

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, entre los 2300-3500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Francisco Contino en Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy el 23 de septiembre de 1957 (Höy *et al.* [1963] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 43: 295-308). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 89).

2. Mencionada sin detalles para el PN Calilegua, Jujuy (Fjeldsø & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes*. University of Copenhagen).

3. Tres individuos observados por Juan Mazar Barnett y Bernabé López-Lanús en el PN Calilegua, Jujuy el 13 de julio de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *Hornero* 14: 264-266).

4. Un macho joven colectado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 89).

5. Un individuo observado por Pablo Giorgis en el PN Calilegua, Jujuy el 28 de agosto de 1995 (P. Giorgis en Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).

6. Registrada por H. Zawacki en el PN Calilegua, Jujuy el 7 de junio de 1996 (Néstor Sucunza en Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).
7. Un individuo observado por Alejandro y Guillermo Bodrati en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de agosto de 1996 (A. y G. Bodrati en Di Giacomo *et al.* [1997] *op. cit.*).
8. Un individuo observado por Mario Mosqueira en el extremo sur de la sierra de Santa Bárbara, departamento homónimo, Jujuy en el año 1996 (M. Mosqueira *in litt.*). Esto fue publicado como “Sierra de Santa Bárbara, Salta” (Rougès & Seaman [2001] *Nuestras Aves* 42: 28-29).
9. Registrada por Javier Cerutti en el PN Calilegua, Jujuy en octubre de 1997 (J. Cerutti en Rougès & Seaman [2001] *op. cit.*).
10. Un individuo capturado por Mercedes Rougès y Dana Seaman en el PN El Rey, Salta el 28 de agosto de 1998 (Rougès & Seaman [2001] *op. cit.*). Al parecer el ejemplar no fue colectado.
11. Un inmaduro observado por Mark Pearman en el PN Calilegua, Jujuy el 1 de septiembre de 1998 (M. Pearman *in litt.*).
12. Un ejemplar fotografiado y filmado por Hernán Alvarado en el PN Calilegua, Jujuy el 22 de julio de 2003 (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=3549; Figura 90).
13. Un individuo observado por Fabrice Schmitt en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de octubre de 2006 (ebird.org/checklist/S47324865).
14. Registrada en la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione *et al.* [2011] XIV Reunión Argentina de Ornitología. Formosa).
15. Dos ejemplares fotografiados por Ulises Ornstein, Dario Unterkofler, Julián Hernández y un grupo de observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 18 de julio de 2011 (ebird.org/checklist/S37398638).
16. Un individuo observado por Michelle Delaloye y otros observadores en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de octubre de 2013 (ebird.org/checklist/S33625428).
17. Un individuo observado por Santiago Torres en el PN Calilegua, Jujuy el 15 de septiembre de 2019 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=973431).

Comentarios: La mayoría de los registros ocurren entre junio y septiembre, sugiriendo que la especie sería un visitante invernal en las yungas argentinas. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (2): MACN-Or-54361, MACN-Or-54591



Figura 89. Diadema *Catamblyrhynchus diadema*. Arriba: MACN-Or-54591, sierra de Santa Bárbara, Jujuy, 23 de septiembre de 1957. Abajo: MACN-Or-54361, PN Baritú, Salta, 17 de agosto de 1993 (Luis Pagano)




Figura 90. Diadema *Catamblyrhynchus diadema*, PN Calilegua, Jujuy, 22 de julio de 2003 (Hernán Alvarado)

■ JILGUERO COLA BLANCA | *Sicalis citrina* | R

Distribución: Poblaciones dispersas en Sudamérica. Localmente en el NE de Brasil, el cerrado, Bolivia y NO de Argentina mayormente entre los 800-2800 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Fritz Schulz en la “Sierra de Tucumán”, sin fecha (Cabanis [1883] *Journal für Ornithologie* 31: 106-111). El espécimen se encuentra depositado en el ZBM (Figura 91).

2. Un macho colectado por Miguel Lillo en las cumbres de Mala Mala, departamento Lules, Tucumán el 6 de abril de 1901 (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221; Lillo [1905] *Fauna Tucumana: Aves*. Revista de Letras y Ciencias Sociales). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 92).

3. Una hembra colectada por Juan Simón Guanuco en Hualinchay, departamento Trancas, Tucumán el 4 de mayo de 1957 (Olrog [1962] *Acta Zoológica Lilloana* 18: 111-120). El espécimen se encuentra depositado en la COFML (Figura 92).

4-5. Mencionada por Paul Handford como bastante común en los alrededores de Tafi del Valle, departamento homónimo, Tucumán en los veranos de 1972/73 y 1973/74 (Handford [1983] *Neotrópica* 29: 97-105).

6. Más de 50 individuos observados por Mark Pearman cerca de Canto El Monte (22°21'S 64°43'W), departamento Santa Victoria, Salta el 26 de diciembre de 1996 (Pearman [2001] *Cotinga* 16: 76-80).

7. Un individuo observado por Francisco Cornell en Volcán, departamento Tumbaya, Jujuy el 24 de febrero de 2002 (ebird.org/checklist/S11453901).



Figura 91. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*, ZMB-26562, Sierra de Tucumán (Carola Radke, Museum für Naturkunde)



Figura 92. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*. Arriba: COFML-10744, Hualinchay, Tucumán, 4 de mayo de 1957. Abajo: COFML-2269, cumbres de Mala Mala, Tucumán, 6 de abril de 1901 (Luis Pagano)

8. Numerosos individuos observados por Ignacio Roesler en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta en enero de 2004 (I. Roesler *in litt.*).
9. Una pareja observada cerca de Villamonte, departamento Santa Bárbara, Jujuy sin fecha (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires; José Segovia *in litt.*).
10. Un total de nueve ejemplares hallados muertos y fotografiados en Termas de Reyes, departamento Doctor Manuel Belgrano, Jujuy el 18 de julio de 2010 (Colina & Portales [2012] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 106: 1-8). Lamentablemente los especímenes no fueron conservados (Freddy Burgos *in litt.*).
- 11-13. Mencionada sin detalles para las localidades de Tafi del Valle, Piedra Tendida y Sierra de Medina, Tucumán (Ortiz *et al.* [2013] *Biológica* 16: 39-71).
14. Dos individuos observados por Emiliano García Loyola en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 27 de septiembre de 2014 (ebird.org/checklist/S27372681).
15. Un individuo observado por Frank Dijkstra entre Purmamarca y Salinas Grandes, departamento Tumbaya, Jujuy el 9 de agosto de 2015 (ebird.org/checklist/S24778566).
16. Tres individuos observados por Julián Quillén Vidoz en Tafi del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 6 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32170572).
17. Mencionada sin detalles para Yavi, departamento homónimo, Jujuy (Mamani *et al.* [2018] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 245: 1-19).
18. Unos seis individuos observados y grabados por Freddy Burgos y Américo Vilte en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta el 19 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S52161180).
19. Un ejemplar fotografiado por Giselle Mangini y Facundo Gandoy sobre la ruta provincial n°325 al oeste de Monteros, departamento homónimo, Tucumán el 27 de junio de 2021 (ebird.org/checklist/S91089030; Figura 93).
20. Unos doce ejemplares fotografiados por Ulises Ornstein, Daniel Almirón y Hugo Hulsberg en el camino a Mecoyita, departamento Santa Victoria, Salta el 8 de noviembre de 2021 (ebird.org/checklist/S97547759).

Taxonomía: *Orosppina pratensis* fue descripto por Jean Cabanis en base al ejemplar depositado en el



Figura 93. Jilguero Cola Blanca *Sicalis citrina*, ruta provincial n°325, Tucumán, 27 de junio de 2021 (Giselle Mangini)

ZMB (Cabanis [1883] *op. cit.*), y luego pasó a la sinonimia de *Sicalis citrina*. Posteriormente los ejemplares de Argentina fueron asignados a la forma nominal (Hellmayr [1938] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series. Volume XIII. Part XI*). Actualmente la forma *pratensis* no es reconocida, y los especímenes argentinos determinados como subespecie *occidentalis* (Jaramillo [2020] *en del Hoyo et al. [editores] Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology; Pearman & Areta [2020] Birds of Argentina and the South-west Atlantic. Helm Field Guides*).

Comentarios: Claës Olrog ([1962] *op. cit.*) menciona que la hembra fue colectada en San Pedro de Colalao, departamento Trancas, Tucumán. Ortiz *et al.* ([2013] *op. cit.*) citan un espécimen proveniente de “Altos de la Totorá, Trancas, Tucumán” que no pudo ser hallado en la COFML. Considerada Insuficientemente Conocida a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas). **Especímenes (3):** COFML-2269, COFML-10744, ZMB-26562

■ FUEGUERO ESCARLATA | *Ramphocelus bresilius* | V

Distribución: Franja costera del E de Brasil hasta Santa Catarina, mayormente por debajo de los 400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho inmaduro colectado por Gustavo Niederlein en “Pepirí Guazú, río Alto Uruguay”, Misiones el 27 de abril de 1887 (Höy [1973] *Physis. Sección C* 32: 222-223). El espécimen se encuentra depositado en el MZUC (Figura 94).

2. Un individuo observado cerca de Santo Pipó, departamento San Ignacio, Misiones el 14 de enero de 1984 (Chebez *et al.* [1984] *Hornero* 12: 221-222).

3. Un individuo observado por Hugo Chaves en Colonia Andresito, departamento General Manuel Belgrano, Misiones en el año 1989 (H. Chaves en Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros).

4. Un individuo observado por Matías Entrocassi y Sandra Chediak en el PN Iguazú, Misiones el 2 de octubre de 1992 (M. Entrocassi y S. Chediak en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

5. Un macho observado por Hernán Povedano en la reserva natural Punta Lara, partido de Ensenada, Buenos Aires en agosto de 1999. El mismo permaneció en el sitio durante algunos meses (Pagano *et al.* [2012] *en Roesler & Agostini [editores] Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara. Provincia de Buenos Aires, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°8. Aves Argentinas).

Comentarios: La posibilidad de que algunos de estos registros correspondan a ejemplares provenientes del comercio de aves ya fue analizada por otros autores. Confusiones con su congénere o con la subespecie misionera del FUEGUERO *Piranga flava saina* no pueden descartarse. Un ejemplar sin datos se encuentra exhibido en CHMO.

Especímenes (1): MZUC-110482



Figura 94. Fuegoero Escarlata *Ramphocelus bresilius*, MZUC-110482, Pepirí Guazú, Río Alto Uruguay, Misiones, 27 de abril de 1887 (Luis Pagano)

■ AFRECHERO CANELA | *Charitospiza eucosma* | V

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro de Brasil y extremo NE de Bolivia hasta los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado en el km 10 del arroyo Uruguay-i, Misiones el 7 de agosto de 1958 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 95).

2. Un macho colectado por Brian Schmidt al sur de Tafi del Valle, departamento homónimo, Tucumán el 18 de noviembre de 1996 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El espécimen se encuentra depositado en el NMNH.

Comentarios: La localización dada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) para el espécimen de Tucumán parece ser errónea según datos de la etiqueta, siendo la correcta “Tafi del Valle, 15 km S, 5 km E, 26°59'S 65°39'W, 1700m”.

Especímenes (2): MACN-Or-39140, NMNH-645526



Figura 95. Afrechero Canela *Charitospiza eucosma*, MACN-Or-39140, arroyo Uruguay-i, km 10, Misiones, 7 de agosto de 1958 (Diego Monteleone)

■ CORBATITA AMARILLO | *Sporophila nigricollis* | V

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa una extensa región del E y S de Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho adulto colectado en el km 10 del arroyo Uruguay-i, Misiones el 17 de noviembre de 1959 (Partridge [1961] *Neotrópica* 7: 25-28). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 96).

2. Una pareja observada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 5, 6 y 8 de enero de 1985 (F. Moschione en Saibene et al. [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

Especímenes (1): MACN-Or-39761



Figura 96. Corbatita Amarillo *Sporophila nigricollis*, MACN-Or-39761, arroyo Uruguay-i, km 10, Misiones, 17 de noviembre de 1959 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)

■ CACHILO DE ANTIFAZ | *Coryphaspiza melanotis* | R

Distribución: Localizado en el SE de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina; con una población disyunta en el N de Bolivia (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Una hembra colectada por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de diciembre de 1902 (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 11-267; S. Venturi en Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

2. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de septiembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

3. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de octubre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

4-5. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 18 de octubre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

6. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 8 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

7. Una hembra colectada por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 10 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *Ornitología Neotropical* 23: 467-488). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

8. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 16 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el AMNH.

9-10. Un macho y una hembra colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 23 y 24 de noviembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el AMNH.

11. Un macho colectado por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 de diciembre de 1903 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

12-13. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Mocoví, departamento General Obligado, Santa Fe en octubre de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

14-15. Dos machos colectados por Santiago Venturi - Francisco Manuel Rodríguez en Villa Ocampo, departamento General Obligado Santa Fe el 11 y 18 de noviembre de 1905 (S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño [2016] *Historia Natural. Tercera Serie* 6: 111-114). Los especímenes se encuentran depositados en el FMNH.

16. Un nido hallado por Santiago Venturi en Villa Ocampo, departamento General Obligado, Santa Fe el 26 de diciembre de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; S. Venturi en Dabbene [1910] *op. cit.*; Fandiño & Giraudo [2012] *op. cit.*). Al parecer el mismo no fue colectado.

17. Observada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 30 de diciem-

bre de 1911 (Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Este autor aporta una minuciosa descripción y medidas, lo que sugiere que habría obtenido algún ejemplar.

18. Un macho colectado por William Partridge en la estancia Rincón de las Mercedes de Colonia Garabí, departamento Santo Tomé, Corrientes el 18 de abril de 1962 (Short [1971] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 9: 282-309). El espécimen se encuentra depositado en el MACN.

19-21. Tres machos colectados por William Partridge en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes el 14 y 22 de noviembre de 1962 (Short [1971] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el MACN.

22-23. Varios individuos observados (dos colectados) por Lester Short y Richard Crossin 14 km al norte de Ituzaingó, departamento homónimo, Corrientes entre el 22 y el 26 de octubre de 1967 (Short [1971] *op. cit.*). Un macho obtenido el 22 de octubre se encuentra depositado en el AMNH, aunque el restante no fue hallado en la colección del MACN (Yolanda Davies *in litt.*).

24. Mencionada para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y probablemente Formosa (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352).

25. Un individuo observado por Samuel Narosky en San José, departamento Apóstoles, Misiones el 18 de agosto de 1986 (S. Narosky *en* Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA).

26. Incluida sin detalles para la avifauna de la provincia de Formosa (Contreras [1987] *Historia Natural* 7: 33-52), en base a la literatura previa (Short [1975] *op. cit.*; Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN; Narosky & Yzurieta [1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini).

27. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 6 de noviembre de 1996 (M. García Rams *com. pers.*).

28. Dos individuos observados en la estancia Puerto Valle, departamento Ituzaingó, Corrientes sin fecha (Giraud *et al.* [2003] *en* Álvarez [editor] *Fauna del Iberá*. EUDENE; Giraud *et al.* [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

29. Un ejemplar grabado y fotografiado por Ricardo Clark, Davis Finch y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 32 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 6 de octubre de 1997 (Giraud & Di Giacomo [2005] *en* Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas; Finch [2008] *en* López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones; R. Clark *in litt.*; Figura 97).

30. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 5 de diciembre de 1997 (M. García Rams *com. pers.*).

31. Un individuo observado por Ricardo Clark y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 32 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 10 de octubre de 1998 (Giraud & Di Giacomo [2005] *op. cit.*; R. Clark *in litt.*).

32. Registrada por Marcos García Rams en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 10 de noviembre de 1999 (M. García Rams *com. pers.*).

33. Un individuo observado y fotografiado por



Figura 97. Cachilo de Antifaz *Coryphasiza melanotis*, Caza Pava, Corrientes, 6 de octubre de 1997 (Ricardo Clark)

Ricardo Clark y un grupo de observadores en Caza Pava (ruta nacional n°14, 30 km al sur de Gobernador Virasoro), departamento Santo Tomé, Corrientes el 20 de noviembre de 1999 (Giraud & Di Giacomo [2005] *op. cit.*; R. Clark *in litt.*).

34. Un ejemplar grabado por Miguel Castelino en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 12 de enero de 2003 (Castelino [2008] en López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones).

35. Mencionada sin detalles para la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes (Krauczuk & Di Giacomo [2005] en Di Giacomo [editor] *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°5. Aves Argentinas).

36. Un supuesto inmaduro observado por Bernabé López-Lanús en la estancia María Concepción, departamento Santo Tomé, Corrientes el 25 de junio de 2009 (López-Lanús *et al.* [2013] en Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas).

Comentarios: Mariano Ordano y Andrea Bosisio ([1997] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 117: 77-79) presentan cuatro ejemplares colectados por Guillermo Martínez Achenbach en el departamento Capital, Santa Fe. Luego esos mismos aparecen como CACHILO CANELA *Donacospiza albifrons* (Ordano & Bosisio [2001] *Catálogo de aves del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina. Serie Catálogos* 7: 1-85; Fandiño & Giraud [2012] *op. cit.*). José Pereyra menciona haber colectado esta especie en Zelaya, partido de Pilar, Buenos Aires en junio de 1922 (Pereyra [1938] *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 9: 1-304). Dichos ejemplares también fueron reidentificados como *Donacospiza albifrons* (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).

Los registros del PN Mburucuyá, Corrientes necesitan confirmación (Gómez & Babarskas [1992] en Gómez *et al.* [editores] *La naturaleza de las estancias Santa María y Santa Teresa, Mburucuyá, provincia de Corrientes. Proyecto Parque Nacional Mburucuyá*. APN; Chatellenaz *et al.* [2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160). Considerada En Peligro a nivel nacional (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Especímenes (20): MACN-Or 7235a, MACN-Or-7235b, MACN-Or-7235c, MACN-Or-7235d, MACN-Or-48324, MACN-Or-48325, MACN-Or-48326, MACN-Or-48327, COFML-2198, COFML-2200, AMNH-100261, AMNH-199117, AMNH-519700, AMNH-519701, AMNH-519702, AMNH-509703 (= 519703), AMNH-519704, AMNH-519705, FMNH-56800, FMNH-56801

■ SOLDADITO GRIS | *Lophospingus griseocristatus* | R

Distribución: Andes de Bolivia y NO de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Felipe Silvestri en “Salta” en julio de 1898 (Zotta [1940] *Hornero* 7: 359-365). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 98).

2. Un individuo anillado por Carlos Gerow en Huacalera, departamento Tilcara, Jujuy en el año 1975 (C. Gerow en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

3. Dos individuos observados por Fabrice Schmitt en La Quiaca, departamento Yavi, Jujuy el 26 de octubre de 2002 (ebird.org/checklist/S47324600).

4. Un individuo observado por Luis Fernández en Abra Pampa, departamento Cochínoca, Jujuy el 1 de agosto de 2008 (ebird.org/checklist/S33581472).

5. Un individuo observado por Freddy Burgos en la sierra de Zenta, departamento Valle Grande, Ju-

juy el 29 de mayo de 2011 (Burgos [2017] XVII Reunión Argentina de Ornitología. Puerto Iguazú; ebird.org/checklist/S41475042).

6-8. Mencionada por Flavio Moschione para las siguientes localidades de la provincia de Salta: Pucará, departamento Santa Victoria; quebrada de Escoipe, departamento Chicoana e Ingeniero Maury, departamento Rosario de Lerma (F. Moschione *com. pers.*).

9. Registrada por Flavio Moschione en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; F. Moschione *com. pers.*).

10. Un individuo capturado en el Valle Encantado del PN Los Cardones, Salta en octubre de 2018 (Enrique Derlindati *in litt.*). El ejemplar no fue colectado y al parecer no existen fotografías del mismo.

Especímenes (1): MACN-Or-5425a



Figura 98. Soldadito Gris *Lophospingus griseocristatus*, MACN-Or-5425a, Salta, julio de 1898 (Diego Monteleone)

■ SAÍRA MILITAR | *Tangara cyanocephala* | V

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, incluyendo el extremo E de Paraguay y NE de Argentina hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Una hembra adulta colectada en "Misiones" el 20 de julio de 1908 (Zotta [1940] *Hornero* 7: 359-365). El espécimen se encuentra depositado en el MACN (Figura 99).

Especímenes (1): MACN-Or-5422a



Figura 99. Saíra Militar *Tangara cyanocephala*, MACN-Or-5422a, Misiones, 20 de julio de 1908 (Laura Barone, Museo Argentino de Ciencias Naturales)



TAXA NO ASIGNADOS A NIVEL DE ESPECIE

Se presentan dos casos que no pudieron ser asignados a nivel de especie. Mayores estudios permitirán en el futuro resolver la identidad de las poblaciones que habitan en la Argentina.

■ ALBATROS “TIPO CAUTA” | *Thalassarche cauta/steady*

La especie *Diomedea (Thalassarche) cauta* ha sido referida para la avifauna argentina desde hace tiempo, e incluida sin detalles por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). El consenso actual sigue los lineamientos de Robertson & Nunn ([1998] en Robertson & Gales [editores] *Albatross Biology and Conservation*. Surrey Beatty & Sons), quienes consideran a las cuatro subespecies del ALBATROS DE TASMANIA *Thalassarche cauta* como especies diferentes: *T. cauta*, *T. steady*, *T. salvini* y *T. eremita*. Algunos autores utilizan la denominación “albatros tipo cauta” para los taxa *T. cauta* y *T. steady*, ambos casi indistinguibles en el campo.

El grupo *cauta/steady* fue objeto de estudios taxonómicos basados en morfología y genética (Double *et al.* [2003] *Emu* 103: 287-294; Abbott & Double [2003] *Molecular Ecology* 12: 2747-2758; Abbott & Double [2003] *Molecular Ecology* 12: 2953-2962). Al no tener detalles sobre los antiguos registros es muy difícil asignarlos a una especie determinada, y la identificación de los ejemplares inmaduros resulta en ocasiones imposible (Howell [2006] *Birding* 38: 56-59; Howell [2009] *Neotropical Birding* 4: 19-25). Las evidencias sugieren que *T. steady* es la más habitual en el océano Atlántico sur, mientras que por el momento no existen pruebas que aseguren la presencia de *T. cauta* en aguas argentinas.

Registros: 1. Un ejemplar colectado en las islas Georgias del Sur el 16 de noviembre de 1926 (Bourne [1977] *Cormorant* 2: 7-10; Prince & Croxall [1983] *British Antarctic Survey Bulletin* 59: 15-27). El mismo había sido determinado como *T. cauta cauta* (Bourne [1977] *op. cit.*), pero actualmente no es posible asignarlo a nivel de especie (Christian Savigny *in litt.*). El espécimen se encuentra depositado en el NML (Figura 100).

2. Un individuo observado unos 225 km al este de Cape Pembroke, islas Malvinas el 16 junio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *Sea Swallow* 34: 18-28; Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

3. Un individuo observado a unos 11 km de Cape Pembroke, islas Malvinas el 26 junio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).

4. Un individuo observado unos 40 km al sudeste de Lively Island, islas Malvinas el 2 de julio de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).

5. Un individuo observado a 1,6 km de Volunteer Point, islas Malvinas el 6 de agosto de 1984 (Bourne & Curtis [1985] *op. cit.*; Woods [2017] *op. cit.*).

6. Un individuo observado unos 29 km al este de Cape Pembroke, islas Malvinas el 10 de abril de 1985 (Wolsey [1986] *Annual Report 1985*: 21-23. Falkland Island Trust).

7. Un individuo observado por M. Whitehouse cerca de las islas Georgias del Sur (52°06'S 53°01'W) el 26 de enero de 1986 (Prince & Croxall [1996] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116: 81-104).

8-12. Cinco individuos observados al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 28 de marzo de 1987 (Curtis [1988] *Sea Swallow* 37: 3-8).

13-14. Dos adultos observados unas 80 millas al sur de Falkland Sound, islas Malvinas el 27 de enero de 1992 (Curtis [1994] *Sea Swallow* 43: 19-28).

15. Un individuo observado por Germán Pugnali y un grupo de observadores frente a la costa de Necochea, Buenos Aires el 23 de abril de 1996 (ebird.org/checklist/S26662166).

16. Un inmaduro observado por Santiago Imberti frente a la bahía San Blas, Buenos Aires el 14 de marzo de 2000 (ebird.org/checklist/S27041063).

17-40. Un total de 24 individuos (la mayoría inmaduros y dos adultos *cauta/steady*) registrados cerca de las islas Malvinas entre febrero de 1998 y enero 2001. Todas las observaciones ocurrieron entre enero y mayo (White [2002] *The distribution of seabirds and marine mammals in the Falkland Islands waters*. Joint Nature Conservation Committee).

41. Un adulto observado por Tim Reid al borde del banco Burdwood el 15 de noviembre de 2001



Figura 100. Albatros "tipo cauta" *Thalassarche cauta/steady*, NML-1926.3299, Georgias del Sur, 16 de noviembre de 1926 (World Museum)

(Henry & Reid [2002] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 2: 17-18).

42. Un inmaduro observado por Tim Reid al sudeste de Beauchêne Island, islas Malvinas el 10 de abril de 2002 (Black et al. [2003] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 3: 17-18).

43. Un individuo observado por Joe Hanfman, Butch Pierce y Charlie Mayhood en el canal de Beagle, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 2 de febrero de 2003 (ebird.org/checklist/S3660585).

44. Un individuo observado por Carl Ball frente a la costa de Buenos Aires el 24 de enero de 2008 (ebird.org/checklist/S4106889).

- 45-62. Un total de 18 inmaduros observados (algunos fotografiados) por Manuel Marín aproximadamente a los 41°02'S 57°03'W el 8 de marzo de 2008 (Marín [2011] *Notornis* 58: 101-103).
63. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Federico Schulz frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires en febrero de 2008 (F. Schulz en Savigny & Carbajal [2015] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 180: 1-9).
- 64-84. Un total de 20 inmaduros y un adulto observados en la zona de los 39°S 56°W y 41°S 57°W entre el 5 y el 19 de mayo de 2008 (Seco Pon & Tamini [2013] *Revista Brasileira de Ornitologia* 21: 263-268). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
85. Registrada por Carlos Agulián y otros observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 17 de julio de 2009 (ebird.org/checklist/S66941342).
86. Mencionada como de presencia ocasional en la costa de San Antonio Oeste, departamento San Antonio, Río Negro entre los años 1986 y 2010 (Llanos *et al.* [2011] *Check List* 7: 782-797).
87. Un inmaduro observado por Manuel Marín a los 40°30'S 56°58'W el 10 de marzo de 2010 (Marín [2011] *op. cit.*).
- 88-101. Un total de 13 adultos y un inmaduro observados en la zona de los 41°S 57°W y 44°S 60°W entre el 19 y el 27 de mayo de 2010 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
- 102-112. Un total de 10 inmaduros y un adulto observados en la zona de los 39°S 55°W y 40°S 57°W entre el 1 y el 13 de junio de 2010 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
- 113-115. Un adulto y dos inmaduros observados en la zona de los 41°S 60°W y 42°S 59°W entre el 24 y el 29 de noviembre de 2011 (Seco Pon & Tamini [2013] *op. cit.*). Estos autores presentan tres fotografías de adultos que requieren confirmación.
116. Un adulto fotografiado por Christian Savigny unas 150 millas al noreste de Mar del Plata, Buenos Aires el 3 de abril de 2013 (Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*).
117. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Diego Monteleone, Ulises Ornstein, Luis Pagano y un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*; ebird.org/checklist/S17192051).
118. Un ejemplar inmaduro fotografiado por Diego Monteleone y un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 10 de julio de 2016 (ebird.org/checklist/S30643700).
- 119-123. Unos cinco ejemplares inmaduros fotografiados por un grupo de observadores frente a la costa de Mar del Plata, Buenos Aires el 26 y 27 de noviembre de 2016 (ebird.org/checklist/S65116105; ebird.org/checklist/S40202842).

Comentarios: La primera mención para Argentina corresponde a un ejemplar colectado por el vapor *Undine* a los 35°44'S 53°W el 6 de septiembre de 1926, y nombrado como *Diomedella cauta platei* (Dabbene [1926] *Hornero* 3: 311-348). El mismo fue utilizado por Gregory Mathews para crear el taxón *Diomedella cauta atlantica*, luego sinónimo de *Diomedea cauta salvini* (Mathews [1933] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 53: 213-214; Murphy [1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 1. American Museum of Natural History). Este espécimen (MACN-Or-1151a) posteriormente fue reidentificado por Christopher Robertson como *Diomedea cauta cauta* (Navas & Camperi [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nueva Serie* 1: 109-113), aunque el sitio de captura en realidad pertenece al territorio uruguayo (Mark Pearman en Savigny & Carbajal [2015] *op. cit.*).

Especímenes (1): NML-1926.3299

■ CARPINTERITO | *Picumnus* sp.

El CARPINTERITO OCELADO *Picumnus dorbignyanus* fue descrito por Frédéric de Lafresnaye ([1845] *Revue Zoologique* 8: 1-10) en base a un espécimen de Bolivia sin localidad precisa. La especie fue mencionada para la avifauna argentina durante mucho tiempo, e incluida sin detalles por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Los reportes históricos y modernos la refieren tanto para los bosques montanos como para los bosques del pedemonte en el extremo noroeste del país, donde vive en simpatria con la subespecie local del CARPINTERITO BARRADO *Picumnus cirratus thamnophiloides*. Esta última posee un diseño intermedio entre *P. cirratus pilcomayensis* y *P. dorbignyanus*, y no se descarta que exista cierto grado de hibridación (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352).

Este complejo escenario genera cierta confusión al momento de identificar los *Picumnus* de la región noroeste, tanto en el campo como estudiando especímenes de museo (ver Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 15: 5-18; Olrog [1958] *Acta Zoológica Lilloana* 16: 83-90; Camperi [1990] *Hornero* 13: 147-153). Se necesitan estudios detallados para entender la real situación de los fenotipos escamados y barrados. Por todo esto, y a pesar de existir numerosas publicaciones, todavía es discutible la presencia de *P. dorbignyanus* en Argentina. Incluso se ha sugerido la existencia de especímenes del CARPINTERITO ESCAMADO *Picumnus albosquamatus* en la provincia de Salta (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). En este trabajo preferimos tratar los registros como “no confirmados”, hasta que nuevas evidencias permitan asignarlos en forma certera a un taxón determinado.

Registros: 1. Una hembra colectada por Henry Durnford en “Salta” el 13 de junio de 1878 (Salvin [1880] *Ibis* 22: 351-366; Hargitt [1890] *Catalogue of the Birds in the British Museum*. Volume 18. London; Dabbene



Figura 101. Carpinterito *Picumnus* sp. De izquierda a derecha: NHMUK-85.11.20.251, Salta, 27 de junio de 1878. NHMUK 85.11.20.353, Salta, 27 de junio de 1878. NHMUK-85.11.20.251, Salta, 13 de junio de 1878 (The Natural History Museum)