

[1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513). El espécimen se encuentra depositado en el NHMUK (Figura 101).

2-3. Dos hembras colectadas por Henry Durnford en “Salta” el 27 de junio de 1878 (Salvin [1880] *op. cit.*; Hargitt [1890] *op. cit.*; Dabbene [1910] *op. cit.*). Los especímenes se encuentran depositados en el NHMUK (Figura 101).

4. Un macho colectado por Alfredo Borelli en San Lorenzo (actualmente Calilegua), Jujuy en el año 1896 (Salvadori [1897] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 12 [292]: 1-36; Dabbene [1910] *op. cit.*). El espécimen se encuentra depositado en el MZUT (Figura 102).

5. Una hembra colectada por Joseph Steinbach en el río San Francisco, Jujuy el 23 de julio de 1905 (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). El espécimen no pudo ser localizado.

6. Un macho adulto colectado por Luis Dinelli en “Jujuy” el 29 julio de 1906 (Hartert & Venturi [1909] *op. cit.*; Laubmann [1930] *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Vogel*. Strecker & Schröder; Pergolani de Costa [1940] *Homero* 7: 382-395). El espécimen se encuentra depositado en el ZSM (Figura 103).

7. Una hembra colectada por Juan Esteban, Claës Olrog y Octavio Budin en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 11 de diciembre de 1950. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

8. Un macho colectado por Francisco Contino en Yuto, departamento Ledesma, Jujuy el 12 de octubre de 1955. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

9. Una hembra colectada por Claës Olrog en San Francisco, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 agosto de 1956. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

10. Una hembra colectada por Ángel Contino en “Inuya, Salta” el 15 de octubre de 1987. La altitud mencionada en la etiqueta (800 msnm) deja dudas con respecto al origen del ejemplar. El espécimen se encuentra depositado en el WFVZ.



Figura 102. Carpinterito *Picumnus* sp., MZUT-Av-14012, San Lorenzo, Jujuy, año 1896 (Luca Ghiraldi, Museo Regionale di Scienze Naturali)



Figura 103. Carpinterito *Picumnus* sp., ZSM-08.605, Jujuy, 29 julio de 1906 (Markus Unsöld, Zoologische Staatssammlung)

11. Incluida en la avifauna del PN El Rey, Salta (Chalukian [1989] *Relevamiento ecológico del Parque Nacional El Rey: Fauna*. APN).
12. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en la seccional Caimancito del PN Calilegua, Jujuy entre el 14 y el 19 de julio de 1991 (Blendinguer [1998] *Nuestras Aves* 38: 5-8).
13. Un individuo observado por Pedro Blendinguer en la seccional Aguas Negras del PN Calilegua, Jujuy entre el 19 y el 22 de julio de 1991 (Blendinguer [1998] *op. cit.*).
- 14-15. Dos machos capturados por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo *et al.* [1997] *Hornero* 14: 264-266; Salvador & Di Giacomo [2014] *Historia Natural. Tercera Serie* 4: 63-88). Los ejemplares no fueron colectados (A. Di Giacomo *in litt.*).
16. Mencionada por Mercedes Rougès para el PN El Rey, Salta (Rougès [1997] *Dinámica de las comunidades de aves en el gradiente altitudinal de las selvas de montaña del Parque Nacional El Rey*. APN).
17. Una pareja observada en la finca San Andrés, departamento Orán, Salta el 3 de noviembre de 1997 (Chani *et al.* [2002] *Nuestras Aves* 43: 13).
18. Una hembra con pichones observada en la finca San Andrés, departamento Orán, Salta el 21 de abril de 1998 (Chani *et al.* [2002] *op. cit.*).
- 19-20. Al menos dos ejemplares grabados por Niels Krabbe en el PN Calilegua, Jujuy el 4 y 6 de febrero de 2000 (Krabbe *et al.* [2001] *Sonidos de aves de Calilegua*. LOLA).
21. Un individuo observado por Oscar Braslavsky y Gisela Müller en el PN Calilegua, Jujuy el 19 de septiembre de 2003 (sib.gob.ar).
22. Una hembra colectada por personal del Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina

(PIDBA) unos 40 km al noroeste del cruce de la ruta nacional n°50 y la ruta provincial n°18 (camino a San Andrés), departamento Orán, Salta el 12 de enero de 2004. El espécimen se encuentra depositado en la COFML.

23. Registrada por Pedro Blendinguer en la RN El Nogalar, Salta entre enero y marzo de 2005 (Blendinguer [2005] *Dinámica del reclutamiento de Pino del Cerro* [Podocarpus parlatorei]: bases ecológicas para su manejo en bosques de montaña del noroeste argentino. APN).

24. Incluida sin detalles para la avifauna de la RP Las Lancitas, Jujuy (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires).

25. Un individuo observado por Guillermo Gil en el PN Baritú, Salta el 28 de octubre de 2006 (sib.gob.ar).

26-28. Tres individuos capturados en zona de selva pedemontana (23°57'40"S 64°53'3"W), departamento Ledesma, Jujuy en enero de 2006 y febrero de 2007 (Miranda *et al.* [2010] *Ornitología Neotropical* 21: 323-337). Al parecer no se obtuvieron especímenes ni fotografías.

29-30. Dos ejemplares grabados por Peter Boesman en el PN Calilegua, Jujuy el 19 y 20 de octubre de 2013 (xeno-canto.org/272970; xeno-canto.org/272971).

Comentarios: Claës Olrog ([1958] *op. cit.*) presenta los diseños básicos de las plumas pectorales de *Picumnus (cirratus) jelskii*, *Picumnus cirratus* y *Picumnus dorbignyanus*. Este autor comenta la presencia de *P. dorbignyanus* en las provincias de Jujuy y Salta, aunque sospecha que dichas menciones pueden ser erróneas y en realidad corresponder a *P. (cirratus) jelskii*.

Tres especímenes colectados por Gunnar Höy pertenecen a *Picumnus cirratus thamnophiloides*: un macho proveniente de Aguaray, departamento General José de San Martín, Salta en septiembre de 1955 (FMNH-258632); una hembra colectada en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta en julio de 1957 (FMNH-258634) y un ejemplar obtenido en San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta el 16 de junio de 1977 (MACN-Or-54587).

El espécimen MZUT-Av-14012 fue reidentificado por Tommaso Salvadori como *Picumnus cirratus* (Luca Ghiraldi *in litt.*). A pesar de figurar en informes internos del PN El Rey, Salta la especie no fue incluida en el inventario de dicha área protegida (Babarskas *et al.* [1995] *Inventario de Aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina*. LOLA).

Especímenes asignados a *Picumnus dorbignyanus* (13): MACN-Or-54587, COFML-6788, COFML-10051, COFML-10402, COFML-17653, FMNH-258632, FMNH-258634, MZUT-Av-14012, NHMUK-85.11.20.251, NHMUK-85.11.20.352, NHMUK 85.11.20.353, WFFVZ-43733, ZSM-08.605





POSIBLES CAMBIOS TAXONÓMICOS

Los siguientes taxa han sido sugeridos como especies válidas por algunos autores, en cuyo caso representarían una adición a la avifauna local. Por el momento preferimos mantenerlas en la categoría de subespecie, a la espera de trabajos que confirmen en forma definitiva su estatus taxonómico.

■ SURI | *Rhea (pennata) tarapacensis*

Distribución: Andes desde el S de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina, entre los 3500-4500 msnm (Folch [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descrita por Charles Chubb ([1913] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 33: 79-81) en base a material colectado en Canchosa, Tarapacá, Chile. Considerada por mucho tiempo como la forma altoandina del CHOIQUE *Rhea pennata*, ambos tradicionalmente en el género *Pterocnemia*. Cuestiones relacionadas al número de escutelaciones tarsales, morfología y ecología justifican su tratamiento como especies distintas (Fjeldså & Krabbe [1990] *Birds of the High Andes*. University of Copenhagen; Jaramillo [2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press).

Comentarios: Roberto Dabbene ([1911] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 21: 293-307) fue el primero en sospechar la presencia de este taxón en territorio argentino. Esto fue confirmado mediante un ejemplar obtenido por Johan Mogensen en Pasto Ventura, cerro Nevado, Catamarca (Dabbene [1919] *Hornero* 1: 259-266; Mogensen [1930] *Argentinas dyr*. Graebes Bogtrykkeri).

■ PATO INCA | *Anas (flavirostris) oxyptera*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el NO de Argentina (Carboneras [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descrita por Franz Meyen ([1834] *Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher* 8: 59-124) con material proveniente del sur de Perú. Tradicionalmente considerada una subespecie del PATO BARCINO *Anas flavirostris*. Estudios moleculares recientes sugieren la validez del taxón *oxyptera* como especie plena (Graham *et al.* [2017] *Genome Biology and Evolution* 10: 14-32). Para una descripción y comparación entre ambos taxa, ver Jaramillo ([2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Comentarios: Las primeras menciones locales de la población *oxyptera* fueron publicadas por Tommaso Salvadori ([1897] *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 12 [292]: 1-36), Einar Lönnberg ([1903] *Ibis* 45: 441-471) y Carlos Bruch ([1904] *Revista del Museo de La Plata* 11: 247-259).

■ PAÍÑO FUEGUINO | *Oceanites (oceanicus) chilensis*

Distribución: Se reproduce en la región del cabo de Hornos, Chile y luego se dispersa hacia la corriente de Humboldt (Drucker *et al.* [2020] en Billerman [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Taxonomía: Nombre originalmente utilizado por Wilfred Alexander ([1928] *Birds of the Ocean*. New York) para las aves que nidifican cerca del cabo de Hornos, Chile aunque sin mayores detalles. Posteriormente Robert Murphy ([1936] *Oceanic birds of South America*. Vol. 2. American Museum of Natural History) lo describe formalmente con material proveniente de la isla Wollaston, Chile. Por el momento se lo considera una subespecie del PAÍÑO DE WILSON *Oceanites oceanicus*. Si bien se requieren mayores estudios, este taxón bien podría representar una especie válida (Howell & Zufelt [2019] *Oceanic Birds of the World*. Princeton University Press; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Comentarios: Las leves diferencias de plumaje con respecto a otras subespecies del PAÍÑO DE WI-

LSON *Oceanites oceanicus* lo convierten en un taxón críptico que pasa desapercibido para la mayoría de los observadores. Al parecer es relativamente frecuente en aguas al sur y al este de Tierra del Fuego (ebird.org). Para una discusión sobre la confusa historia taxonómica de la subespecie *chilensis* ver Palma *et al.* ([2012] *Notornis* 59: 74-78; [2012] *Notornis* 59: 187-188).

■ CARPINTERO BATARAZ BOLIVIANO | *Dryobates (lignarius) puncticeps*

Distribución: Restringida al centro y S de Bolivia y extremo NO de Argentina (Winkler *et al.* [2020] en del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Taxonomía: Actualmente representa una población aislada del CARPINTERO BATARAZ GRANDE *Dryobates lignarius*. Las diferencias genéticas, morfológicas y vocales podrían justificar su tratamiento como especies separadas, en cuyo caso el nombre *puncticeps* estaría disponible (Winkler *et al.* [2020] *op. cit.*; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides; Areta, Pearman & Burgos *en prep.*).

Comentarios: El primer registro en territorio nacional corresponde a un individuo observado por Juan Mazar Barnett, Germán Pugnali y Marco della Seta cerca de Santa Victoria Oeste, departamento Santa Victoria, Salta el 27 de septiembre de 1997 (Mazar Barnett *et al.* [1998] *Cotinga* 9: 64-75). Actualmente se la considera muy rara y localizada en el noroeste argentino, con unas pocas observaciones en dicha localidad.

■ ATAJACAMINOS ÑAÑARCA | *Systellura (longirostris) atripunctata*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina (Cleere [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descripta por Frank Chapman ([1923] *American Museum Novitates* 67: 1-12) en base a material colectado en Acobamba, Junín, Perú. Tradicionalmente considerada una subespecie de *Systellura longirostris*, aunque las vocalizaciones son lo suficientemente diagnósticas como para ser consideradas especies distintas (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides). Nuevas investigaciones a escala regional permitirán resolver las relaciones taxonómicas entre las diversas subespecies del complejo (Areta *et al.* *en prep.*).

Comentarios: Relativamente frecuente en las serranías de la región noroeste. Algunas de sus menciones más antiguas la refieren para Tucumán (Lillo [1902] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*. Serie 3. Tomo 1: 169-221), Catamarca (Fontana [1908] *Enumeración sistemática de las aves de la región andina*. Escuela Nacional de Industrias Químicas de San Juan) y Jujuy (Budin [1931] *Hornero* 4: 401-411).

■ CARPINTERO REAL | *Colaptes (melanochloros) melanolaimus*

Distribución: Las subespecies *nigroviridis* y *leucofrenatus* en casi toda la mitad norte de Argentina hasta Neuquén y Río Negro, excepto Misiones (del Hoyo *et al.* [2020] en del Hoyo *et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Taxonomía: El CARPINTERO REAL *Colaptes melanochloros* está conformado por dos grupos taxonómicos cuyo estatus fue discutido en varias ocasiones (Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261; Steullet &

Deautier [1935-1946] *Obra del Centenario del Museo de La Plata* 1: 1-1006; Zotta [1938] *Hornero* 7: 89-124). El grupo *melanolaimus* ocupa la mitad norte de Argentina, mientras que *melanochloros* se restringe a la provincia de Misiones y extremo norte de Corrientes. En la mayoría de los trabajos aparecen como especies diferentes, aunque la existencia de una zona de intergradación motivó a tratarlas como una única especie (Short [1971] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 9: 282-309; Short [1972] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 149: 1-109).

Comentarios: Las diferencias vocales, ecológicas y morfológicas hacen suponer nuevamente a algunos investigadores que *Colaptes melanochloros* y *Colaptes melanolaimus* deberían ser tratadas como especies distintas (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

■ CAMINERA TRINADORA | *Geositta (rufipennis) fasciata*

Distribución: Andes centrales arriba de los 2400 msnm y el O de Patagonia hasta Santa Cruz (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Taxonomía: En nuestro país la CAMINERA COLORADA *Geositta rufipennis* comprende dos grupos taxonómicos que seguramente merezcan el estatus de especie. El grupo *rufipennis* habita la cordillera de los Andes desde Jujuy hasta Mendoza, y las sierras subandinas de Córdoba y San Luis. El grupo *fasciata* se distribuye desde Mendoza occidental hasta Santa Cruz (Pearman & Areta [2020] *op. cit.*; Areta, Pearman & Jaramillo *en prep.*). Para mayores detalles, descripciones e ilustraciones ver Pearman & Areta ([2020] *op. cit.*).

Comentarios: Ambas poblaciones se conocen desde hace tiempo en territorio argentino (Zotta [1938] *Hornero* 7: 89-124).

■ REMOLINERA FUEGUINA | *Cinclodes (antarcticus) maculirostris*

Distribución: Localizada en costas marinas del extremo S de Chile y Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por Roberto Dabbene en base a un ejemplar proveniente de la isla Hermite, cabo de Hornos, Chile (Dabbene [1917] *Physis* 3: 58-59). Ampliamente tratada como una subespecie de la REMOLINERA NEGRA *Cinclodes antarcticus*. BirdLife International considera la forma *maculirostris* como especie válida (datazone.birdlife.org), aunque estudios moleculares recientes no hallaron diferencias significativas entre ambas poblaciones (Campagna *et al.* [2012] *Biological Journal of the Linnean Society* 106: 865-879).

Comentarios: La primera mención para Argentina corresponde a una pareja colectada por Juan Daguerre y Alberto Carcelles en la isla de Año Nuevo, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego el 2 de febrero de 1935 (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64).

■ COLUDITO DEL ALTIPLANO | *Leptasthenura (aegithaloides) berlepschi*

Distribución: Andes del S de Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina hasta los 4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Taxón descripto por Ernst Hartert en base a un macho colectado en Augusto Pericheli,

Jujuy y otros especímenes provenientes de Jujuy, Salta y Tucumán (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Tradicionalmente considerada una subespecie del COLUDITO COLA NEGRA *Leptasthenura aegithaloides*. BirdLife International propone que la forma *berlepschi* sea reconocida como especie válida (datazone.birdlife.org).

Comentarios: La localidad de Augusto Pericheli fue señalada como “Angosta Perchela” por Raymond Paynter ([1995] *Ornithological Gazetteer of Argentina*. Museum of Comparative Zoology. Harvard University), aunque muy probablemente se refiera al Angosto del Perchel (= Villa El Perchel), departamento Tilcara, Jujuy. Para mayores detalles y descripciones ver Jaramillo ([2003] *Birds of Chile*. Princeton University Press) y Pearman & Areta ([2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

■ CACHIRLA PUNEÑA | *Anthus (furcatus) brevirostris*

Distribución: Andes en el centro y S de Perú, Bolivia y NO de Argentina hasta los 4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descripta por Wladyslaw Taczanowski ([1874] *Proceedings of the Zoological Society of London* 1874: 501-565) con material proveniente de Junín, Perú. Largamente considerada una subespecie de la CACHIRLA UÑA CORTA *Anthus furcatus*. La divergencia molecular y sus particulares vocalizaciones sugieren firmemente que el taxón *brevirostris* sea reconocido como especie válida (Van Els & Norambuena [2018] *Ibis* 160: 158-172; Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Comentarios: El primer registro para Argentina corresponde a dos ejemplares colectados por Octavio Budin en Abra Pampa, departamento Cochinoca, Jujuy el 16 de febrero de 1958 (Olrog [1959] *Acta Zoológica Lilloana* 17: 421-428).

■ LOICA SERRANA | *Leistes (loyca) obscurus*

Distribución: Endémica de los pastizales altoserranos en las provincias de Córdoba y San Luis (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Taxonomía: Descripta por Manuel Nores y Darío Yzurieta ([1979] *Academia Nacional de Ciencias. Misceláneas* 61: 4-8) con material proveniente de Pampa de Achala, Córdoba. Actualmente considerada una subespecie de la LOICA *Leistes loyca*. Nuevas investigaciones sugieren que la población serrana debería ser tratada como especie distinta (Pearman & Areta [2020] *op. cit.*; Pearman, Areta & Fraga *en prep.*).

Comentarios: Especie frecuente en la zona altoserrana de Córdoba y San Luis, con antiguas menciones en la literatura ornitológica (Stempelmann & Schulz [1890] *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias* 10: 393-409; Frenzel [1891] *Journal für Ornithologie* 39: 113-126; Laubmann [1930] *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Vogel*. Strecker & Schröder; Castellanos [1934] *Hornero* 5: 307-338).



Totanus glottis.
Cat. 47. 62 Rio de la Plata.
1860. Amérique.

ESPECIES HIPOTÉTICAS

Las siguientes 72 especies se han reportado para la avifauna argentina sin las pruebas necesarias que confirmen su presencia en el país. Es indispensable que dichas observaciones sean sustentadas por grabaciones de audio, videos, fotografías o especímenes. Por el momento quedan excluidas del listado nacional hasta que se presente dicha documentación. Para otras especies erróneamente reportadas en la literatura ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ PATO CASTAÑO | *Netta erythrophthalma*

Distribución: La subespecie nominal con distribución en parches desde Venezuela hasta el NO de Argentina y E de Brasil. La subespecie *brunnea* en el E y S de África (Carboneras [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Dos machos y dos hembras observados por Claës Olrog en la laguna Runtuyoc, departamento Cochínoca, Jujuy el 2 de junio de 1949 (Olrog [1949] *Acta Zoológica Lilloana* 7: 209-217).

2-3. Observada por Rodolfo Miatello en la laguna Los Nacimientos y en el río Cazadero Grande, Catamarca en el año 1978 (R. Miatello en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

4. Tres individuos observados por Alberto Seufferheld y Dionisio Mamaní en la laguna Larga, departamento Rinconada, Jujuy el 23 de febrero de 1994 (A. Seufferheld y D. Mamaní en Chebez *et al.* [1998] *Las Aves de los Parques Nacionales*. LOLA).

5. Dos machos observados en el PN El Rey, Salta el 11 de enero de 1998 (Serra *et al.* [1999] *Nuestras Aves* 40: 20).

6. Un macho observado en Jerónimo Cortés, departamento San Justo, Córdoba el 11 de febrero de 1998 (Michelutti & Torres [2006] *Nuestras Aves* 51: 32-34).

7-8. Un macho observado en cercanías de Miramar, departamento San Justo, Córdoba el 28 de marzo de 1998; y otro en la misma localidad 11 de noviembre de 1999 (Michelutti & Torres [2006] *op. cit.*).

9. Un macho y dos hembras observados en la laguna de Pusseto, departamento San Justo, Córdoba el 25 de julio de 2002 (Michelutti & Torres [2006] *op. cit.*).

10. Un total de nueve individuos reportados sin detalles en un censo realizado en el año 2004 (Nores & Serra [2005] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2004*. Wetlands International). Al parecer estas aves fueron registradas entre San Salvador de Jujuy, departamento Capital, Jujuy y Yacuiba, Bolivia en el año 2003 (Serra [2010] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2005*. Wetlands International).

11. Nueve individuos observados por Ada Echevarría, José María Chani, Claudia Marano y María Cocimano en el embalse El Cadillal, departamento Tafí Viejo, Tucumán el 6 de febrero de 2005 (Serra [2006] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2005*. Wetlands International).

12. Un macho adulto observado por Carlos Agulíán en la laguna Runtuyoc, departamento Cochínoca, Jujuy el 7 de marzo de 2005 (ebird.org/checklist/S16279142).

13. Un “grupito” observado en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy en julio de 2005 (Freddy Burgos en Chebez [2008] *Los que se van*. Tomo 2. Albatros).

14. Nueve individuos observados por Pablo y Matías Michelutti en la isla El Mistolar de la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 14 de febrero de 2008 (Serra [2009] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2008*. Wetlands International).

15. Cuatro individuos observados por Francisco Cornell en Abra Pampa, departamento Cochínoca, Jujuy el 13 de abril de 2008 (ebird.org/checklist/S11453535).

16. Un macho adulto observado por Daniel Almirón en Abra Pampa, departamento Cochínoca, Jujuy el 27 de enero de 2009 (ebird.org/checklist/S16437380).

17-18. Cuatro individuos observados por Pablo y Matías Michelutti en la laguna del Plata, departamentos San Justo y Río Primero, Córdoba; y otros cinco en los bañados del río Dulce, departamento Tulumba, Córdoba el 10 de julio de 2009 (Serra [2010] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2009*. Wetlands International).

19. Ocho individuos reportados sin detalles en el censo de aves acuáticas de julio de 2011 (Rabuffetti [2012] *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2011*. Wetlands International).

20. Un macho observado por Sergio Salvador a la vera de la ruta nacional n°60 cerca de Cortaderas, departamento Tinogasta, Catamarca el 15 de diciembre de 2015 (S. Salvador *com. pers.*).

Comentarios: Había sido incluida por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Chebez *et al.* ([1998]

op. cit.) mencionan que esta especie ha sido confirmada por Jorge Cajal para la RP San Guillermo, San Juan a través de una comunicación personal de Eduardo Haene. Llamativamente Haene *et al.* ([2001] *Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción* 72: 59-67) no la incluyen en el listado de esa área protegida.

Un registro de 22 individuos en la laguna Melincué, departamento General López, Santa Fe el 24 de febrero de 1996 requiere confirmación (Wetlands International [2015] *Waterbird Population Estimates*, 5th edition. Wetlands International). Freile *et al.* ([2016] *Wildfowl* 66: 3-21) reportan cuatro individuos en San Salvador de Jujuy en julio de 2009 que no pudimos hallar en la literatura. Con numerosos registros modernos, es llamativa la ausencia de documentación obligando a mantener a la especie como hipotética para la avifauna argentina.

■ PAVA DE MONTE ANDINA | *Penelope montagnii*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia. La subespecie *sclateri* endémica de las yungas de Bolivia (del Hoyo [1994] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 2. Lynx Edicions).

Registros: 1-2. Dos grupos observados por Flavio Moschione entre Casas Viejas y el río Trigohuaico, departamento Santa Victoria, Salta el 29 de julio de 1992 (F. Moschione en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

Comentarios: Mencionada previamente en base a dos ejemplares colectados por José María Gómez en Los Toldos, departamento Santa Victoria, Salta el 2 y 3 de febrero de 1960 (Olrog [1960] *Neotrópica* 6: 58-59). Estudios posteriores demostraron que pertenecían a la PAVA DE MONTE ALISERA *Penelope dabbeni* (Canevari & Caziani [1988] *II International Cracid Symposium*. Caracas).

■ PALOMA PLOMIZA | *Patagioenas plumbea*

Distribución: En la región del Chocó al NO de Sudamérica, la Amazonía y el SE de Brasil (Gibbs *et al.* [2010] *Pigeons and doves: a guide to the pigeons and doves of the world*. Christopher Helm).

Registros: 1. Mencionada con dudas para la provincia de Misiones (Zotta [1937] *Hornero* 6: 531-554; Olrog [1963] *Opera Lilloana* 9: 1-377).

2. Un ejemplar fotografiado por Jake Manson, Mark Pearman y Marcelo Zambrano en el PP Moconá, Misiones el 29 de octubre de 2003 (Pearman *et al.* [2011] *Nuestras Aves* 56: 7-9). La fotografía se encuentra depositada en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP, aunque la calidad de la misma no permite identificarla con certeza.

3. Un ejemplar grabado por Federico Schulz en el PP Moconá, Misiones en mayo de 2004 (Schulz [2008] en López-Lanús [editor] *Sonidos de Aves del Cono Sur*. Audiornis Producciones). La grabación es demasiado breve y apenas audible, bien podría tratarse de cualquier otra especie del género.

4. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en el PP Cruce Caballero, Misiones el 12 de mayo de 2009 (Bodrati *et al.* [2010] *Cotinga* 32: 41-64; Pearman *et al.* [2011] *op. cit.*).

5. Un individuo escuchado por Bernabé López-Lanús en el PP Moconá, Misiones en diciembre de 2012 (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Arnaldo de Winkelried Bertoni menciona la captura de dos ejemplares en Puerto Bertoni, Alto Paraná, Paraguay en julio de 1917 y julio de 1918 (Bertoni [1919] *Hornero* 1: 255-

259). Estos registros limítrofes quizás hayan motivado los primeros comentarios referidos a la provincia de Misiones (Zotta [1937] *op. cit.*; Olrog [1963] *op. cit.*).

■ PINGÜINO OJO AMARILLO | *Megadyptes antipodes*

Distribución: Se reproduce en la isla sur de Nueva Zelanda, en la isla Stewart y en las islas subantárticas Auckland y Campbell (Seddon *et al.* [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Mencionada como errante para las islas Malvinas, sin más detalles (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).

Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ PINGÜINO DEL PACÍFICO | *Spheniscus humboldti*

Distribución: Nidifica en la costa sudamericana del océano Pacífico, desde el centro de Perú al S de Chile (De la Puente *et al.* [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Referida para la isla de Año Nuevo, departamento Ushuaia, Tierra del Fuego de donde Santiago Venturi mencionó huevos blancos cuyas medidas fueron de 72 x 61 mm (Hartert & Venturi [1909] *Novitates Zoologicae* 16: 159-267). Esta cita fue repetida en trabajos posteriores (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1913] *Physis* 1: 241-261).

2. Un ejemplar empetrolado recuperado en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires sin fecha (Canevari *et al.* [1991] *Nueva guía de las Aves Argentinas*. Fundación Acindar). Al parecer existiría una fotografía del mismo (Jorge Rodríguez Mata en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), pero no se encuentra disponible.

Comentarios: Roberto Dabbene ([1910] *op. cit.*; [1914] *op. cit.*) también la menciona para la provincia de Tierra del Fuego. Este dato quizás provenga de Herman Schallow



Figura 104. Pingüino Patagónico *Spheniscus magellanicus*, MAS-Or-4789, Punta Quilla, Santa Cruz, 7 de febrero de 1979 (Diego Monteleone).

([1898] *Zoologische Jahrbücher*. Supplement 4. Band 3: 641-748), quien comenta que un huevo de esta especie fue colectado en dicha localidad. Luego Charles Hellmayr descarta esta información asegurando que pertenece al PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* (Hellmayr [1932] *Field Museum of Natural History*. *Zoological Series* 19: 1-472).

Un ejemplar colectado por Leonardo Díaz en Punta Quilla, departamento Corpen Aike, Santa Cruz el 7 de febrero de 1979 (Bosisio [2003] *Memorias* 11: 1-54). Este espécimen (MAS-Or-4789) fue revisado por Christian Savigny, concluyendo que en realidad se trata de un juvenil de PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* (C. Savigny en López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audior-nis Producciones; Figura 104).

■ PINGÜINO DEL CABO | *Spheniscus demersus*

Distribución: Se reproduce exclusivamente en las costas de Namibia y Sudáfrica (Crawford *et al.* [2013] en Borboroglu & Boersma [editores] *Penguins: natural history and conservation*. University of Washington Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en Punta Tombo, departamento Florentino Ameghino, Chubut el 27 de diciembre de 1986 (Rumboll [1990] *Nuestras Aves* 22: 28). El mismo fue fotografiado, pero lamentablemente la imagen no se encuentra disponible.

Comentarios: Un ejemplar de PINGÜINO PATAGÓNICO *Spheniscus magellanicus* con las características de *S. demersus* fue hallado en Punta Tombo, Chubut (John Hornbuckle en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ ALBATROS DE CAMPBELL | *Thalassarche impavida*

Distribución: Restringida a la isla Campbell al S de Nueva Zelanda (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University).

Registros: 1. Un individuo observado por Santiago Imberti en Cabo Vírgenes, departamento Güer Aike, Santa Cruz el 18 de diciembre de 2002 (ebird.org/checklist/S24575818).

Taxonomía: Considerada tradicionalmente una subespecie del ALBATROS CEJA NEGRA *Thalassarche melanophrys*. Recientes trabajos moleculares sugieren que ambos taxa difieren lo suficiente como para considerarlas especies distintas (Shirihai & Jarret [2002] *The complete guide to Antarctic wildlife*. Princeton University Press).

Comentarios: Un ALBATROS REAL DEL SUR *Diomedea epomophora* anillado en la isla Campbell fue recuperado en la península Valdés, departamento Biedma, Chubut el 2 de junio de 1969 (Daciuk [1972] *Neotrópica* 18: 40-44). Esto demuestra que aves de esta isla eventualmente llegan a las costas argentinas.

■ PETREL BRASILEIRO (Petrel de Trinidad) | *Pterodroma arminjoniana*

Distribución: Se reproduce en las islas Trindade y Martín Vaz del océano Atlántico sur, y en la isla Round en el océano Índico (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo observado por William Curtis unos 350 km al sudeste de las islas Malvinas (54°01'S 54°46'W) el 12 de octubre de 1994 (Bourne & Curtis [1997] *The Warrah. Falklands Conservation* 12: 7-9).

2. Un individuo observado por Christian Savigny en el golfo San Matías, Río Negro el 21 de julio de 2003 (Savigny *et al.* [2005] *Hornero* 20: 183-186).

3. Un individuo observado por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (52°38'S 48°25'W) el 13 de marzo de 2005 (Luigi *et al.* [2009] en Mohr *et al.* [editores] *Ilhas Oceânicas Brasileiras: da pesquisa ao manejo. Volume II.* Ministerio do Meio Ambiente).

4. Dos individuos de morfo claro observados por Santiago Imberti entre las islas Malvinas y Georgias del Sur (52°16'S 51°58'W) el 14 de marzo de 2005 (Luigi *et al.* [2009] *op. cit.*).

Taxonomía: La población que cría en el océano Pacífico conocida como PETREL HERÁLDICO *Pterodroma heraldica*, actualmente se la considera una especie distinta (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).

Comentarios: Recientemente incluida con evidencia en la avifauna uruguaya (Abreu *et al.* [2010] *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 240-241).

■ PAÍÑO EUROPEO | *Hydrobates pelagicus*

Distribución: Cría en islas de Noruega, Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Canarias y el mar Mediterráneo. En invierno se dispersa al sur llegando hasta Sudáfrica (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Dos individuos observados por William Curtis a unas 30 millas de Cape Carysfort, islas Malvinas el 7 de diciembre de 1994 (Bourne & Curtis [1997] *The Warrah. Falklands Conservation* 12: 7-9).

Taxonomía: Algunos trabajos sugieren que existen dos especies: PAÍÑO BRITÁNICO *Hydrobates pelagicus* que cría en el noroeste de Europa, y PAÍÑO DEL MEDITERRÁNEO *Hydrobates melitensis* que se reproduce en el mar Mediterráneo (Robb *et al.* [2008] *Petrels Night and Day*. The Sound Approach).

■ PETREL MOTEADO | *Pterodroma inexpectata*

Distribución: Especie típica del océano Pacífico, con colonias de nidificación en Nueva Zelanda y en las islas Fiordland, Solander, Stewart y Snares (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Hans Meltote y Claus Horneman 130 millas al sudeste del cabo de Hornos (58°45'S 65°30'W) el 18 de diciembre de 1993 (Meltote & Horneman [1995] *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 115: 71-72; H. Meltote en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La posición original dada por estos autores es incorrecta.

2. Un individuo observado por William Curtis al sudeste de las islas Malvinas (54°17,1'S 59°02,7'W) el 28 de diciembre de 1994 (Curtis [1995] *Sea Swallow* 44: 63-64).

3-6. Un total de cuatro individuos observados por Richard Heil y Blair Nikula unas 60 millas al norte de Smith Island, Península Antártica el 23 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40574389).

7. Un individuo observado por Richard Heil y Blair Nikula unas 33 millas al norte de Livingston Island, Península Antártica el 24 de febrero de 2005 (ebird.org/checklist/S40575132).

Comentarios: Colectada en aguas fueguinas del océano Pacífico durante la primera expedición de James Cook en el año 1769 (Clark [1986] *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos*. LOLA; Clark *et al.*

[1992] *Notornis* 39: 133-144; Curtis [1995] *op. cit.*). Una observación y una fotografía en el pasaje de Drake en marzo de 2008 y marzo de 2009 respectivamente, al parecer ocurrieron fuera de la jurisdicción argentina (Espín *et al.* [2009] *Seabird* 22: 54-55; ebird.org/checklist/S43998395).

■ PETREL DE PARKINSON | *Procellaria parkinsoni*

Distribución: Endémica de cría de Nueva Zelanda, nidificando en las islas Little Barrier y Great Barrier. En la etapa post reproductiva se dispersa hacia el océano Pacífico oriental, mientras que los inmaduros pasan algunos años en la corriente de Perú (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1-2. Registrada en dos ocasiones frente a la costa de Buenos Aires en los meses de febrero y abril, sin más detalles (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Taxonomía: Para una discusión sobre identificación ver Howell ([2006] *Birding* 38: 52-64).

Comentarios: Uno de los registros corresponde a un ejemplar fotografiado por Luis Pagano y un grupo de observadores unas 20 millas al sudeste de Mar del Plata, Buenos Aires el 23 de febrero de 2014 (L. Pagano *obs. pers.*; Figura 105). Las fotografías fueron analizadas por Brent Stephenson, concluyendo que se trataba del PETREL NEGRO *Procellaria westlandica* (B. Stephenson *in litt.*).




Figura 105. Petrel Negro *Procellaria westlandica*, Mar del Plata, Buenos Aires, 23 de febrero de 2014 (Luis Pagano)

■ AVE FRAGATA GRANDE | *Fregata minor*

Distribución: Mayormente en zonas tropicales de los océanos Índico y Pacífico. La subespecie *nicolli* se restringe al océano Atlántico, nidificando en las islas Martín Vaz y Trindade frente a la costa de Brasil (Orta [1992] *en del Hoyo et al.* [editores] *Handbook of the birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Una “posible” hembra adulta de esta especie observada por Bernabé y Máximo López-Lanús en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 24 enero de 2007 (López-Lanús & López-Lanús [2011] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 73: 1-7).

Taxonomía: La subespecie *nicolli*, única presente en el océano Atlántico, no cuenta con registros recientes de nidificación y parece estar condenada a la extinción (Orta [1992] *op. cit.*).

Comentarios: Las descripciones y bocetos aportados por López-Lanús & López-Lanús ([2011] *op. cit.*) no aseguran la identificación como *Fregata minor*. El plumaje descrito y representado no coincide con ninguno conocido para el género (Harrison [1983] *Seabirds, an identification guide*. Croom Helm Ltd.).

■ GARCITA VERDOSA | *Butorides virescens*

Distribución: Desde el centro de Estados Unidos y E de Canadá hasta Panamá y el Caribe (Martínez-Vilalta & Motis [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado en reiteradas ocasiones por Flavio Moschione y Leonardo Pastorino en el PN Iguazú, Misiones el 13 y 15 de diciembre de 1982 (Moschione [1984] *Nuestras Aves* 5: 11-12).

2. Un adulto observado por Bernabé López-Lanús y Sofía Salazar en el riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa el 3 de octubre de 2014 (López-Lanús & Mencia [2017] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 228: 1-29).

Taxonomía: Aún no existe consenso con respecto a los límites de especie entre *Butorides virescens* y la GARCITA AZULADA *Butorides striata*, y muchas veces son consideradas conespecíficas. Para un análisis más profundo ver Hayes ([2002] *North American Birds* 56: 4-10) y Hayes *et al.* ([2013] *North American Birds* 67: 4-8).

Comentarios: Con respecto al registro del PN Iguazú, Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) comentan que Mauricio Rumboll negó haberla observado. Estos autores concluyen que es poco probable la presencia de *Butorides virescens* en Argentina.

■ CUERVILLO ESCARLATA | *Eudocimus ruber*

Distribución: Restringida al N de Sudamérica hasta el delta del Amazonas. Una población aislada recolonizó las costas de São Paulo, Brasil (Matheu & del Hoyo [1992] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40).

2. Una bandada observada en el bajo del Yacaré, departamento La Paz, Entre Ríos en el año 1979 (Ceruti [1990] *Revista de Antropología* 5: 60-76).

3. Incluida por Claës Olrog para la avifauna argentina, sin mayores detalles (Olrog [1984] *Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo*. APN). Esto se basó en una supuesta fotografía tomada por Zapico Antuña en los Esteros del Iberá, Corrientes (Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros). La imagen nunca fue publicada y al parecer se encuentra perdida.

4. Un individuo observado en el arroyo Feliciano, Entre Ríos en el año 1988 (Ceruti [1990] *op. cit.*).

■ ESPARVERO YUNGUEÑO | *Accipiter ventralis*

Distribución: Andes desde Venezuela y Colombia hasta el O de Bolivia, mayormente entre los 900-2700 msnm (Ferguson-Lees & Christie [2001] *Raptors of the World*. A&C).

Registros: 1. Un individuo observado por Matías Juhant en la seccional El Monolito del PN Calilegua, Jujuy en el año 2005 (Juhant [2006] *II Congreso de Rapaces Neotropicales*. Puerto Iguazú).

2-3. Un total de cuatro individuos observados por Ignacio Roesler en el PP Potrero de Yala y el PN Calilegua, Jujuy sin fecha (I. Roesler en Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros). Si bien es imposible asegurar que se tratara de *Accipiter ventralis*, hay que descartar al ESPARVERO ESTRIADO *Accipiter erythronemius* ya que las aves eran de morfotipo blanco liso y uno de ellos oscuro (I. Roesler *in litt.*).

4. Un adulto de la fase marrón observado por Luis Pagano cerca de la seccional El Monolito del PN Calilegua, Jujuy el 4 de enero de 2018 (L. Pagano obs. pers.).

5. Un adulto observado por Luis Pagano cerca de El Duraznillo, departamento Valle Grande, Jujuy el 6 de Julio de 2018 (L. Pagano obs. pers.).

Taxonomía: Seguimos el tratamiento propuesto por Thiollay ([1994] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions) en considerar a este taxón como especie válida.

■ CHORLO DORADO EUROPEO | *Pluvialis apricaria*

Distribución: Nidifica en el extremo N de la región Paleártica occidental, y luego realiza una corta migración hacia Europa y las costas del Mediterráneo (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Mencionada como accidental para las islas Malvinas, sin más detalles (Strange [1992] *A Field Guide to the Wildlife of the Falkland Islands and South Georgia*. Harper Collins).

Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). La identificación a campo del género *Pluvialis* suele ser complicada. Esta especie puede generar confusión con el CHORLO PAMPA *Pluvialis dominica*, el cual fue registrado en varias ocasiones en las islas Malvinas (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC).

■ CHORLITO DE WILSON | *Charadrius wilsonia*

Distribución: Región Caribe y N de Sudamérica, con algunas poblaciones residentes en el N de Brasil y Perú (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Dos individuos observados en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre febrero de 2009 y septiembre de 2010 (Rodríguez et al. [2010] *Flamingo* 18: 45-47; Flavio Moschione com. pers.).

■ ALCARAVÁN | *Burhinus superciliosus*

Distribución: Zonas áridas al O de los Andes, desde el S de Ecuador hasta el extremo N de Chile. Al parecer sedentario en la mayoría de su rango (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PN San Guillermo, San Juan el 3 de abril de 1999 (Pagano & Bodrati en prep.).

■ BECASA CANELA | *Limosa fedoa*

Distribución: Se reproduce en el centro de Estados Unidos y luego realiza una corta migración hacia las costas del Pacífico y el Caribe. Se han reportado individuos errantes hasta el norte de Chile (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy entre septiembre y noviembre de 2009 (Rodríguez *et al.* [2010] *Flamingo* 18: 45-47; Camperi *et al.* [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).

Comentarios: La referencia a la localidad de Las Doncellas, departamento Cochinoca, Jujuy (Camperi *et al.* [2012] *op. cit.*) se trataría de un error (Flavio Moschione *com. pers.*). Numerosos registros modernos en el centro de Chile, especialmente en la desembocadura del río Elqui, el estero Tongoy y Concón (ebird.org).

■ PLAYERITO VIENTRE NEGRO | *Calidris alpina*

Distribución: Nidificante circumpolar en Alaska, Canadá, Groenlandia, N de Europa y Siberia. La población americana realiza una migración post reproductiva a lo largo de la costa del océano Pacífico (subespecie *pacifica*) y el Atlántico (subespecie *hudsonia*) llegando hasta México (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado por Julius Kieser en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Buenos Aires el 12 de marzo de 1981 (Kieser [1982] *American Birds* 36: 1024-1025).

2. Un individuo observado por Santiago Imberti en la RP de Aves Playeras, Santa Cruz el 8 de enero de 2006 (Darrieu *et al.* [2008] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 10: 111-145).

3. Un individuo observado por Flavio Moschione en los bañados del Quirquincho, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *com. pers.*).

Comentarios: Especie no mencionada por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Un individuo observado en la laguna Ganso, departamento Presidente Hayes, Paraguay el 29 de junio de 2001 (Lesterhuis & Clay [2003] *Hornero* 18: 65-67).

■ PLAYERITO OCCIDENTAL | *Calidris mauri*

Distribución: Se reproduce en Alaska y el extremo oriental de Rusia. Luego de la etapa reproductiva ocupa las costas del S de Estados Unidos, el Caribe y N de Sudamérica (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en el MN Laguna de los Pozuelos, Jujuy el 19 de octubre de 2016 (ebird.org/checklist/S32892821).

Comentarios: Durante el verano austral se desplaza mayormente a través de la costa del océano Pacífico, con numerosos registros modernos en el centro de Chile (ebird.org).

■ BECASINA DE LOS PÁRAMOS | *Gallinago jamesoni*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia, entre los 3000-3500 msnm (Hayman *et al.* [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un individuo observado por Jorge Baldo en el paraje Archibarca, departamento Susques, Jujuy el 5 de marzo de 2003 (J. Baldo *in litt.*).

2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy entre los años 2008 y 2010 (González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).

■ PITOTOY VAGABUNDO | *Tringa incana*

Distribución: Nidifica en Alaska y extremo O de Canadá. Posteriormente se dispersa a través del océano Pacífico llegando a las costas de Australia (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Flavio Moschione, José Segovia y Francisco Cornell en la laguna Vilama, departamento Rinconada, Jujuy el 17 de febrero de 2018 (ebird.org/checklist/S43394808; Figura 106). La fotografía obtenida no aporta pruebas suficientes para separarla con certeza del muy similar *Tringa brevipes*.

2. Un individuo observado por Flavio Moschione y José Segovia en Abra Pampa, departamento Cochínoca, Jujuy el 3 de febrero de 2021 (ebird.org/checklist/S82107850).

Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Heteroscelus* (Hayman et al. [1986] *op. cit.*).



Figura 106. Pitotoy *Tringa* sp., laguna Vilama, Jujuy, 17 de febrero de 2018 (José Segovia)

■ PITOTOY PATAS VERDES | *Tringa nebularia*

Distribución: Nidifica en casi toda la región Paleártica y luego realiza una migración hacia África, S de Asia y Australia (Hayman et al. [1986] *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un ejemplar colectado en “Buenos Ayres”, sin más detalles (Schlegel [1864] *Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement*. Tome V. Muséum d’histoire naturelle des



Figura 107. Pitotoy Patas Verdes *Tringa nebularia*, RMNH-32812, “Buenos Aires” (Pepijn Kamminga, Naturalis Biodiversity Center)



Figura 108. Pitotoy Patas Verdes *Tringa nebularia*, RMNH-32813, “Río de la Plata”, año 1860 (Pepijn Kamminga, Naturalis Biodiversity Center)

Pays-Bas; Seebohm [1888] *The geographical distribution of the family Charadriidae*. Henry Sotheran & Co.; Dabbene [1920] *Hornero* 2: 99-128). El espécimen (RMNH-32812) se encuentra depositado en el RMNH (Figura 107).

2. Un ejemplar colectado en el “Río de La Plata” en el año 1860 (Schlegel [1864] *op. cit.*; Seebohm [1888] *op. cit.*; Dabbene [1920] *op. cit.*). El espécimen (RMNH-32813) se encuentra depositado en el RMNH (Figura 108).

Comentarios: La proveniencia de estos ejemplares fue puesta en duda por Hellmayr & Conover ([1948] *Catalogue of birds of the Americas. Zoological Series. Volume XIII. Part I*), y por ahora preferimos excluirla de la lista debido a la falta de detalles. El primer registro para Sudamérica corresponde a un adulto fotografiado en Pointe Saint-François, Guayana Francesa el 16 de febrero de 2006 (Claessens & Comité d’Homologation de Guyane [2015] *Cotinga* 37: 66-78).

■ GAVIOTA PERUANA | *Larus belcheri*

Distribución: Costa e islas del océano Pacífico, desde el N de Perú hasta el N de Chile. Existen dispersiones hacia el centro de Chile, S de Ecuador y Panamá (Howell & Dunn [2007] *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin).

Registros: 1. Un juvenil sobrevolando la laguna Llancanelo, departamento Malargüe, Mendoza sin fecha (Sosa [1995] *Multequina* 4: 65-75; Heber Sosa *in litt.*).

2. Avistajes de grupos de hasta cinco individuos en la laguna Las Salinas, departamento San Rafael, Mendoza en el año 2001 (Heber Sosa *in litt.*).

3. Un individuo observado en el lago Nahuel Huapi frente a San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro en enero de 2005 (Lorenzo Sympon en Gelain [2010] *Aves de la Patagonia Argentina: atlas ornitológico de Río Negro*. San Juan; Gelain & Tolosa [2011] *Xolmis* 6: 1-37).

4. Un individuo observado por Juan C. Chebez en el lago Nahuel Huapi frente a San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, Río Negro en enero de 2006 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).

Comentarios: Es posible que los datos provenientes de San Carlos de Bariloche, Río Negro correspondan a la misma observación. Omitimos los registros con relación a la costa atlántica y las islas Malvinas, ya que seguramente pertenezcan a la GAVIOTA CANGREJERA *Larus atlanticus*.

■ GAVIOTÍN DE SAN FÉLIX | *Anous stolidus*

Distribución: Mayormente en regiones tropicales de los océanos Índico y Atlántico. La subespecie nominal habita el Caribe e islas del Atlántico, llegando hasta el golfo de Guinea y Camerún (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por E. Biester y F. Hildebrandt supuestamente en las islas Malvinas en octubre de 1966 (Woods [2017] *The Birds of the Falkland Islands. An Annotated Checklist*. BOC). El mismo había sido publicado como proveniente de “Atlantik vor Brasilien, St. Pauls-Felsen, Oktober 1966” (Kinzellbach [2016] *Die Vögel. Aves. Verzeichnis des Bestands 2016. Zoologische Sammlung der Universität Rostock*. Basiliskenspre. Este espécimen (ZSRO-2174) posee actualmente la leyenda “Falkland-Inseln, St. Pauls-Felsen”, por lo que preferimos mantenerlo como un registro hipotético o quizás erróneo.

Comentarios: Existen reportes recientes en aguas frente a Río Grande do Sul, Brasil (Antunes Dias *et al.* [2010] *Iheringia. Série Zoologia* 100: 379-390) y en La Paloma, Uruguay (Abente *et al.* [2010] *Achará Digital* 1: 7).

■ GAVIOTÍN ROSADO | *Sterna dougallii*

Distribución: La subespecie nominal en el E de Norteamérica, el Caribe, N de Sudamérica, NO de Europa, E y S de África. La población americana pasa la etapa no reproductiva mayormente en el océano Atlántico (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Comentarios: 1. Mencionada como rara en Punta Rasa, partido de la Costa, Buenos Aires donde algunos ejemplares fueron recapturados con redes y fotografiados (Anónimo [2005] *Vida Silvestre* 93: 33; Petracci et al. [2005] *Guía de las aves playeras y marinas migratorias del sur de América del Sur*; Esteban Bremer in litt.). Lamentablemente las fotografías aún no se encuentran disponibles.

■ GAVIOTÍN DE FORSTER | *Sterna forsteri*

Distribución: Se reproduce en aguas interiores de Norteamérica, y luego migra al sur ocupando el S de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un juvenil fotografiado por Gustavo Bruno en la laguna Mar Chiquita, departamento San Justo, Córdoba el 7 de abril de 2012 (MAyDS & AA [2017] *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación & Aves Argentinas).

Comentarios: La fotografía nunca fue publicada y su identificación aún merece ser debidamente evaluada.

■ GAVIOTÍN ELEGANTE | *Thalasseus elegans*

Distribución: Restringida a las costas del Pacífico, nidificando en California y Baja California. Durante la época no reproductiva se desplaza hacia el sur llegando al centro de Chile (Gochfeld & Burger [1996] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo observado por Mike Bingham en Puerto Stanley, islas Malvinas el 9 de agosto de 1996 (White & Henry [2001] *Wildlife Conservation in the Falkland Islands* 1: 16-18).

Comentarios: Había sido mencionada para la estancia Rincón de Cobo, partido de La Costa, Buenos Aires (Lowen & Mazar Barnett [2010] *Nuestras Aves* 55: 12-16). Posteriormente se determinó que estas aves correspondían a variaciones del GAVIOTÍN PICO AMARILLO *Thalasseus sandvicensis* (Lowen [2016] *Neotropical Birding* 19: 49; James Lowen in litt.). Para una discusión sobre las poblaciones de *Thalasseus sandvicensis* ver Shoch & Aspiroz ([2016] *Neotropical Birding* 19: 44-57).

■ AÑAPERO ALAS CORTAS | *Chordeiles acutipennis*

Distribución: Desde el S de Estados Unidos hasta el centro Sudamérica. La subespecie nominal en el E de Brasil, N de Bolivia y Paraguay (Cleere [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Dos individuos observados por Alejandro Bodrati en el PN Chaco, Chaco el 23 de diciembre de 2000 (Bodrati & Areta [2010] *Hornero* 25: 67-73).

2. Dos individuos observados por Flavio Moschione sobre el límite del PP Fuerte Esperanza, Chaco el 9 de enero de 2002 (F. Moschione en Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
3. Un grupo de siete individuos observado por Flavio Moschione en Los Leones, departamento Rivadavia, Salta el 7 de diciembre de 2002 (F. Moschione en Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
4. Un individuo y una pareja observados por Juan I. Areta sobrevolando la comunidad de Pozo Cercado, departamento Ramón Lista, Formosa el 12 de diciembre de 2003 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
5. Cuatro individuos observados por Juan I. Areta sobre la comunidad de El Cantor, departamento Ramón Lista, Formosa el 20 de diciembre de 2003 (Bodrati & Areta [2010] *op. cit.*).
6. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en Joaquín V. González, departamento Anta, Salta el 11 de enero de 2019 (ebird.org/checklist/S51586824).

■ VENCEJO DE CHIMENEA | *Chaetura pelagica*

Distribución: Se reproduce en una extensa región al E de Estados Unidos. Su área de invernada es poco conocida, pero visita regularmente el E de Ecuador, O y E de Perú, NO de Brasil y N de Chile (Chantler [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo fotografiado David Stejskal y John Rowlett 1 km al norte de Tumbaya, departamento homónimo, Jujuy el 18 de noviembre de 1997 (D. Stejskal en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Por el momento la fotografía no se encuentra disponible (D. Stejskal *in litt.*).

2. Un individuo observado por Héctor Slongo y Steve Hilty en Yavi, departamento homónimo, Jujuy el 12 de noviembre de 2012 (H. Slongo *in litt.*).

Comentarios: Un ejemplar capturado y fotografiado por Ignacio Roesler y Rich Lindie en Humahuaca, departamento homónimo, Jujuy el 25 de octubre de 2018 (I. Roesler *in litt.*; Figuras 109-110). La identificación del mismo aún requiere confirmación.



Figuras 109-110. Vencejo *Chaetura* sp., Humahuaca, Jujuy, 25 de octubre de 2018 (Ignacio Roesler)

■ COLIBRÍ CHICO | *Colibri cyanotus*

Distribución: La subespecie *crissalis* en los Andes de Perú, Bolivia y NO de Argentina (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo capturado en la cuesta del Clavillo, departamento Andalgalá, Catamarca el 23 de enero de 1993 (Bertelli et al. [1997] *Hornero* 14: 269). Aparentemente el ejemplar no habría sido colectado.

2. Varios individuos observados por Flavio Moschione en El Algarrobal, Cachi Adentro, departamento Cachi, Salta en diferentes visitas del mes de octubre sin especificar el año (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).

3. Al menos tres individuos observados por Flavio Moschione en El Algarrobal, Cachi Adentro, departamento Cachi, Salta el 26 de abril de 2007 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*).

4. Mencionada sin detalles para la provincia de Jujuy (Burgos et al. [2009] *Lista de las aves de la provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy).

Taxonomía: Anteriormente conocida como *Colibri thalassinus* (Rodríguez Mata et al. [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

Comentarios: Un ejemplar colectado por Serafín Pierotti en Agua Rosada, departamento Trancas, Tucumán el 16 de marzo de 1957 (Olrog [1963] *Neotrópica* 9: 94). Este espécimen (COFML-10445) fue posteriormente reidentificado como inmaduro de COLIBRÍ GRANDE *Colibri coruscans* (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). A pesar de ser incluida en la lista de aves de Jujuy (Burgos et al. [2009] *op. cit.*), la misma no se menciona en un trabajo recopilatorio para dicha provincia (Camperi et al. [2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140).

■ COQUETA VERDE | *Lophornis chalybeus*

Distribución: La subespecie nominal en el SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta Santa Catarina (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Observada en reiteradas ocasiones por Claës Olrog en Villa Gesell, partido homónimo, Buenos Aires entre los años 1967 y 1971 (Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264).

2. Una hembra observada por Martín de la Peña en Esperanza, departamento Las Colonias, Santa Fe el 8 de marzo de 1988 (de la Peña [1988] *Nuestras Aves* 16: 17-18).

3. Dos hembras observadas en el riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa el 12 de diciembre de 1988 (Salvador & Salvador [1990] *Hornero* 13: 178-179).

4. Dos hembras y un macho observados en el arroyo Tabay al norte de Jardín América, departamento San Ignacio, Misiones el 21 de diciembre de 1988 (Salvador & Salvador [1990] *op. cit.*).

5. Un individuo observado en el PN El Palmar, Entre Ríos en abril de 1994 (Pedro Moreyra y Marcelo Zanello en Marateo et al. [2009] *Cotinga* 31: 47-60).

6. Una hembra observada por Javier Heredia en el PP Salto Encantado, Misiones el 16 de octubre de 2006 (J. Heredia en Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros; J. Heredia in litt.).

Comentarios: Juan C. Chebez ([2009] *op. cit.*) comenta que el mismo Claës Olrog le comunicó la captura de un ejemplar de esta especie, del cual desconoce su paradero. Narosky & Yzurieta ([1987] *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini) mencionan la observación de un individuo de *Lophornis* en el PN Iguazú, Misiones sin mayores detalles. Bernabé López-Lanús ([2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones) supone que todos los registros provienen de confusiones con polillas del género *Aellopos*.

■ PICAFLOR PICUDO | *Heliomaster longirostris*

Distribución: La subespecie nominal desde Costa Rica hasta el centro de Brasil y N de Bolivia (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho observado por Flavio Moschione a la vera del riacho Porteño en Villa General Güemes, departamento Patiño, Formosa el 20 de enero de 1988 (F. Moschione en Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions; Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina*. Vol. 1. No Passeriformes. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

2. Un individuo filmado por Rodrigo Castillo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 17 de agosto de 2001 (Chebez *et al.* [2004] *Hornero* 19: 1-5). Lamentablemente el material no se encuentra disponible.

3. Observada por Flavio Moschione en reiteradas ocasiones en la RP Loro hablador, Chaco sin fecha (Moschione & Bishels [2004] *Listado de las Aves del Parque Provincial Loro Hablador, provincia del Chaco*. Proyecto Elé & Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata).

4. Observada por Flavio Moschione en más de una ocasión en el PN Copo, Santiago del estero sin fecha (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).

5. Registrada por Flavio Moschione en las inmediaciones de la RN Pizarro, Salta sin fecha (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*). Este registro es una de las fuentes para su inclusión en la avifauna de dicha provincia (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo).

6. Observada por Silvia Strelkov y Carlos Cuñado en la RP Las Lancitas, Jujuy sin fecha (Flavio Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).

7. Dos machos observados por Flavio Moschione sobre el río Teuco en los alrededores de El Sauzalito, departamento General Güemes, Chaco el 1 de febrero de 2007 (F. Moschione en Povedano & Maugeri [2020] *op. cit.*; F. Moschione *in litt.*).

8. Un individuo observado por Marcelo Gavensky sobre la ruta provincial n°13 entre Palma Sola y La Estrella, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de noviembre de 2017 (ecoregistros.org/site/registro.php?id=683391).

Comentarios: Martín de la Peña reportó una hembra fotografiada en Esperanza, departamento Las Colonias, Santa Fe el 10 de noviembre de 1976 (de la Peña [1978] *Enciclopedia de las aves argentinas*. Fascículo IV. Santa Fe; de la Peña [1988] *Nuestras Aves* 16: 17-18). Esta cita fue repetida en varias ocasiones, hasta que finalmente el mismo autor concluye que éste y otros dos ejemplares en realidad correspondían al PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* (de la Peña [2004] *Nuestras Aves* 47: 31; de la Peña [2020] *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*. Nueva Serie 6: 1-348).

■ PICAFLOR COLA CASTAÑA | *Hylocharis sapphirina*

Distribución: Fragmentada en el N y centro de Sudamérica, incluyendo E de Brasil, E de Paraguay y NE de Argentina (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Observada por Adolfo Doering en las riberas del río Guayquiraró, límite entre Corrientes y Entre Ríos durante enero y febrero de 1873 (Doering [1874] *Periódico Zoológico* 1: 237-258). Al parecer no se habría obtenido ningún ejemplar.

2. Un ejemplar capturado en Concepción del Uruguay, departamento Uruguay, Entre Ríos y entregado