

- a Walter Barrows el 13 de octubre de 1880 (Barrows [1884] *Auk* 1: 20-30). No queda claro si se conservó el espécimen, y en tal caso parece estar perdido.
3. William Hudson lo menciona como abundante en los bosques sobre el río de la Plata, Buenos Aires (Sclater & Hudson [1889] *Argentine Ornithology*. Vol. 2. RH Porton). Es muy probable que se refiera al PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura*.
4. Mencionada sin demasiados detalles por Johannes Frenzel para la provincia de Córdoba, antes de junio de 1890 (Frenzel [1891] *Journal für Ornithologie* 39: 113-126).
- 5-7. Un total de tres ejemplares colectados por Graham Kerr en Puerto Bermejo, departamento Bermejo, Chaco y en Capitán Page (24°47'S 58°45'W), departamento Pilagás, Formosa entre enero de 1890 y marzo de 1891 (Kerr [1892] *Ibis* 34: 120-152). Los especímenes aparentemente no fueron conservados.
8. Mencionada sin detalles para las provincias de Formosa, Chaco y Misiones (Short [1975] *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163-352; Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).
9. Mencionada sin detalles para la provincia de Corrientes (Contreras [1981] *Historia Natural* 2: 21-28).
10. Registrada por Juan C. Chebez en el PN Iguazú, Misiones en febrero de 1983 (J.C. Chebez en Saibene et al. [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).
11. Un individuo observado por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en el PN Río Pilcomayo, Formosa entre el 20 y el 28 de enero de 1988 (F. Moschione y J. San Cristóbal en López-Lanús [1997] *Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina*. LOLA).
12. Mencionada para el noreste de la provincia de Chaco cerca del río Bermejo, en septiembre sin precisar el año (Contreras et al. [1990] *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia del Chaco, República Argentina*. Vol. 1. No *Passeriformes*. Fundación Vida Silvestre Argentina).
13. Registrada por Julio Contreras en la provincia de Entre Ríos en el año 1990, sin mayores detalles (J. Contreras en de la Peña [1997] *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. LOLA).
14. Una pareja observada regularmente por Alejandro Bodrati en la estancia San Gará, departamento Ituzaingó, Corrientes entre el 22 y el 26 de mayo de 1993 (A. Bodrati *in litt.*).
15. Un macho observado por Alejandro Bodrati en el PP Salto Encantado, Misiones el 8 de marzo de 1997 (A. Bodrati *in litt.*).
16. Un macho observado por Emilio White y Gustavo Zurita en la estancia Guaycolec, departamento Formosa, Formosa en diciembre de 1998 (Ramírez Llorens et al. [2003] *Nuestras Aves* 46: 36-40).
17. Mencionada como residente y nidificante en el área comprendida entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la localidad de Barranqueras, departamentos Bermejo y 1° de Mayo, Chaco entre 1996 y 2003 (Chatellenaz [2005] *INSUGEO Miscelánea* 14: 527-550).
- 18-19. Un macho y tres hembras observados por Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano Acquaviva en el paraje San Juan ubicado al oeste de Villa Guillermina, departamento General Obligado, Santa Fe el 6 y 7 de enero de 2003 (Manassero et al. [2004] *Nuestras Aves* 47: 31-33).
20. Un individuo observado por Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano Acquaviva al oeste de Villa Guillermina, departamento General Obligado, Santa Fe el 9 y 10 de enero de 2004 (Manassero et al. [2004] *op. cit.*).
21. Una hembra observada por Eduardo Militello y Valeria Calvo en el PN Iguazú, Misiones el 21 de marzo de 2004 (sib.gob.ar).
22. Un macho observado por Ignacio Roesler en el PN Mburucuyá, Corrientes entre el 24 y el 27 de marzo de 2005 (I. Roesler *in litt.*).
23. Mencionada sin detalles para varias localidades de la provincia de Entre Ríos (Beltzer et al. [2006] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Entre Ríos*. Serie Climax N°13. Ceride-Conicet).
24. Una pareja observada por Juan C. Chebez en la estancia Rincón del Socorro, departamento Mercedes, Corrientes el 14 de marzo de 2007 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros).
25. Incluida sin detalles para la avifauna del PN Mburucuyá, Corrientes (Chatellenaz et al. [2010] *Acta Zoológica Lilloana* 54: 139-160).

26. Mencionada sin detalles para la mitad oriental de la provincia de Formosa (Contreras *et al.* [2014] *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. Vol. 1. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara).

27. Registrada en la estancia San Antonio, departamento San Martín, Corrientes el 10 de septiembre de 2013 (ebird.org/checklist/S24989270).

28. Un individuo observado en Los Gallegos, departamento San Martín, Santiago del Estero el 11 de enero de 2014 (Quiroga *et al.* [2016] *Nuestras Aves* 61: 49-53).

29. Una hembra grabada y fotografiada por Adrián Galimberti y Bernabé López-Lanús en la estancia Virocay, departamento Santo Tomé, Corrientes el 23 de noviembre de 2011 (López-Lanús *et al.* [2013] en Marino *et al.* [editores] *Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica*. Temas de Naturaleza y Conservación N°9. Aves Argentinas; xeno-canto.org/106538; Figura 111). La identificación del ejemplar generó opiniones diversas, por lo tanto preferimos tratar el registro con cautela hasta que se consiga mayor evidencia.

30. Un individuo observado por Julián Quillén Vidoz en la estancia San Juan Poriahú, departamento San Miguel, Corrientes el 23 de diciembre de 2016 (ebird.org/checklist/S33181281).

31. Un macho inmaduro observado por Luis Pagano, Alejandro Bodrati y Néstor Fariña en la reserva natural Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes el 18 de enero de 2017 (L. Pagano *obs. pers.*).

Comentarios: Había sido incluida para la avifauna argentina por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions) a pesar de no existir ninguna evidencia disponible. Los primeros registros para Entre Ríos fueron puestos en duda por Lester Short ([1975] *op. cit.*). Henry Durnford ([1877] *Ibis* 19: 166-203) la había mencionado con relación a Buenos Aires, cita que fue repetida por otros autores. Finalmente Narosky & Di Giacomo ([1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini) descartan este registro aludiendo que se trataba del PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura*.



Figura 111. Picaflor *Hylocharis* sp., estancia Virocay, Corrientes, 23 de noviembre de 2011 (Adrián Galimberti)

■ PICAFLOR VIENTRE PUNTEADO | *Taphrospilus hypostictus*

Distribución: Mayormente en los Andes desde Ecuador hasta el NO de Argentina (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un individuo adulto observado por Flavio Moschione entre Lipeo y El Cedral, depar-

tamento Santa Victoria, Salta el 22 de octubre de 2006 (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *en* Povedano & Maugeri [2020] *Picaflores en Argentina y Sudamérica*. La Plata; F. Moschione *in litt.*).

Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ MARTÍN PESCADOR ROJIZO | *Chloroceryle inda*

Distribución: Desde Nicaragua hasta la mitad N de Sudamérica, incluyendo N de Bolivia y E de Paraguay. También cerca de la costa en el SE de Brasil (Woodall [2001] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 6. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un macho observado por Flavio Moschione en la reserva privada El Pantanoso, departamento Ledesma, Jujuy entre los años 2006 y 2010 (Moschione *et al.* [2011] XIV Reunión Argentina de Ornitología. Formosa).

2. Incluida sin detalles en la avifauna de la provincia de Salta (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo).

■ YACAMARÁ | *Galbula ruficauda*

Distribución: Desde el S de México hasta el centro de Sudamérica. Las subespecies *rufoviridis* y *heterogyna* en el centro de Brasil y el N de Bolivia (Tobias *et al.* [2002] *en* del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 7. Lynx Edicions).

Registros: 1. Un ejemplar capturado por Hermann Burmeister en San Pedro, departamento homónimo, Misiones sin fecha (Dabbene [1910] *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1-513; Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero aparentemente se encuentra perdido en la actualidad.

2. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en la provincia de Misiones “en diciembre de 1972 o 1973” (M. Rumboll *en* Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ GUACAMAYO CANINDÉ | *Ara ararauna*

Distribución: Amplia distribución amazónica hasta el N de Bolivia, S de Brasil y NE de Paraguay (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Mencionada por Florián Paucke ([1942] *Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios Moco-bíes, 1749-1767*. Universidad Nacional de Tucumán) refiriéndose a cierta región del noreste de Argentina.

2. Un ejemplar aparentemente hallado en el Chaco permaneció un tiempo en el jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires (Holmberg [1898] *en* de la Fuente [editor] *Segundo Censo de la República Argentina*. Tomo I. Buenos Aires). Se desconoce si el espécimen fue conservado, y en tal caso se encuentra perdido en la actualidad.

3. Mencionada por Ernesto Lynch Arribálzaga para la zona del río Bermejo en la región chaqueña, sin mayores detalles (Lynch Arribálzaga [1920] *Hornero* 2: 85-98).

4. Una hembra al parecer proveniente de la provincia de Formosa permaneció cautiva en el zoológico de la ciudad de Santiago del Estero, y posteriormente fue donada a la fundación Miguel Lillo el 8 de mayo de 1985 (L. Pagano *obs. pers.*). El espécimen (COFML-14833) se encuentra depositado en la COFML (Figura 112).

5. Mencionada por Gunnar Höy como rara en la zona de San Ramón de la Nueva Orán, departamento Orán, Salta (Höy [1969] *Hornero* 11: 53-56).

6. Tres parejas observadas por Gunnar Höy en el río Carapará cerca del límite con Bolivia, departamento General José de San Martín, Salta en el año 1952 (Höy [1969] *op. cit.*).

Comentarios: Las citas referidas a la provincia de Misiones (Orfila [1936] *Hornero* 6: 197-225; Zotta [1937] *Hornero* 6: 531-554; Pereyra [1950] *Anales del Museo Nahuel Huapi* 2: 1-40) quizás provengan de interpretaciones de la literatura citada. Las menciones de la PARABA BARBA AZUL *Ara glaucogularis* (= *A. caninde*) en Argentina se refieren con seguridad a *Ara ararauna*, ya que *Ara glaucogularis* es un endemismo de los llanos de Moxos, departamento El Beni, Bolivia (Forshaw & Knigh [2010] *op. cit.*). Es posible que las observaciones de Gunnar Höy ([1969] *op. cit.*) provengan de una confusión con el GUACAMAYO VERDE *Ara militaris* (Di Giacomo [2007] en Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación* N°6. Aves Argentinas). Para una revisión acerca de la nomenclatura de estas especies ver Dabbene ([1920] *Hornero* 2: 56; [1921] *Hornero* 2: 225).



Figura 112. Guacamayo Canindé *Ara ararauna*, COFML-14833, "Formosa" (Luis Pagano)

■ COTORRA DE ACANTILADOS | *Myiopsitta luchi*

Distribución: Valles intermontanos del centro de Bolivia, entre los 1300-3000 msnm (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un grupo en vuelo observado por Flavio Moschione cerca de El Angosto, departamento Santa Catalina, Jujuy sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).

2. Dos individuos observados por Mark Pearman en el río Tranca, departamento Santa Victoria, Salta el 10 de diciembre de 1996 (M. Pearman *in litt.*).

3. Dos o tres individuos escuchados por Ignacio Roesler entre Yavi y Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy en noviembre de 2003 (I. Roesler *in litt.*).

4. Una pareja escuchada en vuelo por Luis Pagano entre Yavi y Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy el 12 de enero de 2009 (L. Pagano *obs. pers.*).

5. Un grupo de diez individuos observado por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle unos 12 km al este de Suripugio (22°13'46"S 65°16'00"W), departamento Yavi, Jujuy el 2 de junio de 2010 (A. Bodrati *in litt.*).

Comentarios: Camperi *et al.* ([2012] *Acta Zoológica Lilloana* 56: 82-140) mencionan un registro en Yavi Chico, departamento Yavi, Jujuy el 13 de junio de 2009. El mismo fue descartado por el autor aludiendo que se trataba de la COTORRA *Myiopsitta monachus*, ya que los pobladores mantienen a esta especie en cautiverio y no se descartan eventuales escapes (Freddy Burgos *in litt.*).

■ LORO CICA | *Triclaria malachitacea*

Distribución: Restringida a la región SE de Brasil, desde el S de Bahia hasta Rio Grande do Sul y extremo NE de Argentina (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones en abril de 1983 (Rumboll [1990] *Nuestras Aves* 22: 28).

2. Un individuo observado por Roberto Straneck y Miguel Castelino en el arroyo Uruguayí, Misiones en noviembre de 1986 (Canevari *et al.* [1991] *Nueva guía de las aves argentinas*. Fundación Acindar).

3. Un individuo observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones en el año 1999 (M. Castelino en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina).

Comentarios: No es posible descartar que algunas de estas observaciones correspondan a ejemplares escapados de cautiverio.

■ CHIRIPEPÉ ALA ROJA | *Pyrrhura devillei*

Distribución: Localizada en el SE de Bolivia, N de Paraguay y SO de Brasil (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo junto a un grupo de CATITA CHIRIRÍ *Brotogeris chiriri* observado por Flavio Moschione cerca de Dragones, departamento General José de San Martín, Salta el 15 de enero de 1995 (Moschione [2008] *Evaluación de la Situación de las Especies de Psitácidos de Interés de Conservación en el Chaco Argentino*. Fundación Biodiversidad; Moschione *et al.* [2008] *XII Reunión Argentina de Ornitología*. San Martín de los Andes).

■ JANDAIA | *Aratinga jandaya*

Distribución: Endémica de la región NE de Brasil en los estados de Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia y Goiás (Forshaw & Knigh [2010] *Parrots of the World*. Princeton University Press).

Registros: 1. Un individuo junto a un grupo de CHIRIPEPÉ CABEZA VERDE *Pyrrhura frontalis* observado por Carlos Saibene en el PN Iguazú, Misiones el 7 de mayo de 1992 (Saibene [1994] *Nuestras Aves* 30: 26).

Taxonomía: Anteriormente considerada como una subespecie de la COTORRA SOL *Aratinga solstitialis*, tal como fue publicado por Saibene ([1994] *op. cit.*).

Comentarios: Considerada errónea por Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), asumiendo que el ave observada en el PN Iguazú se trataba de un ejemplar escapado de cautiverio.

■ CHOCA PLOMIZA | *Thamnophilus schistaceus*

Distribución: Amplia distribución en el O y S de la Amazonia hasta los 1300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho adulto colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy en marzo de 1931 (Zotta [1938] *Hornero* 7: 46-64). El espécimen (MACN-Or-2506a) se encuentra depositado en el MACN.

2. Una hembra colectada por Emilio Budin en Tapia, departamento Trancas, Tucumán en mayo de 1931 (Zotta [1938] *op. cit.*). El espécimen (MACN-Or-2506b) se encuentra depositado en el MACN y su año de colecta no se lee claramente, pudiendo ser 1931 o 1934.

3. Reportada en forma anónima para el PN Iguazú, Misiones en una lista efectuada en el año 1988 (Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

Comentarios: Seguimos a Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions), quienes asumen que los especímenes de Jujuy y Tucumán fueron mal etiquetados.

■ CHOCA ESTRIADA | *Dysithamnus stictothorax*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil hasta los 1100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un macho colectado por Claës Olrog en Dos de Mayo, departamento Caingua, Misiones el 20 de julio de 1973 (Olrog [1973] *Neotrópica* 19: 145-146). El espécimen habría sido depositado en el museo de Dos de Mayo, Misiones pero actualmente parece estar perdido (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

2-3. Dos ejemplares anillados por Arturo Tarak y Miguel Christie en el PN Iguazú, Misiones en agosto de 1977 (A. Tarak y M. Christie en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

4. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1987 (F. Moschione en Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

5. Mencionada sin detalles para los alrededores de Bernardo de Irigoyen, departamento General Manuel Belgrano, Misiones (Mark Pearman en Benstead *et al.* [1993] *Pato Serrucho 93: an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser Mergus octosetaceus in north-east Argentina*. Slimbridge. Wildfowl & Wetlands Trust).

Comentarios: Mazar Barnett & Pearman ([2001] *op. cit.*) describen los acontecimientos ocurridos luego de la colecta del espécimen en Dos de Mayo, Misiones.

■ GALLITO NUCA CANELA | *Melanopareia torquata*

Distribución: Especie típica del *cerrado*, ocupando el centro de Brasil, E de Bolivia y extremo NE de Paraguay hasta los 1000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Observada por Johan Mogensen en Bonpland, departamento Candelaria, Misiones el 27 de enero de 1912 (Mogensen [1930] *Argentinas Dyr*. Graebes Bogtrykkeri). Al parecer este autor intentó coleccionar algunos ejemplares.

■ TICOTICO DE COLLAR | *Anabazenops fuscus*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Bahía hasta Santa Catarina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Jonas Nilsson en el PN Iguazú, Misiones el 15 de enero de 2005. Si bien el registro carece de documentación, el autor realiza una minuciosa descripción y un dibujo del ave (J. Nilsson *in litt.*).

Comentarios: La posible confusión con una hembra de BATARÁ PECHO NEGRO *Biatas nigropectus* no puede descartarse por completo.

■ TICOTICO GOTEADO | *Margarornis squamiger*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, mayormente entre los 2000-3500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús en el PN Baritú, Salta el 13 de noviembre de 1992 (Di Giacomo *et al.* [1995] *Hornero* 14: 67-68).

2. Un individuo observado por Mark Pearman en el PN Calilegua, Jujuy el 16 de agosto de 2000 (Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

3. Dos individuos observados por Flavio Moschione entre Río Seco y San Pedrito, departamento General José de San Martín, Salta el 10 de julio de 2003 (Coconier *et al.* [2007] en Coconier [editor] *Las aves silvestres de Acambuco. Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N°6. Aves Argentinas).

4. Un individuo observado por Bernabé López-Lanús y Eugenio Coconier en el Cluster San Pedrito, departamento General José de San Martín, Salta el 2 de julio de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*).

Comentarios: Un posible individuo escuchado y observado fugazmente por Ignacio Roesler en la finca Falcón, departamento General José de San Martín, Salta el 3 de octubre de 2005 (Coconier *et al.* [2007] *op. cit.*). Una grabación realizada por Luis Pagano y José Segovia en la reserva privada Eco-Portal de Piedra, departamento Santa Bárbara, Jujuy el 11 de diciembre de 2011 requiere confirmación (L. Pagano *obs. pers.*).

■ ESPINERO PECHO NARANJA | *Phacellodomus ferrugineigula*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Minas Gerais y Espírito Santo hasta Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Dos individuos y algunos nidos observados por Gustavo Serrano y Víctor Matuchaka en el PP Moconá, Misiones en julio de 2002 (losquesevan.com/el-espinero-ojo-colorado-nueva-especie-de-ave-para-argentina.599c).

2. Probablemente los mismos nidos del registro anterior hallados por Mark Pearman e Ignacio Roesler en el PP Moconá, Misiones en agosto de 2002 (M. Pearman *in litt.*).

3-4. Un nido abandonado y un individuo escuchado por Alejandro Bodrati en el PP Moconá, Misiones el 14 y 18 de octubre de 2005 respectivamente (A. Bodrati *com. pers.*).

5. Un individuo escuchado por Alejandro Bodrati en la reserva privada Yasy-yateré, departamento Guaraní, Misiones el 20 de octubre de 2006 (A. Bodrati *com. pers.*).

Taxonomía: Considerada anteriormente una subespecie del ESPINERO OJO ROJO *Phacellodomus erythrophthalmus*. Diferencias vocales, morfológicas y ecológicas aportan suficiente evidencia para tratarlas como especies distintas (Simon *et al.* [2008] *Revista Brasileira de Ornitologia* 16: 107-124).

Comentarios: Las observaciones del PP Moconá, Misiones provienen de un sector localizado y probablemente correspondan a los mismos individuos o una pequeña población relictual. Existen reportes en los alrededores de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil (ebird.org).

■ MOSQUETA RABADILLA CANELA | *Phyllomyias uropygialis*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta el extremo NO de Argentina, entre los 1800-3100 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 22 de agosto de 1993 (Di Giacomo [1995] *Hornero* 14: 77-78).

Comentarios: Un ave con las características de esta especie fue observada por Ignacio Roesler cerca de Lipeo, departamento Santa Victoria, Salta el 20 de enero de 2004 (I. Roesler *in litt.*).

■ PICOCHATO CHICO | *Platyrinchus leucoryphus*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil, desde Espírito Santo hasta el E de Paraguay y extremo NE de Argentina (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo anillado en el “norte de Misiones” en abril de 1978 (Mauricio Rumboll *en Olrog* [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

2. Observada por Mauricio Rumboll en el PN Iguazú, Misiones “a principios de los 80’s” (M. Rumboll *en Mazar Barnett & Pearman* [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

3. Un individuo observado por Pablo Cano en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1989 (P. Cano *en Collar et al.* [1992] *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Smithsonian Institution Press & ICBP).

4. Un individuo observado por Jorge Protomastro en el PN Iguazú, Misiones en octubre de 1997 (J. Protomastro *en Mazar Barnett & Pearman* [2001] *op. cit.*).

5. Un individuo observado por Greg Roberts en el PN Iguazú, Misiones en diciembre de 1998 (G. Roberts en Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Fundación Vida Silvestre Argentina). Este observador luego la menciona como registrada el 15 de enero de 1999 en dicha localidad, probablemente refiriéndose a la misma observación (G. Roberts en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

6. Un individuo registrado cerca de Aristóbulo del Valle, departamento Cainguás, Misiones entre octubre de 2004 y septiembre de 2006 (Giraud et al. [2008] *Biodiversity and Conservation* 17: 1251-1265).

Comentarios: Es llamativa la ausencia de registros documentados en nuestro país, ya que la especie es de presencia regular en el área Cataratas del PN do Iguacu, Brasil (ebird.org).

■ SUIRIRÍ GARGANTA BLANCA | *Tyrannus albogularis*

Distribución: Desde el S de Venezuela y las Guayanas hasta el S de Brasil y N de Bolivia. La población austral migra al O de Amazonas durante el invierno (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Dante Meller en la costa brasileña del río Uruguay frente al PP Moconá, Misiones el 9 de noviembre de 2020 (wikiaves.com.br/4081287). Al parecer el ave luego cruzó hacia territorio argentino, aunque no pudo ser documentada.

Comentarios: Recientemente registrada en Calera del Rey, departamento Maldonado, Uruguay (ecoregistros.org/site/imagen.php?id=416630).

■ DORMILONA ENANA | *Muscisaxicola fluviatilis*

Distribución: Al O de la Amazonía hasta los 800 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 23 de septiembre de 1905 (Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366; Esteban [1953] *Acta Zoológica Lilloana* 13: 349-362). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Avelano *in litt.*).

2. Un macho colectado por Miguel Lillo en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 18 de noviembre de 1905 (Esteban [1953] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Avelano *in litt.*).

3. Un ejemplar colectado por Miguel Lillo en “Tucumán” en agosto de 1908 (Dabbene [1914] *op. cit.*). El espécimen (MACN-Or-7968a) se encuentra depositado en el MACN.

4. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 14 de noviembre de 1911 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Esteban [1953] *op. cit.*). El espécimen no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Avelano *in litt.*).

5. Un ejemplar colectado por Emilio Budin en Maimará, departamento Tilcara, Jujuy el 17 de enero de 1912 (Dabbene [1914] *op. cit.*; Esteban [1953] *op. cit.*). Este espécimen (COFML-00038) fue reidentificado como DORMILONA CHICA *Muscisaxicola maculirostris* y se encuentra depositado en la COFML.

6-7. Dos ejemplares (un macho y una hembra) colectados por Emilio Budin en Laguna del Paredón, Jujuy el 13 y 24 marzo de 1912 (Esteban [1953] *op. cit.*). El ejemplar hembra del 24 de marzo (MACN-Or-38150) se encuentra depositado en el MACN, mientras que el restante no pudo ser hallado en la COFML (Sebastián Avelano *in litt.*).

8. Una hembra colectada por Claës Olrog y Octavio Budin en Abra Pampa, departamento Cochinoca,

Jujuy el 30 de mayo de 1949 (Esteban [1953] *op. cit.*). El ejemplar (COFML-5999) fue reidentificado como *M. maculirostris* y se encuentra depositado en la COFML.

9. Registrada por Manuel Nores en Tilcara, departamento homónimo, Jujuy en el año 1978 (M. Nores en Olrog [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

Comentarios: Charles Hellmayr había confirmado la identificación del espécimen de Tucumán como *Muscisaxicola fluviatilis* (Dabbene [1914] *op. cit.*). Sin embargo Smith & Vuilleumier ([1971] *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 141: 179-268) reidentifican cuatro especímenes como *Muscisaxicola maculirostris*, y sospechan que el restante también pertenecería a esta especie. Ver discusión en Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions). Es altamente improbable la presencia de esta especie amazónica en los Andes áridos del noroeste argentino.

■ ZORZALITO CARA GRIS | *Catharus minimus*

Distribución: Nidifica en una extensa franja del N de Canadá, Alaska y extremo oriental de Rusia. Luego de la etapa reproductiva ocupa el NO de Sudamérica hasta el N de Bolivia y SE de Perú (Whitaker [2020] en Rodewald [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Un individuo observado por Luis Pagano sobre la ruta provincial n°83 entre Abra Honda y Abra Colorada, departamento Valle Grande, Jujuy el 3 de enero de 2018 (Pagano & Bodrati *en prep.*).

■ ZORZALITO ROJIZO | *Hylocichla mustelina*

Distribución: Nidificante en una extensa región del E de Estados Unidos y extremo SE de Canadá. Luego de la etapa reproductiva migra hacia el S de México y Centroamérica (Evans *et al.* [2020] en Poole [editor] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Registros: 1. Un ejemplar capturado en Puerto Stanley, islas Malvinas en febrero de 1970 (Roger Tory Peterson en Olrog [1972] *Acta Zoológica Lilloana* 26: 257-264). El espécimen se encuentra perdido en la actualidad.

Comentarios: Para mayores detalles sobre este registro ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ CACHILO SABANERO | *Ammodramus aurifrons*

Distribución: Mayormente en la Amazonia, extendiéndose al norte a través del río Orinoco (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione en Campo Cauzutí, departamento General José de San Martín, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt.*).

■ ARAÑERO DE AGUA | *Parkesia noveboracensis*

Distribución: Se reproduce en una amplia región desde Alaska hasta el E de Canadá. Luego migra hacia el S de México, el Caribe, Centroamérica y N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un individuo observado por Flavio Moschione, María Inés López, Cristina López e Isabel Barrios en el PP Pereyra Iraola, Buenos Aires el 26, 27 y 28 de agosto de 1988 (Moschione [1988] *Garganchillo* 7: 14-15).

Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Seiurus noveboracensis* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

■ REINITA PEREGRINA | *Leiothlypis peregrina*

Distribución: Se reproduce en una extensa región de Canadá. Luego de la etapa reproductiva realiza una migración a través del E de Estados Unidos hasta el S de México, Centroamérica y NO de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un individuo en plumaje no reproductivo observado por Juan I. Areta y Gabriel Núñez en la cuesta del Obispo, departamento Chicoana, Salta el 29 de marzo de 2013 (Areta *en prep.*).

Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Vermivora peregrina* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

Comentarios: Un ejemplar errante capturado y fotografiado en Putre, Tarapacá, Chile el 17 de noviembre de 1996 (Torres-Mura & Hertel [2006] *Cotinga* 26: 8-9).

■ PITIAYUMÍ BOREAL | *Setophaga americana*

Distribución: Su área de reproducción se restringe al E de Canadá y Estados Unidos. Luego realiza una corta migración hacia el S de México y las islas del Caribe (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Mencionada como “bastante común” en El Cantadero, departamento Capital, La Rioja entre los años 1981 y 1987 (Nores & Cerana [1990] *Revista Chilena de Historia Natural* 63: 37-48).

2. Un individuo observado por Alejandro Bodrati en la Reserva Itahovy, departamento Guaraní, Misiones el 23 de noviembre de 2016 (Pagano & Bodrati *en prep.*).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Parula* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

Comentarios: La mención para El Cantadero, La Rioja probablemente sea sólo un error de tipeo, ya que en la lista no se incluye a su congénere local el PITIAYUMÍ *Setophaga pitayumi*.

■ ARAÑERO PETEQUIA | *Setophaga petechia*

Distribución: Se reproduce en casi todo el territorio de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente migra a través de México y el Caribe hasta Centroamérica y el N de Sudamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Un individuo observado al este de la provincia de Chubut, sin mayores detalles (Pearman & Areta [2020] *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm Field Guides).

Taxonomía: El ave registrada pertenecería a la subespecie *aestiva* (Pearman & Areta [2020] *op. cit.*).

■ ARAÑERO DE WILSON | *Cardellina pusilla*

Distribución: Se reproduce en una extensa región de Alaska, Canadá y NO de Estados Unidos. Luego migra hacia el S de México y Centroamérica (Stephenson & Whittle [2013] *The Warbler Guide*. Princeton University Press.).

Registros: 1. Dos individuos observados en el sector Los Morados del cerro Negro, departamento San Antonio, Jujuy en abril de 2008 (Moschione & González [2009] *Relevamiento de Fauna en Finca Cerro Negro*. Proyecto PRECODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy; González *et al.* [2011] *XIV Reunión Argentina de Ornitología*. Formosa).

Taxonomía: Conocida tradicionalmente como *Wilsonia pusilla* (Sibley [2000] *The Sibley Guide to Birds*. Alfred Knopf Inc.).

■ ARAÑERO GARGANTA NEGRA | *Myioborus miniatus*

Distribución: Andes desde el N de Venezuela hasta el S de Bolivia entre los 700-2500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Alejandro Di Giacomo en el PN Baritú, Salta el 17 de agosto de 1993 (Di Giacomo [1995] *Hornero* 14: 77-78).

2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Baritú, Salta sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).

Comentarios: El individuo mencionado por Flavio Moschione y José Segovia para la RP Las Lancitas, Jujuy el 29 de enero de 2004 (Segovia & Moschione [2005] *XI Reunión Argentina de Ornitología*. Buenos Aires), fue posteriormente reidentificado como juvenil de ARAÑERO CORONA ROJIZA *Myioborus bruniceps* (J. Segovia *com. pers.*).

■ SAÍ GRIS | *Conirostrum cinereum*

Distribución: Andes desde el S de Colombia hasta el N de Chile y O de Bolivia, mayormente entre los 2500-4000 msnm. En Perú y Chile habita localmente a nivel del mar (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Dos machos vocalizando observados por Flavio Moschione en Purmamarca, departamento Tumbaya, Jujuy sin fecha (F. Moschione *com. pers.*).

■ YAL GARGANTA BLANCA | *Idiopsar erythronotus*

Distribución: Local en los altos Andes del S de Perú, N de Chile y SO de Bolivia, entre los 3600-4700

msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Una pareja observada por Flavio Moschione en el paso Socompa, departamento Los Andes, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt.*).

Taxonomía: En una reciente revisión de la familia Thraupidae, Burns *et al.* ([2016] *Zootaxa* 4088: 329-354) proponen el género *Idiopsar* para *Phrygilus erythronotus*. Esta propuesta fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop730.htm).

Comentarios: La mención de Johan Mogensen ([1930] *Argentinæ dyr*. Graebes Bogtrykkeri) para el Aconquija, Tucumán se refiere al COMESEBO PUNENO *Idiopsar dorsalis*.

■ DIUCA ALA BLANCA | *Idiopsar specularifer*

Distribución: Altos Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y O de Bolivia, entre los 4000-5300 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Una pareja y un nido con huevo hallados por Gunnar Höy en la serranía de Tres Cruces, departamento Humahuaca, Jujuy en febrero de 1973 (Höy [1976] *Physis. Sección C* 35: 205-209).

2. Dos individuos observados por Mario Mosqueira cerca del abra del Cóndor (22°53'38"S 65°16'34"W), departamento Humahuaca, Jujuy en mayo de 1997 (M. Mosqueira *in litt.*).

3. Dos individuos observados por Jorge Baldo y Yanina Arzamendia cerca de Alfarcito (23°19'S 65°58'W), departamento Cochínoca, Jujuy el 24 de septiembre de 2008 (J. Baldo *in litt.*).

4. Un individuo observado por Flavio Moschione en Esquina Blanca, departamento Humahuaca, Jujuy sin fecha (dato mencionado en ebird.org/checklist/S68576872).

5. Una pareja observada por Flavio Moschione al norte del abra del Acay, Salta sin fecha (dato mencionado en ebird.org/checklist/S68576872).

6. Un individuo observado por Flavio Moschione en Corral Colorado, departamento Los Andes, Salta el 30 de abril de 2020 (ebird.org/checklist/S68576872).

Taxonomía: En una reciente revisión de la familia Thraupidae, Burns *et al.* ([2016] *Zootaxa* 4088: 329-354) erigen el nuevo género *Chionodacryon* para *Diuca specularifera*. Seguimos las opiniones del SACC, quienes prefieren utilizar por el momento el género *Idiopsar* para este taxón (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop730.htm).

Comentarios: Varios nidos hallados en un glaciar de la cordillera Vilcanota, departamento Cuzco, Perú (Hardy & Hardy [2008] *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 613-617; Castañeda [2015] *Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú* 10: 40-41).

■ PAYADOR VIENTRE GRIS | *Diglossa carbonaria*

Distribución: Endémica de los Andes de Bolivia entre los 2500-4000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Dos individuos observados por Flavio Moschione y Javier San Cristóbal en el arroyo Sansana, departamento Yavi, Jujuy el 6 de enero de 1988 (Moschione & San Cristóbal [1993] *Hornero* 13: 107).

Comentarios: En las colecciones de Fritz Schulz se encuentra un ejemplar de *Diglossa* sin datos, identificado por Charles O'Brien como perteneciente al grupo *carbonaria*. Gunnar Höy lo reidentifica como *Diglossa humeralis aterrima*, sospechando que el ave pudo haber sido obtenida por Gustavo Niederlein en la provincia de Misiones (Höy [1973] *Physis. Sección C* 32: 222-223). El espécimen se encuentra actualmente depositado en el MZUC, aunque es altamente improbable que provenga de dicha provincia.

■ AFRECHERO PIZARRA | *Haplospiza rustica*

Distribución: Andes desde Venezuela hasta Bolivia, mayormente entre los 1500-3000 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Al menos dos individuos observados por Flavio Moschione a la vera del río Bermejo en Candado Chico cerca de El Arrazayal, departamento Orán, Salta sin fecha (Moschione *et al.* [2014] *Lista de aves de Salta*. Ministerio de Cultura y Turismo; F. Moschione *in litt.*).

■ CORBATITA OLIVÁCEO | *Sporophila frontalis*

Distribución: Endémica de la región SE de Brasil llegando al extremo NE de Argentina y E de Paraguay, mayormente entre los 800-1500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Bertoni [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102).

2. Un individuo anillado por Arturo Tarak en el PN Iguazú, Misiones en septiembre de 1978 (A. Tarak *en Olrog* [1979] *Opera Lilloana* 27: 1-324).

3. Un individuo observado por Ernesto Krauczuk en el PP Esmeralda, Misiones el 25 de agosto de 1993 (E. Krauczuk *en Chebez* [1994] *Los que se van*. Albatros; Chebez & Casañas [2000] *Áreas Claves para la Conservación de la Biodiversidad de la Provincia de Misiones, Argentina*. Puerto Iguazú).

4. Dos individuos observados por Christian Savigny en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 19 de mayo de 2004 (C. Savigny *en Areta et al.* [2009] *Biotrópica* 41: 66-73; Savigny [2010] *Nuestras Aves* 55: 20-22).

5. Un individuo cantando observado por Javier Heredia en el PP Caragatatay, Misiones el 17 de octubre de 2006 (J. Heredia *in litt.*).

6. Un individuo observado por Juan I. Areta e Ignacio Roesler en el PN Iguazú, Misiones el 16 de enero de 2008 (Areta *et al.* [2009] *op. cit.*). El mismo parecía tener un plumaje subadulto no definitivo, ya que presentaba una coloración algo diluida (I. Roesler *in litt.*).

Comentarios: La falta de conocimiento en las variaciones de plumaje del CORBATITA PICUDO *Sporophila falcirostris* podría generar confusiones al momento de identificar esta especie.

■ CORBATITA PLOMIZO | *Sporophila plumbea*

Distribución: La población más cercana a Argentina ocupa una extensa región del S de Brasil, N de Bolivia y E de Paraguay hasta los 1400 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Entre Ríos (Zelich [1977] *Revista Ser. Escuela Nacional Superior Mariano Moreno* 19: 85-95).

2. Un individuo observado por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones el 13 y 14 de diciembre de 1982 (F. Moschione en Chebez [1994] *Los que se van*. Albatros; Mazar Barnett & Pearman [2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

3. Registrada por Flavio Moschione en el PN Iguazú, Misiones en enero de 1985 (F. Moschione en Chebez [1994] *op. cit.*).

4-5. Registros sin confirmar en los departamentos San Pedro y Cainguás, Misiones en los años 1983 y 1988 (Chebez [1996] *Fauna Misionera*. LOLA; Juan C. Chebez en Mazar Barnett & Pearman [2001] *op. cit.*).

6. Una pareja observada por Eduardo Militello en el PN Iguazú, Misiones el 20 de octubre de 2002 (Militello & Chebez [2009] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 32: 1-5).

Taxonomía: Una forma de pico amarillo que se reproduce en el sur de Brasil fue recientemente descrita como una especie diferente, CORBATITA DE BELTON *Sporophila beltoni* (Repenning & Fontana [2013] *Auk* 130: 791-803). Las observaciones de Argentina no tienen detalle suficiente como para asignarlas a una forma determinada.

Comentarios: Roberto Dabbene ([1914] *Physis* 1: 293-366) incluye a *Sporophila plumbea* para la provincia de Misiones aludiendo a las publicaciones de Bertoni ([1901] *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1-213; [1913] *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75: 64-102). Este último autor coleccionó un ejemplar en Puerto Bertoni, Paraguay el 14 de abril de 1899 y lo describió con el nuevo nombre de *Spermophila aurantirostris*. Dicho espécimen se encuentra perdido y su identidad fue recientemente discutida por Repenning & Fontana ([2013] *op. cit.*), quienes concluyen que muy probablemente correspondía al CORBATITA BLANCO *Sporophila leucoptera*.

Un ejemplar inmaduro colectado en Recreo, departamento La Capital, Santa Fe el 25 de febrero de 1942 (Martínez Achenbach ([1957] *Anales del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*. Tomo I. Zoología). Este espécimen (MFA-ZV-793) fue luego reidentificado como CAPUCHINO CANELA *Sporophila hypoxantha* (Ordano & Bosisio [2001] *Serie Catálogos* 7: 1-118). Más tarde, Fandiño & Giraudo ([2012] *Ornitología Neotropical* 23: 467-488) suponen que el mismo podría corresponder tanto a *Sporophila hypoxantha* como al CAPUCHINO CASTAÑO *Sporophila hypochroma*. La inclusión para el PN Iguazú, Misiones probablemente se refiera a las observaciones mencionadas (Saibene et al. ([1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

■ CORBATITA GARGANTA BLANCA | *Sporophila albogularis*

Distribución: Restringida al NE de Brasil incluyendo el estado de Bahía, hasta los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un ejemplar fotografiado por Iván Eroles en la reserva natural Isla Verde, partido de Morón, Buenos Aires el 19 de mayo de 2019 (ebird.org/checklist/S56533567). El ave permaneció varios días en el sitio y pudo ser registrada por otros observadores (ebird.org; ecoregistros.org).

Comentarios: A pesar de la abundante evidencia existen serias dudas con respecto al origen del ave. La especie es probablemente residente, y los registros de Minas Gerais y Espírito Santo fueron considerados como ejemplares escapados de cautiverio (Jaramillo [2020] en del Hoyo et al. [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

■ FRUTERO CANELA | *Schistochlamys ruficapillus*

Distribución: Extensa región del E de Brasil, mayormente por debajo de los 1200 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Un individuo observado por Davis Finch en el PN Iguazú, Misiones el 26 de octubre de 1994 (Abadie [1996] *Cotinga* 5: 76-77).

2. Un individuo (quizás el mismo de la observación anterior) observado por Miguel Castelino en el PN Iguazú, Misiones el 5 de noviembre de 1994 (Abadie [1996] *op. cit.*; Saibene *et al.* [1996] *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. LOLA).

3. Una pareja observada por Esteban Abadie en Colonia Almirante Brown (actualmente Colonia Andresito), departamento General Manuel Belgrano, Misiones el 13 de septiembre de 1995 (Abadie [1996] *op. cit.*).

4. Dos individuos observados por Daniel Almirón en el PN Iguazú, Misiones el 1 y 3 de julio de 2000 (ebird.org/checklist/S17572261).

■ SAÍRA ESPALDA NEGRA | *Stilpnia peruviana*

Distribución: Restringida a la costa del SE de Brasil hasta los 700 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Registros: 1. Mencionada sin detalles para la provincia de Misiones (Dabbene [1914] *Physis* 1: 293-366).

2. Un macho colectado por Aguirre en “Buenos Aires” en febrero de 1910 (Dabbene [1914] *op. cit.*). El espécimen habría sido depositado en el MACN, pero al parecer se encuentra perdido en la actualidad (Yolanda Davies *com. pers.*).

Taxonomía: Tradicionalmente en el género *Tangara* (Ridgely & Tudor [2009] *op. cit.*).

Comentarios: No es posible descartar que el espécimen perdido haya correspondido a un ejemplar escapado de cautiverio.





ESPECIES ELIMINADAS Y NO ACEPTADAS

Algunas especies han sido recientemente mencionadas para la avifauna argentina, pero por diversos motivos no fueron aceptadas por la comunidad ornitológica o se discuten en el presente trabajo. Se tratan además cambios taxonómicos, errores de identificación y especímenes mal determinados. *Netta erythrophthalma* e *Hylocharis sapphirina* también fueron excluidas de la lista principal y se discuten en la sección Hipotéticas. Para otras especies erróneamente mencionadas en la literatura ver Mazar Barnett & Pearman ([2001] *Lista Comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions).

■ BURRITO CUYANO | *Laterallus jamaicensis*

Distribución: En parches desde Estados Unidos hasta Sudamérica a través de la costa del Pacífico. La subespecie *salinasi* en el centro de Chile (Taylor [1996] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Lynx Edicions).

Comentarios: Especie eliminada. No existe evidencia concreta que certifique la presencia de esta especie en Argentina, todos los registros dentro del territorio pertenecerían al BURRITO NEGRUZCO *Porzana spiloptera* (Straneck [1999] *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 1: 173-180; Pagano et al. [2011] *Neotropical Birding* 8: 40-43; López-Lanús et al. [2012] *Hornero* 27: 183-188).

■ PAÍÑO DE ELLIOT | *Oceanites gracilis*

Distribución: Aguas frías de la corriente de Humboldt entre Ecuador y el centro de Chile, incluyendo las islas Galápagos (Onley & Scofield [2010] *Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World*. Princeton University Press).

Taxonomía: La subespecie *galapagoensis* a veces se considera una especie separada, sin embargo la superposición de medidas y la falta de características consistentes sugieren que debe mantenerse como subespecie de *Oceanites gracilis* (Onley & Scofield [2010] *op. cit.*).

Comentarios: Especie eliminada. Mark Pearman ([2000] *Hornero* 15: 141-143) analiza dos especímenes del MACN publicándolos como los primeros *Oceanites gracilis* de Argentina. Actualmente esos mismos ejemplares son los paratipos de una nueva especie descrita para el centro y sur de Chile, PAÍÑO PINCOYA *Oceanites pincoyae* (Harrison et al. [2013] *Auk* 130: 180-191; ver *Oceanites pincoyae*).

■ PICAFLOR SOMBRÍO | *Eupetomena cirrochloris*

Distribución: Endémica del E de Brasil, desde Goiás hasta Rio Grande do Sul (Schuchmann [1999] en del Hoyo et al. [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Taxonomía: Anteriormente en el género *Aphantochroa* (Rodríguez Mata et al. [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins).

Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones el 30 de abril de 2001 (Chebez et al. [2004]



Figuras 113-114. Picaflor Esmeralda *Chrysuronia versicolor*, Puerto Iguazú, Misiones, 30 de abril de 2001 (Roberto Güller)

Hornero 19: 1-5; Anónimo [2005] *Nuestras Aves* 49: 11). Las fotografías se encuentran depositadas en el archivo de imágenes de Aves Argentinas/AOP y no corresponden a esta especie (Figuras 113-114). La combinación de caracteres de plumaje es asignable al PICAFLOR ESMERALDA *Chrysuronia versicolor* (Juan I. Areta y Vitor de Q. Piacentini *in litt.*). Además, Ignacio Roesler observó al ejemplar en el sitio identificándolo como un joven de *C. versicolor* (I. Roesler *in litt.*).

■ PICAFLOR FAJA BLANCA | *Chrysuronia brevirostris*

Distribución: Restringida a Venezuela, extremo N de Brasil y las Guayanas (Schuchmann [1999] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 5. Lynx Edicions).

Taxonomía: Anteriormente incluida en el género *Amazilia* (Rodríguez Mata *et al.* [2006] *Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Harper Collins). Chebez *et al.* ([2008] *Las Ciencias* 1: 67-81) sugieren que las aves de vientre blanco registradas en Puerto Iguazú y en el PN Iguazú, Misiones corresponden a *Amazilia (versicolor) brevirostris*. Estos autores elevan el taxón *brevirostris* a nivel específico, y proponen que las aves del norte de Sudamérica sean tratadas como *Chrysuronia chionopectus* (Chebez *et al.* [2008] *op. cit.*).

Comentarios: No aceptada. Tal como lo mencionan los autores citados, se requieren mayores estudios para entender la variación de plumaje descripta. Por el momento la evidencia aportada no es concluyente, y probablemente corresponda a variaciones del PICAFLOR ESMERALDA *Chrysuronia versicolor* (L. Pagano *obs. pers.*; Juan I. Areta *in litt.*).

■ CARPINTERITO OCELADO | *Picumnus dorbignyanus*

Distribución: Poblaciones disjuntas en los Andes del centro de Perú y Bolivia (Winkler & Christie [2002] en del Hoyo *et al.* [editores] *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 7. Lynx Edicions).

Taxonomía: Descripta por Frédéric de Lafresnaye ([1845] *Revue Zoologique* 8: 1-10) en base a un espécimen de Bolivia sin localidad precisa.

Comentarios: Especie eliminada. A pesar de las numerosas menciones en la literatura, por el momento se desconoce evidencia alguna que confirme la presencia de esta especie en territorio nacional (ver *Taxa No Asignados a Nivel de Especie*).

■ BANDURRITA PUNEÑA | *Upucerthia jelskii*

Distribución: Andes desde el centro de Perú hasta el N de Chile y NO de Argentina, mayormente entre los 3500-4500 msnm (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Especie eliminada. Seguimos el tratamiento de Areta & Pearman ([2013] *Condor* 115: 131-142), quienes consideran que la BANDURRITA ANDINA *Upucerthia validirostris* y la BANDURRITA PUNEÑA *Upucerthia jelskii* representan una sola especie con vocalizaciones similares y variación clinal en su morfología.

■ REMOLINERA DE LENGA | *Cinclodes lopezlanusorum*

Distribución: Endémica de los bosques de lenga en la región austral de Chile y Argentina (López-Lanús [2019] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

Taxonomía: No aceptada. Recientemente descrita como especie nueva en una publicación sin revisión (López-Lanús [2019] *op. cit.*). Esta población es vocal y morfológicamente indistinguible de la REMOLINERA PARDA *Cinclodes fuscus*. Las mínimas diferencias expuestas por López-Lanús ([2019] *op. cit.*) son insuficientes para tratarla como especie válida, y la propuesta no fue aceptada por el SACC (museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop846.htm).

■ CACHIRLA GRANDE | *Anthus antarcticus*

Distribución: Endémica de las islas Georgias del Sur en el océano Atlántico (Tyler [2020] *en del Hoyo et al. [editores] Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Taxonomía: Especie eliminada. Descrita por Jean Cabanis ([1884] *Journal für Ornithologie*: 32: 252-254) en base al material obtenido durante la expedición alemana entre los años 1882 y 1883. Considerada especie válida por casi todos los autores, aunque trabajos moleculares recientes sugieren que este taxón debería considerarse como una subespecie de la CACHIRLA GOTEADA *Anthus correndera* (Van Els & Norambuena [2018] *Ibis* 160: 158-172; Norambuena *et al.* [2018] *PeerJ* 6: e5886). Si bien las aves de Georgias del Sur tienen pocas diferencias con *Anthus correndera grayi*, el canto difiere de otras especies de *Anthus* (Van Els & Norambuena [2018] *op. cit.*).

■ CAPUCHINO DE COLLAR | *Sporophila zelichi*

Distribución: Nidifica localmente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y luego migra hacia el norte llegando a Paraguay y Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Taxonomía: Descrita en base a dos especímenes y dos ejemplares en cautiverio provenientes de los departamentos Colón y Concordia, Entre Ríos (Narosky [1977] *Hornero* 11: 345-348).

Comentarios: Especie eliminada. Nuevos estudios demostraron que algunos capuchinos del género *Sporophila* poseen fases de coloración. Actualmente se considera a "*Sporophila zelichi*" como una forma fenotípicamente distinta del CAPUCHINO PECHO BLANCO *Sporophila palustris* (Areta [2008] *Journal of Field Ornithology* 79: 352-363).

■ CAPUCHINO DEL PANTANAL | *Sporophila nigrorufa*

Distribución: Muy localizada en el E de Bolivia y SO de Brasil (Ridgely & Tudor [2009] *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press).

Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Roberto Güller en el PN Lihue Calel, La Pampa el 14 de enero de 2008 (Güller [2008] *Nótulas Faunísticas. Segunda Serie* 20: 1-3). Seguimos las opiniones vertidas por Guy Kirwan y Juan I. Areta ([2009] *Neotropical Birding* 4: 69-72), quienes cuestionan la identificación y el origen del ave.

■ CAPUCHINO COBRIZO | *Sporophila bouvreuil*

Distribución: Ampliamente distribuida en el E de Brasil hasta Minas Gerais y São Paulo (Machado & Silveira [2010] *Papéis Avulsos de Zoologia* 50: 517-533).

Taxonomía: El CAPUCHINO BOINA NEGRA *Sporophila bouvreuil pileata* fue tradicionalmente incluida en la avifauna argentina (Dabbene [1915] *Physis* 1: 532-533; Zotta [1944] *Hornero* 8: 481-483). En una reciente revisión taxonómica, la forma *pileata* fue elevada a rango específico (Machado & Silveira [2010] *op. cit.*; Machado & Silveira [2011] *Zootaxa* 2781: 49-62), siendo hasta ahora el único taxón del complejo que habita nuestro país.

Comentarios: No aceptada. Un ejemplar fotografiado por Aníbal Parera, Carlos Figuerero y Horacio Cardozo al norte de Mercedes, departamento homónimo, Corrientes el 4 de enero de 2008 (Chebez [2009] *Otros que se van*. Albatros; Machado & Silveira [2010] *op. cit.*; Figura 115). La identificación del ave fue motivo de discusión, y bien podría corresponder a un CAPUCHINO CORONA GRIS *Sporophila cinnamomea* con melanismo en la corona o quizás un híbrido entre *Sporophila cinnamomea* x *Sporophila pileata* (Areta et al. [2016] *PLoS ONE* 11: 10.1371/journal.pone.0154231).



Figura 115. Capuchino *Sporophila* sp., Mercedes, Corrientes, 4 de enero de 2008 (Aníbal Parera)

■ CORBATITA DE DUBOIS | *Sporophila ardesiaca*

Distribución: Residente en el E de Brasil desde Bahia hasta São Paulo (Jaramillo [2020] *en del Hoyo et al.* [editores] *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology).

Taxonomía: De estatus taxonómico incierto, esta especie podría representar un morfo del CORBATITA AMARILLO *Sporophila nigricollis* o quizás un híbrido entre ésta última y el CORBATITA *Sporophila caerulescens* (Jaramillo [2020] *op. cit.*).

Comentarios: No aceptada. Un macho fotografiado por Antonio Canz y Diego Ortiz en el dique Celestino Gelsi de la localidad El Cadillal, departamento Tafi Viejo, Tucumán el 11 de enero de 2020. El mismo permaneció en la zona hasta mediados de marzo de ese año (Canz & Ortiz [2020] *EcoRegistros Revista* 10: 13-16). El plumaje y el contexto de este registro dejan dudas con respecto a la identificación del ejemplar, incluso los autores especulan que podría tratarse de un morfo de *Sporophila caerulescens*.

■ JILGUERO VENTANERO | *Sicalis holmbergi*

Distribución: Endémica del sistema serrano de Ventania en el SO de la provincia de Buenos Aires (López-Lanús [2017] *Guía Audiornis de las Aves de Argentina*. Audiornis Producciones).

Taxonomía: Recientemente descrita como especie nueva en una publicación sin revisión (López-Lanús [2017] *op. cit.*). Esta propuesta no fue reconocida por el SACC, ya que en realidad se trataría de una

población aislada del JILGUERO GRANDE *Sicalis auriventris* (Areta *et al.* [2012] *Condor* 114: 654-671; museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop748.htm).

Comentarios: No aceptada. Observada por Eduardo Holmberg en la sierra de Curamalal, partido de Saavedra, Buenos Aires durante diciembre de 1883 (Holmberg [1884] *La sierra de Curá-Malal. Informe presentado al excelentísimo señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha*. Buenos Aires). Al parecer los especímenes colectados en esta expedición se encuentran perdidos. Existe un espécimen colectado por Merkle en “Curamalán Chico”, Buenos Aires en julio de 1925 (MLP-Or-5742). Samuel Narosky, Sergio Salvador y Carlos Saibene encuentran un *Sicalis* en el cerro Curamalal en noviembre de 1983, asumiendo que son los primeros registros del JILGUERO AUSTRAL *Sicalis lebruni* para la provincia de Buenos Aires (Narosky *et al.* [1984] *Hornero* 12: 209-211). A partir de allí, casi todas las publicaciones posteriores mencionan a *Sicalis lebruni* como residente y nidificante en el sistema serrano de Ventania (Narosky & Di Giacomo [1993] *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA & Vázquez Mazzini).





APÉNDICE 1

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS