

Guía práctica sobre la plaga de filoxera en Canarias

Índice

1 Plaga de filoxera en Canarias

- 1.1 Detección del brote
- 1.2 Información general sobre la filoxera

2 Medidas fitosanitarias y responsables de aplicarlas

- 2.1 Zona infestada
 - En parcelas afectadas
 - En parcelas no afectadas
- 2.2 Zona tampón

3 Instrucciones para el movimiento de uva fresca

- 3.1 Movimientos prohibidos sin excepción
- 3.2 Movimientos permitidos sin necesidad de autorización
- 3.3 Movimientos permitidos con autorización
- 3.4 Documentos necesarios para recibir la autorización
- 3.5 Instrucciones para transportar uva fresca
- 3.6 Prioridad de las normas de las D.O.P. locales

4 Instrucciones para el movimiento de material vegetal de la vid, maquinaria e instrumentos de trabajo

5 Tratamientos para restos de uva en bodega

6 Normativa e información auxiliar

7 Anexos

Anexo I: Guía de movimiento de uva fresca

Anexo II: Acta de inspección que certifica la ausencia de síntomas de filoxera en viñedo

Anexo III: Medidas preventivas y de gestión de riesgos para realizar actividades enoturísticas

**1**

2

3

4

5

6

7

1

Plaga de filoxera en Canarias

1.1 Detección del brote

1.2 Información general sobre la filoxera



**1**

2

3

4

5

6

7

Plaga de filoxera en Canarias

1.1 Detección del brote


El 30 de julio de 2025 se confirmó la presencia de filoxera de la vid en Tacoronte-Acentejo (Tenerife). El 20 de agosto, una [Orden emitida por el Gobierno de Canarias](#) declaró la plaga en la zona.

1.2 Información general sobre la filoxera

¿Qué es y cómo actúa?

Este insecto es un pulgón pequeño, de entre 0,3 y 1,4 mm, que habita en hojas y raíces de la vid. Aunque no daña directamente a la uva fresca, su presencia en las raíces puede provocar la muerte de la parra o viñedo en un periodo de 2 a 5 años. Si no se controla la plaga, puede propagarse en los viñedos, poniendo en riesgo la producción vinícola.

[+ Más información técnica](#)



[Ciclo vital de la Filoxera a lo largo del año.](#)
Ilustración del Instituto de Biología de la Universidad Humboldt,
[Wikimedia commons.](#)

¿Cuáles son los síntomas?

En las hojas: en el haz se aprecian manchas entre amarillas y marrones (imagen 1), que se transforman en el envés en agallas abultadas de color verde o verde rojizas (imagen 2).



Imagen 1. Manchas amarillentas.
Fotografía de Peter Pike, Adobe Stock.



Imagen 2. Agallas abultadas verdes o verdes rojizas.
Fotografía de ok_fotoday, Adobe Stock.



**1**

2

3

4

5

6

7

En las raíces: se produce un engrosamiento amarillo, que genera una deformación característica en forma de pico de ave. Con el tiempo, esto causa el marchitamiento y la muerte de la planta (imagen 3).



Imagen 3. Bultos en forma de tubérculo en la raíz.
Fotografías Gobierno de Canarias.

¿Cómo se propaga?

La filoxera se dispersa de manera natural, por tierra de una planta a otra y a través del aire.

También se puede transmitir a causa de la actividad humana, con el transporte de material vegetal, frutos frescos, maquinaria, vehículos.



Si detectas o tienes sospechas de la presencia de la filoxera en tu viñedo, contacta inmediatamente con:

📞 **Teléfono:** 922 475 200

✉ **Correo:** transdgag.agricultura@gobiernodecanarias.org





1

2

3

4

5

6

7

2

Medidas fitosanitarias y responsables de aplicarlas

2.1 Zona infestada

2.2 Zona tampón



Medidas fitosanitarias y responsables de aplicarlas

El Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, los cabildos y las fuerzas del orden establecerán y supervisarán las medidas de prevención, control y erradicación de esta plaga.

Como parte de estas medidas para la campaña 2025, el Gobierno de Canarias ha establecido una **zona demarcada** alrededor de cada brote de filoxera detectado en la isla de Tenerife. Cada zona demarcada se compone de 2 partes:

- Una **zona infestada**, que abarca un radio de 500 m desde el brote.
- Una **zona tampón**, que abarca un radio de 1 km desde el brote.

Si se descubren más plantas afectadas por la filoxera en la zona demarcada, se cambiará el límite de cada zona y se definirán nuevas zonas infestadas y zonas tampón.

Para informar sobre la propagación de la plaga en el archipiélago, el Gobierno de Canarias ha creado un [mapa interactivo](#). A continuación, te presentamos una vista del mapa (imagen 4), donde se representan las zonas demarcadas y las parcelas, con distintos colores y símbolos:

- Cada área naranja representa una zona infestada.
- Cada área amarilla, una zona tampón.
- Los puntos verdes simbolizan parcelas no afectadas.
- Los puntos rojos, parcelas afectadas y ya tratadas.

PARA VER LAS ZONAS EN EL MAPA. SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES:


- 1 Haz clic en el icono  situado en la parte inferior del mapa (lista de capas).
- 2 Haz clic en «Prospecciones».
- 3 Selecciona «500 m» para visualizar las zonas infestadas.
- 4 Selecciona «1000 m» para visualizar las zonas tampón.



Si eres propietario de un viñedo o estás a cargo de transportar uva fresca, eres responsable de aplicar las medidas de esta Guía y de asumir los gastos derivados.

El incumplimiento de las medidas originará sanciones económicas, según la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal. En este caso, la Administración podrá intervenir y exigir los costes de la intervención fitosanitaria, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Imagen 4.
Vista del mapa interactivo de parcelas y municipios afectados por la filoxera.





1

2

3

4

5

6

7

2.1 Zona infestada

Esta área, de un radio de 500 m desde el brote, es donde se ha detectado la presencia de filoxera. Estas son las medidas que debes aplicar en ella:

En parcelas afectadas

Como propietario de una parcela afectada, debes:

- Permitir el acceso al personal del Gobierno de Canarias para que supervise o apoye la aplicación de las medidas fitosanitarias.
- Utilizar insecticidas autorizados en el Registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el control de áfidos (pulgones) en vid. El objetivo del uso de insecticidas es evitar la dispersión de la plaga.



¿En qué plantas aplicarlos?

En las afectadas.

En todas las del género *Vitis sp.* (el tipo de vid afectado por la filoxera), aunque no estén infestadas, en un radio de 500 m alrededor de cada brote.



¿Dónde aplicarlos?

En las hojas de las plantas.

En las raíces de las plantas.



¿Qué plantas hay que destruir?

- Destruir las plantas *in situ* (donde se encuentren). Si esto no es posible, debes destruirlas en un lugar habilitado dentro de la parcela.

Las afectadas o sospechosas de estarlo, incluidas sus raíces.

Todas las del género *Vitis sp.*, aunque no estén infestadas, en un radio de 50 m alrededor de la planta afectada o sospechosa de estarlo.



¿Cómo destruir las plantas?

- 1 Arranca las plantas y desvitaliza (mata) sus raíces con un tratamiento herbicida que evite el nacimiento de nuevos brotes.
- 2 Elimina las plantas, preferiblemente mediante quema o enterramiento profundo con compactación de suelo.
- 3 Coloca una malla antihierba en toda la superficie afectada.

Si has estado en alguna parcela afectada, no visites otra finca; además, desinfecta las herramientas de trabajo y la ropa, especialmente el calzado.

Por último, debes recordar que no puedes plantar vid en la zona infestada hasta pasados un mínimo de 12 meses desde que desaparezca la plaga de filoxera en ese terreno.



Ten en cuenta que es obligatoria la presencia de personal autorizado cuando destruyas las plantas.

Para solicitar su visita, contacta con el Gobierno de Canarias:

📞 **Teléfono:** 922 475 200

✉ **Correo:** transdgag.agricultura@gobiernodecanarias.org





1

2

3

4

5

6

7

En parcelas no afectadas

Como propietario de una parcela no afectada, debes:



Vigilar tus cultivos y comunicar inmediatamente la presencia o sospecha de la plaga al Gobierno de Canarias.



Permitir el acceso de un funcionario autorizado a tu parcela para que examine las plantas y tome muestras para su análisis.



Realizar los tratamientos preventivos correspondientes.

2.2 Zona tampón

Esta área, de un radio de 1 km desde el brote, es clave para evitar que la plaga se propague. Estas son las medidas que debes aplicar en ella:



Vigilar tus cultivos y comunicar inmediatamente la presencia o sospecha de la plaga al Gobierno de Canarias.




Permitir el acceso de un funcionario autorizado a tu parcela para que examine las plantas y tome muestras para su análisis.



Realizar los tratamientos preventivos correspondientes.

Fecha de actualización: 09/10/2025

¿Qué medidas fitosanitarias hay que realizar en la zona demarcada?



En toda la zona demarcada

Permitir el acceso a funcionarios autorizados para que supervisen la ejecución de las medidas fitosanitarias.

Como propietario, eres responsable de aplicar las medidas fitosanitarias y de asumir los gastos derivados.



Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias: 922 475 200 - informa.agricultura@gobiernodecanarias.org

FUENTE: Gobierno de Canarias

Imagen 5.
Infografía sobre medidas en la zona demarcada.



[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)

3

Instrucciones para el movimiento de uva fresca

- 3.1** Movimientos prohibidos sin excepción
- 3.2** Movimientos permitidos sin necesidad de autorización
- 3.3** Movimientos permitidos con autorización
- 3.4** Documentos necesarios para recibir la autorización
- 3.5** Instrucciones para transportar uva fresca
- 3.6** Prioridad de las normas de las D.O.P. locales





1

2

3

4

5

6

7

Instrucciones para el movimiento de uva fresca

En este apartado, se presentan las normas para el movimiento de uva fresca. Además, se detallan los documentos necesarios para obtener la autorización de movimiento.

3.1 Movimientos prohibidos sin excepción

- ✗ Prohibido el movimiento de uva fresca desde Tenerife hacia cualquier otra isla de Canarias.
- ✗ Prohibido el movimiento de uva fresca desde una Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) donde se haya declarado un brote de filoxera hacia otras D.O.P. donde no se haya declarado.
- ✗ Prohibido el movimiento de uva fresca donde se haya declarado un brote de filoxera hacia fuera de esa zona demarcada.

3.2 Movimientos permitidos sin necesidad de autorización

- ✓ Dentro de una D.O.P. sin focos declarados.

3.3 Movimientos permitidos con autorización

- ✓ Entre cualquier isla, excepto Tenerife, y desde cualquier isla hacia Tenerife.
- ✓ Dentro de una D.O.P. con foco.
- ✓ Entre distintas D.O.P. sin foco.
- ✓ Con origen (finca con la viña afectada) y destino (bodega) dentro de la zona demarcada.

3.4 Documentos necesarios para recibir la autorización

Para recibir la autorización de movimiento de uva fresca, debes obtener 2 documentos:



La **Guía de movimiento** (la encontrarás en el [Anexo I](#) de este documento) cumplimentada y firmada por el propietario de la parcela.



El **Acta de inspección**, (la encontrarás en el [Anexo II](#) de este documento), rellena y firmada por personal autorizado que certifique la ausencia de síntomas de la plaga en tu viñedo.



Recuerda que es obligatorio llevar tu autorización (Guía de movimiento + Acta de inspección) mientras transportas la uva.

El Gobierno de Canarias cancelará automáticamente tu autorización si aparece un brote de filoxera en cualquier punto del área de transporte.





1

2

3

4

5

6

7

3.5 Instrucciones para transportar uva fresca


- 1 Comprueba que los vehículos, los remolques y las cajas utilizados para el transporte estén limpios, así como libres de hojas, tierra y restos de sarmientos.
- 2 Evita que los vehículos y las cajas estén en contacto con la tierra de la parcela.
- 3 Transporta la uva en vehículos cerrados o protegidos con lona o malla antitrips (red con poros que impide la entrada de insectos).
- 4 Cuando cambies la uva de lugar, limpia el vehículo y las cajas.
- 5 Al final de la jornada, deja limpios los vehículos y las cajas. Asegúrate de que estén libres de cualquier resto de material vegetal o de posibles restos de tierra.
- 6 Supervisa que todas las personas que trabajan en el viñedo durante la vendimia limpien sus utensilios de trabajo cuando pasen de una parcela a otra.

3.6 Prioridad de las normas de las D.O.P. locales

A nivel territorial, la D.O.P. Islas Canarias incluye todas las D.O.P. del archipiélago. En el contexto de la plaga de filoxera, prevalecen las normas de las D.O.P., no las de la D.O.P. Islas Canarias.

Fecha de actualización: 09/10/2025

Normas para el movimiento de uva fresca en Tenerife en las denominaciones de origen protegidas (D.O.P.)



MOVIMIENTO EN D.O.P. SIN FOCO		MOVIMIENTO EN D.O.P. CON FOCO	
		EN CADA ZONA DEMARCADA	FUERA DE ZONA DEMARCADA
✓	Interno: permitido sin autorización previa.	✓	Interno: con autorización del Gobierno de Canarias.
✓	Externo: con autorización del Gobierno de Canarias.	✗	Externo: prohibido.

FUENTE: Gobierno de Canarias

Imagen 6. Infografía sobre el movimiento de uva fresca en Tenerife.



[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)

4

Instrucciones
para el
movimiento
de material
vegetal de la vid,
maquinaria
e instrumentos
de trabajo



Instrucciones para el movimiento de material vegetal de la vid, maquinaria e instrumentos de trabajo

Movimientos prohibidos sin excepción

 Ten en cuenta que las siguientes prohibiciones se aplican al material vegetal con hojas o raíces, así como al material de trabajo destinado a plantación o injerto.



Entre islas:

-  Prohibido el movimiento de material vegetal de cualquier género de vid, en todas sus formas (plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes, patrones).
-  Prohibido el movimiento de instrumentos de trabajo, equipos, maquinaria, remolques, cajas, entre otros, y suelo de viñedo.




Dentro de una isla:

-  Prohibido el movimiento de material vegetal de cualquier género de vid, en todas sus formas.
-  Prohibido el movimiento de instrumentos de trabajo, equipos, maquinaria, remolques, cajas, entre otros, y suelo de viñedo.

Fecha de actualización: 09/10/2025

Instrucciones para el movimiento de uva fresca, material vegetal, instrumentos de trabajo y maquinaria



La autorización se compone de 2 documentos:

- 

Guía de movimiento, que indica origen y destino de la uva.
- 

Acta de inspección, realizada y firmada por un técnico de Sanidad Vegetal.

 Es obligatorio que lleves tu autorización (Guía de movimiento + Acta de inspección) mientras transportas la uva.

FUENTE: Gobierno de Canarias


Imagen 7.
 Infografía sobre movimiento de uva fresca, material vegetal de la vid e instrumentos.



1

2

3

4

5

6

7

5

Tratamientos para restos de uva en bodega

Los residuos sólidos de la uva utilizada para hacer vino se convierten en restos que contienen hollejos, semillas o raspones. Con el fin de evitar riesgos fitosanitarios, está prohibido utilizar y trasladar estos restos en zonas con riesgo o presencia de filoxera sin haberlos desinfectado adecuadamente.

Para desinfectarlos, utiliza uno de estos 4 métodos:

- **Quema controlada:** primero, necesitas un informe favorable de tu Cabildo Insular para quemar los residuos; después recibirás la autorización de quema por parte de tu Cabildo Insular.
- **Compostaje controlado:** a 55 °C – 60 °C, y no lo reutilices en viñedos.
- **Destrucción por calor:** aplica un tratamiento en hornos o un secado al sol entre dos capas de cal viva.
- **Destilación:** puedes enviar el orujo a destilerías para obtener aguardientes u otros licores, ya que la fermentación y la destilación eliminan el riesgo fitosanitario.

Si eliges alguno de los 3 primeros métodos, aplícalo en la misma bodega. Si esto no es posible, hazlo lo más cerca que puedas de la bodega, para evitar la dispersión de la plaga.





1

2

3

4

5

6

7

6

Normativa e información auxiliar

- Orden de 20 de agosto de 2025, por la que se declara la existencia de la plaga «Daktulosphaira Vitifoliae Fitch», por un foco localizado en la comarca de Acentejo, isla de Tenerife, se califica de utilidad pública la lucha contra dicho insecto y se adoptan las medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación. Publicada en el [Boletín Oficial de Canarias](#) N° 166, de 22 de agosto de 2025.
- [Aclaraciones a la orden de 20 de agosto](#), emitidas por la Dirección General de Agricultura el 28 de agosto de 2025.
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. [Boletín Oficial del Estado](#), 21 de noviembre de 2002, núm. 279.
- Orden de 12 de marzo de 1987 establece las normas fitosanitarias para la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en las Islas Canarias. [Boletín Oficial del Estado](#), 25 de marzo de 1987, núm 72.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del [Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#).
- Grafcan. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Visorfiloxera. (s. f.). [Situación actual de la filoxera](#).
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. (s. f.). [Información técnica sobre la filoxera de la vid](#).
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.(s. f.). [Tratamiento al que debe ser sometido los restos de fruto de vid que han sido utilizados para la elaboración de los vinos en bodega](#).





1

2

3

4

5

6

7

7

Anexos

Anexo I

Guía de movimiento de uva fresca

Anexo II

Acta de inspección que certifica la ausencia de síntomas de filoxera en viñedo.

Anexo III

Medidas preventivas y de gestión de riesgos para realizar actividades enoturísticas.



GUÍA DE MOVIMIENTO DE UVA FRESCA (elegir solo una de las siguientes opciones):

- ☐ Entre islas, excepto Tenerife, y desde las islas hacia Tenerife.
- ☒ Dentro de una D.O.P. con foco y fuera de la zona demarcada.
- ☐ Entre distintas D.O.P. sin foco y fuera de la zona demarcada.
- ☐ Dentro de la zona demarcada.

 Origen de la uva	 Destino de la uva
Fecha de salida:	Fecha de llegada:
Isla:	Isla:
Nombre y apellidos del titular de la explotación:	Nombre y apellidos del titular de la bodega:
Correo electrónico y teléfono de contacto:	Dirección completa de la bodega (calle, número, municipio, código postal):
Dirección de la explotación:	
Localización de la explotación (ref SIGPAC Mun-Pol-Par-Rec): Códigos de referencia de SIGPAC: Municipio-Polígono-Parcela-Recinto.	
Zonas geográficas según Denominación de Origen Protegida (D.O.P.):	Zonas geográficas según Denominación de Origen Protegida (D.O.P.):

 Medio de transporte
Tipo de vehículo:
Matrícula:
Tipo de envase para el transporte de la uva:

Firma del titular de la explotación:	DNI:

Instrucciones para transportar la uva:

- Comprueba que los vehículos y las cajas utilizados para el transporte estén limpios, así como libres de hojas, tierra y restos de sarmientos.
- Evita que los vehículos y las cajas estén en contacto con la tierra de la parcela.
- Transporta la uva en vehículos cerrados o protégela con lona o malla antitrips (red con poros que impide la entrada de insectos).
- Cuando cambies la uva de lugar, limpia el vehículo y las cajas.
- Al final de la jornada, deja limpios los vehículos y las cajas. Comprueba que estén libres de cualquier resto de material vegetal o de posibles restos de tierra.
- Supervisa que todas las personas que trabajan en el viñedo en el momento de la vendimia limpien sus utensilios de trabajo cuando pasen de una parcela a otra.

ACTA DE INSPECCIÓN QUE CERTIFICA LA AUSENCIA DE SÍNTOMAS DE FILOXERA EN VIÑEDO

Fecha de la visita: / / 2025

Personal autorizado que realiza la visita:

.....

Nombre y apellidos del titular de la explotación:

Dirección de la explotación:

Localización de la explotación (ref SIGPAC Mun-Pol-Par-Rec):
Códigos de referencia de SIGPAC: Municipio-Polígono-Parcela-Recinto.

Destino de la cosecha:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

Esta explotación NO PRESENTA SÍNTOMAS relacionados con la presencia de la filoxera de la vid.

Firma del titular de la explotación:

DNI:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENOTURÍSTICAS

Control de los recorridos y desinfección:

Desinfecta calzados y objetos

- Instala puntos de bioseguridad en cada entrada y salida de las zonas de viñedo. En estos puntos, coloca pediluvios con un desinfectante homologado por la autoridad competente.
- Indica a los visitantes que limpien y desinfecten su calzado en esos puntos; y que hagan lo mismo con cualquier objeto que haya estado en contacto con el suelo.

Restringe el recorrido a los visitantes

- Supervisa que solo circulen por los senderos designados, miradores o áreas de degustación. El objetivo es reducir al mínimo el contacto directo con las cepas y el suelo.
- Coloca vallas o cintas que delimiten esas zonas.

Recopila datos de los visitantes

- Anota los datos de contacto de cada persona que haya estado en contacto con las cepas o el suelo. Así, si aparece un brote de filoxera, sabremos por dónde la han propagado.

Formación y comunicación:

Señaliza el viñedo

- Instala en los puntos de acceso al viñedo señales multilingües y bien visibles, con información sobre la filoxera y las medidas de prevención. Usa iconos complementarios.
- Recuérdales a los visitantes en estas señales que son responsables de preservar el patrimonio y la biodiversidad vitivinícola de Canarias.

Capacita al personal encargado de las visitas

- Informa a tu personal acerca de los signos de infección de la filoxera.
- Recuérdales que ellos se encargan de supervisar si los visitantes cumplen las medidas de control y desinfección.

Ofrece sesiones informativas a los visitantes

- Explícales de manera clara el riesgo fitosanitario que origina la filoxera, la forma de dispersión del insecto y la justificación de las medidas preventivas.
- Recalca que está terminantemente prohibido introducir material vegetal o tierra al viñedo.

Guía práctica sobre la plaga de filoxera en Canarias

Proyecto «Entender: fomentar la comprensión a través del lenguaje claro en la administración» para la implantación de la comunicación clara, lenguaje claro y lectura fácil en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, financiado con fondos NEXT GENERATION EU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia MRR.

