





a
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 44.6$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a bc b b c d
Sucrose (µg/mL)
1e+05
8e+04
6e+04
4e+04
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains


b
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 32.26$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a b b c
Sucrose (µg/mL)
1e+05
8e+04
6e+04
4e+04
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains


c
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 36.39$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a bc ab c bc d
Sucrose (µg/mL)
1e+05
8e+04
6e+04
4e+04
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains


d
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 33.45$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a b b b b c
Sucrose (µg/mL)
1e+05
8e+04
6e+04
4e+04
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains


e
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 31.82$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a b b c
Sucrose (µg/mL)
1e+05
8e+04
6e+04
4e+04
media
Z. mobilis
none
WK grains


f
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 54.69$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c cd d e a b
Fructose (µg/mL)
20000
15000
10000
5000
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains


g
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 5.04$, $p = 0.17$, $n = 72$
a a a a
Fructose (µg/mL)
20000
15000
10000
5000
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains


h
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 6.27$, $p = 0.28$, $n = 72$
a a a a a a
Fructose (µg/mL)
20000
15000
10000
5000
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains


i
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 13.08$, $p = 0.023$, $n = 72$
a a a a a a
Fructose (µg/mL)
20000
15000
10000
5000
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains


j
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 20.09$, $p = 0.00016$, $n = 72$
b c ab a
Fructose (µg/mL)
20000
15000
10000
5000
media
Z. mobilis
none
WK grains


k
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 52.07$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a cd c d a b
Glucose (µg/mL)
15000
10000
5000
0
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains


l
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 16.18$, $p = 0.001$, $n = 72$
a b b b
Glucose (µg/mL)
15000
10000
5000
0
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains


m
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 20.33$, $p = 0.0011$, $n = 72$
a bc b c bc b
Glucose (µg/mL)
15000
10000
5000
0
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains


n
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 25.6$, $p = 0.00011$, $n = 72$
a bcd cd d ab bc
Glucose (µg/mL)
15000
10000
5000
0
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains


o
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 29.98$, $p = <0.0001$, $n = 72$
a c b b
Glucose (µg/mL)
15000
10000
5000
0
media
Z. mobilis
none
WK grains


p
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 55.26$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c c b a b a
Glycerol (µg/mL)
2000
1500
1000
500
0
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains


q
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 29.83$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c b b a
Glycerol (µg/mL)
2000
1500
1000
500
0
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains


r
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 30.61$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c bc b b b a
Glycerol (µg/mL)
2000
1500
1000
500
0
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Liq. satsumensis
WK grains


s
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 32.94$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c b b bc b a
Glycerol (µg/mL)
2000
1500
1000
500
0
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains


t
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 32.08$, $p = <0.0001$, $n = 72$
d c b a
Glycerol (µg/mL)
2000
1500
1000
500
0
media
Z. mobilis
none
WK grains


u
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 14.9$, $p = 0.011$, $n = 72$
c abc abc bc a ab
Mannitol (µg/mL)
3000
2000
1000
0
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains


v
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 8.32$, $p = 0.04$, $n = 72$
b ab a a
Mannitol (µg/mL)
3000
2000
1000
0
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains


w
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 44.46$, $p = <0.0001$, $n = 72$
c c b a c b
Mannitol (µg/mL)
3000
2000
1000
0
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains


x
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 10.68$, $p = 0.058$, $n = 72$
b ab ab ab a a
Mannitol (µg/mL)
3000
2000
1000
0
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains


y
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 9.8$, $p = 0.02$, $n = 72$
b ab a a
Mannitol (µg/mL)
3000
2000
1000
0
media
Z. mobilis
none
WK grains