

a
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 167.65$, $p = <0.0001$, $n = 280$
c ab a d bc e
pH_day0
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains
b
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 70.87$, $p = <0.0001$, $n = 280$
ab b a c
pH_day0
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains
c
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 24.08$, $p = 0.00021$, $n = 280$
a a a a a b
pH_day0
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains
d
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 28$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a a a a a b
pH_day0
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains
e
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 23.26$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a a a b
pH_day0
media
Z. mobilis
none
WK grains
f
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 99.53$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a de c b cd e
pH_day3
media
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains
g
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 47.51$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a c b d
pH_day3
media
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains
h
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 51.55$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a b b c bc d
pH_day3
media
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains
i
Kruskal−Wallis, $\chi^2(5) = 153.01$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a b b d c cd
pH_day3
media
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains
j
Kruskal−Wallis, $\chi^2(3) = 46.47$, $p = <0.0001$, $n = 280$
a b c d
pH_day3
media
Z. mobilis
none
WK grains