

a
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 38.9$, $p = <0.0001$, $n = 268$
c c b c a
cells_per_ml_day0
1e+09
1e+08
1e+07
1e+06
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains
b
Kruskal−Wallis, $\chi^2(2) = 20.26$, $p = <0.0001$, $n = 268$
c b a
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains
c
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 41.35$, $p = <0.0001$, $n = 268$
c c b c a
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains
d
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 98.32$, $p = <0.0001$, $n = 268$
d d c b a
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains
e
Kruskal−Wallis, $\chi^2(2) = 21.67$, $p = <0.0001$, $n = 268$
c b a
Z. mobilis
none
WK grains
f
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 61.82$, $p = <0.0001$, $n = 268$
a b c b b
cells_per_ml_day3
Br. bruxellensis
H. valbyensis
P. fermentans
S. cerevisiae
WK grains
g
Kruskal−Wallis, $\chi^2(2) = 9.6$, $p = 0.0082$, $n = 268$
a b ab
B. aquikefiricola
B. fermentum
WK grains
h
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 52.34$, $p = <0.0001$, $n = 268$
bc c a b b
Lac. paracasei
Len. hilgardii
Leu. pseudomesenteroides
Liq. satsumensis
WK grains
i
Kruskal−Wallis, $\chi^2(4) = 36.81$, $p = <0.0001$, $n = 268$
a a b b ab
A. lovaniensis
A. orientalis
G. japonicus
G. oxydans
WK grains
j
Kruskal−Wallis, $\chi^2(2) = 33.27$, $p = <0.0001$, $n = 268$
a b ab
Z. mobilis
none
WK grains