

## Листовка: информация за потребителя

Седакс 400 mg твърди капсули  
Cedax 400 mg hard capsules  
цефтибутен/ceftibuten

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Седакс твърди капсули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Седакс твърди капсули
3. Как да приемате Седакс твърди капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Седакс твърди капсули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |                    |
| Към Рег. №                          | 9800134            |
| Разрешение №                        | 28081 / 09-01-2015 |
| Съдържание №                        |                    |

### 1. Какво представлява Седакс твърди капсули и за какво се използва

Седакс е полусинтетичен антибиотик от групата на цефалоспорините.

Седакс се прилага за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, ухото и пикочните пътища, причинени от чувствителни към цефтибутен микроорганизми.

Седакс твърди капсули са предназначени за възрастни и деца над 10-годишна възраст или с телесно тегло над 45 kg.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Седакс твърди капсули

#### Не приемайте Седакс

- ако сте алергични към цефтибутен или към някоя от останалите съставки на Седакс.
- ако сте алергични към който и да е друг антибиотик от групата на пеницилините или цефалоспорините.

#### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Седакс.


- Ако развиете алергична реакция (като напр. кихане, затруднено дишане или обрив), незабавно потърсете лекарска помощ.
- Ако бъбречната Ви функция е влошена, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза Седакс и в хода на лечението да следи функцията на бъбреците Ви.
- Ако страдате от смущения на стомашно-чревния тракт и по-специално хроничен колит, или се появи тежка диария или повръщане, незабавно съобщете на Вашия лекар.

#### Други лекарства и Седакс

Няма съобщения за значими взаимодействия на Седакс с други лекарства.

Правени са проучвания за взаимодействието на Седакс с всеки един от следните продукти:

алуминиево-магнезиев хидроксид (лекарство за киселини), ранитидин (лекарство за лечение на язва и киселини) и еднократна интравенозна доза теофилин.



Не са установени значими лекарствени взаимодействия. Не е известно въздействието на Седакс върху плазмените нива и фармакокинетиката на перорално приетия теофилин. Цефалоспорините могат да понижат протромбиновата активност и да доведат до удължаване на протромбиновото време при пациенти на лечение с перорални антикоагуланти (противосъсирващи лекарства), при които е постигнато стабилизиране на коагулационните показатели. При рисковите пациенти лекуващият лекар ще следи протромбиновото време, като при нужда ще прецени необходимостта от прилагане на витамин К.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

#### **Прием на Седакс твърди капсули с храни и напитки**

Седакс твърди капсули могат да се приемат независимо от приема на храна.

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност: Поради липсата на клиничен опит с приложението на цефтибутен по време на бременност, лекарственият продукт трябва да се прилага само ако е наложително, под пряк лекарски контрол.

Кърмене: Доказано е, че цефтибутен преминава в минимални количества в майчиното мляко. Вашият лекар ще прецени дали можете да приемате Седакс докато кърмите.

#### **Деца и юноши**

За деца над 6-месечна възраст Седакс се предлага под формата на прах за перорална суспензия. Безопасността и ефикасността на Седакс при кърмачета под 6-месечна възраст не е установена.

#### **За всички пациенти**

При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или пациенти на хемодиализа, може да се наложи корекция на дозата.

Продължителното лечение с широкоспектърни антибиотици като цефтибутен може да предизвика нарушение на чревната флора (микроорганизми, които се развиват в дебелото черво) и поява на тежка диария, обезводняване и/или псевдомембранозен колит. Ако при Вас се развие диария, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Леките форми на псевдомембранозен колит обикновено се овладяват при спиране на антибиотичното лечение, но може да се наложи допълнителна лекарска намеса.

#### **Шофиране и работа с машини**

Седакс не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **3. Как да приемате Седакс твърди капсули**


Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Както и при другите антибиотици за перорален прием, продължителността на лечението е в рамките на 5 до 10 дни. При лечението на инфекции, причинени от *Streptococcus pyogenes*, Седакс трябва да се прилага най-малко 10 дни.

Препоръчителната доза е:

#### Възрастни:

**Инфекции на горните дихателни пътища:** 400 mg веднъж дневно





**Инфекции на пикочните пътища:** 400 mg веднъж дневно

За дозировка при деца, моля, консултирайте се с Вашия лекар и с Листовката за пациента на Седакс 36 mg/ml прах за перорална суспензия.

**Незабавно уведомете Вашия лекар за това. Обикновено при случайно поглъщане на по-голяма доза не са наблюдавани прояви на токсичност. При предозиране може да се направи стомашна промивка. Не съществува специфичен антидот.**

Ако пропуснете приема на доза Седакс, вземете я веднага щом си спомните за това, след което продължете с обичайната схема на приложение. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте приема на Седакс преди да завършите пълния курс на лечение, тъй като симптомите на инфекция могат да се възобновят.

**Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.**


Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. От клиничните изпитвания се съобщава за следните нежелани реакции:

### С неизвестна честота: суперинфекция

**Нечести:** увеличаване на броя на кръвните клетки, наречени еозинофили (еозинофилия), позитивиране на директния тест на Кумбс, понижаване на хемоглобина, удължено протромбиново време, повишаване на международното нормализирано съотношение

**Редки:** намаление на броя на белите кръвни клетки (левкопения), увеличаване на броя на тромбоцитите (тромбоцитемия), нарушено образуване на кръвни клетки (апластична анемия), увеличено разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия), хеморагично нарушение, намаляване на броя на всички кръвни клетки (панцитопения), неутропения, намаление на някои бели кръвни клетки (агранулоцитоза)

**С неизвестна честота:** серумна болест, реакции на свръхчувствителност, включително анафилактична реакция, бронхоспазъм, обрив, уртикария (копривна терска), реакция на фоточувствителност, сърбеж, ангиоедем, синдром на Стивънс-Джонсън, еритема мултиформе, тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехути по кожата (токсична епидермална некролиза)



**Нарушения на нервната система**

*Чести:* главоболие

*Нечести:* нарушение на вкуса

*Редки:* гърчове

*Много редки:* необичайно кожно усещане като изтръпване (парестезия), сънливост

При деца: патологични движения (хиперкинезия)

*С неизвестна честота:* нарушения на говора (афазия)

**Нарушения на ухото и лабиринта**

*Много редки:* световъртеж

**Психични нарушения**

*Много редки:* При деца: възбуда, безсъние

*С неизвестна честота:* психотично нарушение

**Нарушения на метаболизма и храненето**

*Нечести:* анорексия

**Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения**

*Нечести:* запушване на носа, задух

**Стомашно-чревни нарушения**

*Чести:* гадене, диария

*Нечести:* гастрит, повръщане, болка в корема, запек, сухота в устата, лошо храносмилане, метеоризъм, фекална инконтиненция

*С неизвестна честота:* кръв в изпражненията

**Хепатобилиарни нарушения**

*Нечести:* хипербилирубинемия, повишаване на аспартат аминотрансферазата, повишаване на аланин аминотрансферазата

*Редки:* лактат дехидрогеназа

*С неизвестна честота:* жлъчно-чернодробно заболяване, пожълтяване на кожата и бялото на очите (жълтеница)

**Нарушения на кожата и подкожната тъкан**

*Нечести:* При деца: дерматит при използване на пелени

**Нарушения на бъбреците и пикочните пътища**

*Нечести:* болка при уриниране (дизурия)

При деца: кръв в урината (хематурия)

бъбречно увреждане, токсична нефропатия, бъбречна глюкозурия, кетонурия

**Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение**

*Много редки:* умора

При деца: раздразнителност, тръпки

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Седакс твърди капсули**



Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Седакс твърди капсули**

- Активното вещество е: цефтибутен.
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат.

*Състав на твърдата капсула:* желатин, полисорбат 80, титанов диоксид, пречистена вода, натриев лаурилсулфат.

*Състав на запечатващата лента:* желатин, полисорбат 80, пречистена вода.

*Печатно мастило:* черно мастило, което съдържа фармацевтичен лак, синтетичен черен железен оксид, етиленгликолов моноетилетер, лецитин и симетикон.

### **Как изглежда Седакс твърди капсули и какво съдържа опаковката**

Твърдите капсули Седакс имат матовобяло тяло и безцветна запечатваща лента. На твърдата капсула има надпис „400 mg”.

Седакс 400 mg твърди капсули се доставя в сашета, по 5 броя в кутия.

## **Притежател на разрешението за употреба и производител**

### Притежател на Разрешението за употреба

Мерк Шарп и Доум България ЕООД  
бул. "Никола Вапцаров" №55, ЕКСПО 2000, ет.1  
Източно крило, Сектори В1 и В2  
район Лозенец  
гр. София 1407, България  
тел. 02/819 3737  
факс: 02/862 5196  
имейл: info-msdbg@merck.com

### Производител

Schering Plough Labo NV  
Industriepark, 30 – Zone A  
B-2220 Heist-op-den-Berg  
Белгия

## **Дата на последно преразглеждане на листовката**

