

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Цикорин 100 mg меки капсули
циклоспорин
Ciqorin 100 mg capsules, soft
ciclosporin

МЕДИЦИНСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Разр. №	20130771
Разрешение №	28131 / 19-01-2015
Одобрение №	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Цикорин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цикорин
3. Как да приемате Цикорин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цикорин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цикорин и за какво се използва

Какво представлява Цикорин

Името на Вашето лекарство е Цикорин. Той съдържа активното вещество циклоспорин. Той принадлежи към групата лекарства, известни като имunosупресивни вещества. Тези лекарства се използват да намалят имунните реакции на тялото.

Как се използва Цикорин и как Цикорин действа

- Ако сте имали органична трансплантация, трансплантация на костен мозък или стволови клетки, функцията на Цикорин е да контролира имунната система на Вашето тяло. Цикорин предпазва от отхвърляне на трансплантираните органи чрез блокиране на развитието на някои клетки, които биха нормално атакували трансплантираният тъкан.
- Ако имате автоимунно заболяване, при което имунния отговор на Вашето тяло атакува клетките, Цикорин спира тази имунна реакция. Някои заболявания включват проблеми с очите, което застрашава Вашето зрение (ендогенен увеит, включващ увеит на Бечет), тежки случаи на някои кожни заболявания (атопичен дерматит или екзема и псориазис), тежък ревматоиден артрит и заболяване на бъбреците, наречено нефротичен синдром.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цикорин

Ако приемате Цикорин след трансплантация, той трябва да Ви бъде предписан от лекар с опит при трансплантации и/или автоимунни заболявания.

Съветът в тази листовка може да варира в зависимост от това дали вземате лекарството за трансплантация или за автоимунно заболяване.

Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар. Те може да се различават от общата информация, съдържаща се в тази листовка.

Не приемайте Цикорин

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към циклоспорин или някоя от останалите съставки на Цикорин (изброени в точка б);
- с продукти, съдържащи жълт кантарион (*Hypericum perforatum*);
- с продукти, съдържащи дабигатрин етексилат (използван за предотвратяване на кръвотечение след операция) или босентан и алискирен (използвани за намаляване на високо кръвно налягане).

Не приемайте Цикорин и говорете с Вашия лекар, ако гореизброените се отнасят до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар преди да приемете Цикорин.

Предупреждения и предпазни мерки

Цикорин трябва да се предписва само от лекар, специализирал органна трансплантация, дерматология (кожни болести), нефрология (бъбречни болести) или ревматология.

- Ако имате някакви признаци на инфекция, като температура и болки в гърлото. Цикорин потиска имунната система и може да засегне способността на тялото Ви да се бори с инфекция.
- Ако имате чернодробни проблеми.
- Ако имате бъбречни проблеми. Вашият лекар ще Ви назначи редовни ръвни изследвания и може да промени Вашата доза ако е необходимо.
- Ако развиете високо кръвно налягане. Вашият лекар ще проявява Вашето кръвно налягане редовно и може да Ви назначи лекарство за намаляване на кръвното налягане, ако е необходимо.
- Ако имате ниски нива на магнезий в кръвта. Вашият лекар може да ви назначи магнезиеви добавки, особено непосредствено след операцията, ако сте трансплантиран.
- Ако имате високи нива на натрий в кръвта.
- Ако имате подагра.
- Ако се нуждаете от ваксинация.

Слънчева светлина и слънчева защита

Цикорин потиска Вашата имунна система. Това увеличава Вашия риск от развитие на рак, особено рак на кожата и на лимфната система. Трябва да ограничите излагането си на слънчева светлина и UV лъчи чрез:

- обличане на подходящи предпазни дрехи;
- често прилагане на слънцезащитни продукти с висок защитен фактор.

Говорете с Вашия лекар преди за приемете Цикорин

- ако имате или сте имали свързани с алкохола проблеми;
- ако имате епилепсия;
- ако имате някакви чернодробни проблеми;
- ако сте бременна;
- ако кърмите;
- ако това лекарство е предписано за деца.

Ако някое от горепосочените се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар преди да приемете Цикорин. Това е защото това лекарство съдържа алкохол (вижте точката по-долу „Цикорин съдържа алкохол“).

Наблюдение по време на лечението с Цикорин

Вашият лекар ще провери:

- нивата на циклоспорин в кръвта, особено ако сте след трансплантация;
- Вашето кръвно налягане преди началото на лечението и редовно по време на лечението;
- колко добре Вашият черен дроб и бъбреци работят;
- Вашите кръвни липиди (мазнини).

Ако имате някакви въпроси относно как Цикорин действа или защо това лекарство Ви е предписано, попитайте Вашия лекар.



Като допълнение, ако приемате Цикорин за нетрансплантационно заболяване (интермедиерен или постеорен увеит и увеит на Бечет, атопичен дерматит, тежък ревматоиден артрит или нефротичен синдром), не приемайте Цикорин:

- ако имате проблеми с бъбреците (изключение за нефротичен синдром);
- ако имате инфекция, която не се контролира с лекарства;
- ако имате някакъв вид рак;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония), която не се контролира с лекарства. Ако имате високо кръвно налягане по време на лечението и то не може да бъде контролирано, Цикорин трябва да бъде спряно от вашия лекар.

Не приемайте Цикорин, ако някое от по-горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с вашия лекар или фармацевт преди да приемете Цикорин.

Ако сте лекувани от увеит на Бечет, Вашият лекар ще Ви наблюдава изключително внимателно ако имате неврологичен симптом (напр: повишено забравяне, персонални промени, забелязани навреме, психични нарушения или промени на настроението, парещо усещане в крайниците, намалени усещане в крайниците, изтръпване в кайниците, слабост в крайниците, нарушение на движението, главоболие с или без гадене и повръщане, нарушено зрение, включително ограничени движения на очните ябълки).

Вашият лекар ще наблюдава отблизо ако сте в старческа възраст или сте лекувани за псориазис или атопичен дерматит, не трябва да се излагате на УВ-лъчи или фототерапия по време на лечението.

Деца и юноши

Цикорин не трябва да се дава на деца за нетрансплантирано заболяване, изключение е лечението на нефротичен синдром.

Популация в старческа възраст (65 години и над)

Съществува ограничен опит с Цикорин при пациенти в старческа възраст. Вашият лекар трябва да наблюдава колко добре Вашите бъбреци работят. Ако сте над 65 години и имате псориазис или атопичен дерматит, трябва единствено да се лекувате с Цикорин ако Вашето състояние е изключително тежко.


Други лекарства и Цикорин

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

В частност, кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате някое от следните лекарства преди и по време на лечението с Цикорин:

- лекарства, които могат да засегнат нивата на калий. Това включва лекарства, които съдържат калий, калиеви добавки, отводняващи таблетки (диуретици), наречени калий-щадящи диуретици и някои лекарства, намаляващи кръвното Ви налягане;
- метотрексат. Той се използва за лечение на тумори, тежък псориазис и тежък ревматоиден артрит;
- лекарства, които може да повишат или намалят нивото на циклоспорин (активното вещество на Цикорин) в кръвта. Вашият лекар може да провери нивото на циклоспорин в кръвта, когато започва или спира лечението с други лекарства.

Лекарства, които могат да увеличат нивото на циклоспорин в кръвта включват: антибиотици (като еритромицин и азитромицин), притивогъбични (вориконазол, итраконазол), лекарства, използвани за сърдечни проблеми и високо кръвно налягане (дилтиазем, нифедипин, верапамил, амлодипин), метоклопрамид (използван при гадене), перорални контрацептиви, даназол (използван за лечение на менструални проблеми), лекарства за лечение на подагра (алопуринол), жлъчна киселина производни (използвани за лечение на жлъчни камъни), протеазни инхибитори, използвани за лечение на СПИН, иматиниб (използван за лечение на левкемия или тумори), колхицин, теланпрежир



(използван за лечение на хепатит С). Лекарства, които могат да намалят нивоот на циклоспорин в кръвта включват: барбитурати (използвани за подпомагане на съня), някои противогърчови лекарства (като карбамазепин и фенитоин), октреотид (използван за лечение на акромегалия или невроендокринни тумори на червата), антибактериални лекарства, използвани за лечение на туберкулоза, орлистат (използван за намаляване на телесното тегло), лекарства от растителен произход, съдържащи жълт кантарион, тиклопидин (използван след инсулт), някои лекарства, които намаляват кръвното налягане (босентан) и тербинафин (противогъбично лекарство, използвано за лечение на инфекции на пръстите и ноктите).

- Лекарства, които могат да засегнат бъбреците. Те включват: антибактериални лекарства (гентамицин, тобрамицин, ципрофлоксацин), противогъбични лекарства, които съдържат амфотерацин В, лекарства, използвани за инфекции на пикочните пътища, съдържащи триметоприм, лекарства за лечение на рак, съдържащи мелфалан, лекарства, използвани за намаляване на количеството киселина в стомаха (инхибитори на киселинната секреция от H₂-рецепторен антагонистичен тип), такролимус, болкоуспокояващи (нестероидни противовъзпалителни лекарства като диклофенак), лекарства на фибровата киселина (използвани за намаляване на количеството мазнина в кръвта).
- Нифедипин. Той се използва за лечение на високо кръвно налягане и сърдечна болка. Може да имате възпалени венци около зъбите, ако приемате нифедипин по време на лечението с циклоспорин.
- Дигоксин (използван за лечение на сърдечни проблеми), лекарства, които понижават холестерола (HMG-CoA-редуктазни инхибитори, наречени статини), преднизолон, етопосид (използван за лечение на рак), репаглинид (перорално антидиабетно лекарство), имunosупресанти (еверолимус, сиролимус), амбрисентан и специфични противоракови лекарства, наречени антрациклини (като доксорубицин).

Ако някое от изброените по-горе се отнася до Вас (или не сте сигурен), говорете с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Цикорин.

Цикорин с храни и напитки

- Не приемайте Цикорин с грейпфрут или сок от грейпфрут. Това е защото те може да повлияят действието на Цикорин.

Бременност и кърмене

Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да приемате това лекарство. Вашият лекар ще обсъди с вас потенциалните рискове от приемането на Цикорин по време на бременност.

- Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате бременност. Опитът с Цикорин по време на бременност е ограничен. По принцип, Цикорин не трябва да се използва по време на бременност. Ако е необходимо да приемате това лекарство, Вашият лекар ще обсъди с Вас ползите и потенциалните рискове от приемането му по време на бременност. Кажете на Вашия лекар ако кърмите. Не се препоръчва кърмене по време на лечението с Цикорин. Това е защото циклоспорин, активното вещество, преминава в кърмата. Това може да засегне Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Цикорин съдържа етанол. Това може да повлияе способността Ви да шофирате или работите с машини.

Цикорин съдържа етанол

Цикорин съдържа около 14,7% етанол, което отговаря на до 797,5 mg етанол на доза, използвана при трансплантирани пациенти. Това е еквивалентно на 20 ml бира и 8 ml вино на доза.

Алкохолът може да бъде вреден, ако имате проблеми, свързани с алкохола, епилепсия, мозъчна операция, чернодробни проблеми или ако сте бременна или кърмите. Това може да бъде особено ако това лекарство се дава на деца.

Цикорин съдържа макроглов хидроксистеарат



Цикорин съдържа макроглов хидроксистеарат, което може да причини стомашен дискомфорт и диария.

Цикорин съдържа сорбитол

Ако знаете от своя лекар, че имате непоносимост към някои захари, преди да вземате този продукт се, консултирайте със своя лекар.

3. Как да приемате Цикорин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Не приемайте повече от препоръчителната доза.

Дозата на това лекарство ще бъде внимателно коригирана според Вашите индивидуални нужди от Вашия лекар. По-голямо количество от лекарството може да засегне Вашите бъбреци. Вие ще имате редовни кръвни тестове и посещения в болница, особено след трансплантация. Това ще Ви даде възможност да говорите с вашия лекар за лечението и за някакви проблеми, които може да имате.

Колко Цикорин да приемате

Вашият лекар ще определи коректната доза Цикорин за Вас. Това зависи от Вашето телесно тегло и как Вие приемате лекарството. Вашият лекар ще Ви каже също колко често да приемате вашето лекарство.

- **При възрастни:**

- Органна, костно-мозъчна и стволоро-клетъчна трансплантации**

- Общата дневна доза е обикновено между 2 mg и 15 mg на килограм телесно тегло. Тя е разделена на две дози.
 - Обикновено, по-високи дози се използват преди и непосредствено след трансплантацията Ви. По-ниски дози се използват след като вашия трансплантиран орган или костен мозък са стабилизирани.
 - Вашият лекар ще коригира дозата до такава, която е идеална за Вас. За да направи това, Вашият лекар може да се нуждае от някои кръвни тестове.

Ендогенен увент

- Общата дневна доза е обикновено между 5 mg и 7 mg на килограм телесно тегло. Тя е разделена на две дози.

Нефротичен синдром

- Общата дневна доза за възрастни е обикновено 5 mg на килограм телесно тегло дневно. Тя е разделена на две дози. При пациенти с бъбречни проблеми, първата доза приета всеки ден не трябва да бъде повече от 2,5 mg на килограм телесно тегло.

Тежък ревматоиден артрит

Общата дневна доза е обикновено между 3 mg на килограм телесно тегло и 5 mg на килограм телесно тегло. Тя е разделена на две дози.

Псориазис и атопичен дерматит

Общата дневна доза е обикновено между 2,5 mg на килограм телесно тегло и 5 mg на килограм телесно тегло. Тя е разделена на две дози.

- **При деца:**

- Нефротичен синдром**



- Общата дневна доза при деца е обикновено между 6 mg на килограм телесно тегло и 5 mg на килограм телесно тегло. Тя е разделена на две дози. При пациентите с бъбречни проблеми, първата доза не трябва да бъде повече от 2, 5 mg на килограм телесно тегло. Следвайте точно инструкциите на Вашия лекар и никога не променяйте сами дозата, дори да с ечувствате по-добре.

Преминаване от перорален циклоспорин към перорален микроемулгиран циклоспорин
Трябва вече да сте приемали друг перорален циклоспорин. Вашият лекар може да реши да го промени с Цикорин.

- Тези лекарства винаги съдържат циклоспорин като активно вещество.
- Цикорин е различна, подобрена формула на ациклоспорин. Циклоспорин се абсорбира в кръвта по-добре от Цикорин и абсорбцията е по-малко вероятно да бъде засегната от храната. Това означава, че тези нива на циклоспорин в кръвта Ви може да останат по-постоянни с цикорин.

Ако Вашия лекар промени Вашия перорален циклоспорин с перорален микроемулгиран циклоспорин:

- не започвайте да вземате Вашето предишно лекарство без Вашия лекар да Ви е казал;
- след промяната, Вашият лекар ще Ви наблюдава непосредствено за кратко време. Това е, поради промяната на това как се абсорбира циклоспорин в кръвта. Вашият лекар ще се увери, че вие сте получили правилната доза според Вашите индивидуални нужди;
- може да имате някои нежелани ефекти. Ако това се случи, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Вашата доза може да се нуждае от намаление. Никога не намалявайте сами Вашата доза, без лекар да Ви е казал.

Ако Вашият лекар премине от една перорална форма циклоспорин към друга
След промяна от една перорална форма циклоспорин към друга:

- Вашият лекар ще Ви наблюдава непосредствено за кратко време;
- може да имате някои нежелани ефекти. Ако това се случи, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Вашата доза може да се нуждае от намаление. Никога не намалявайте сами Вашата доза, без лекар да Ви е казал.

Кога да приемате Цикорин

Приемайте Цикорин по едно и също време всеки ден. Това е много важно ако сте били трансплантиран.

Как да приемате Цикорин

Вашите дневни дози трябва винаги да бъдат приемани на 2 разделени дози. Извадете капсулите от блистера. Погълнете капсулите цели с вода.

Колко продължително да приемате Цикорин

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго се нуждаете да приемате Цикорин. Това зависи от това как сте след трансплантацията или при лечението на тежко кожно състояние, ревматоиден артрит, увеит или нефротичен синдром. При тежък обрив, лечението обикновено продължава 8 седмици.

Приемайте Цикорин толкова дълго, колкото и е казал Вашия лекар.

Ако имате някакви въпроси относно колко продължително да приемате Цикорин, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цикорин

Ако по невнимание сте приели твърде много от Вашето лекарство, незабавно говорете с Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно отделение. Може да се нуждаете от лекарска грижа.

Ако сте пропуснали да приемете Цикорин

- Вземете следващата доза веднага щом се сетите, освен ако вече не е време за следващата доза. След това продължете както преди.



- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате тази, която сте пропуснали.

Ако сте спрели да приемате Цикорин

Не спирайте да приемате Цикорин, докато Вашия лекар не Ви каже.

Продължете приема на Цикорин дори и да се чувствате добре. Спиране на лечението с Цикорин може да повиши риска Вашия трансплантиран орган да бъде отхвърлен.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този медикамент, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да са сериозни

Говорете с Вашия лекар веднага, ако забележите някои от следните сериозни нежелани ефекти:

- Подобно на други лекарства, които действат върху имунната система, циклоспорин може да повлияе на способността на тялото да се бори срещу инфекции и може да причини тумори и други видове рак, особено на кожата. Признаци за инфекцията може да е температура и болки в гърлото.
- Промени на зрението Ви, загуба на координация, тремор, загуба на паметта, затруднен говор или разбиране на това, което другите казват и мускулна слабост. Това може да са признаци на инфекция на мозъка, наречена прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия.
- Мозъчни проблеми с признаци като гърчове, смущение, дезориентация, намалена комуникативност, личностни промени, смутеност, безсъние, промени в зрението, слепота, кома, парализа на част от тялото или на цялото тяло, схванат врат, загуба на координация с или без необичен говор или движения на очите.
- Подуване на задна част на очите. Това може да е свързано със замъглено зрение. Може също да засегне зрението Ви, поради високо налягане вътре в главата (бенингва интракраниална хипертензия).
- Чернодробни проблеми и загуба с или без жълта кожа и очи, гадене, загуба на апетит и тъмна урина.
- Бъбречни проблеми, които може постепенно да намалят количеството на урина, която отделяте.
- Ниски нива на червени кръвни клетки и тромбоцити. Признаците включват бледа кожа, умора, задых, наличие на тъмна урина (това е признак на прекъсване на червените кръвни клетки), зачервяване или кървене без очевидна причина, конфузно състояние, дезориентация, намалено внимание, наличие на бъбречни проблеми.

Други нежелани ефекти включват:

Много чести нежелани ефекти: Тези нежелани ефекти може да засегнат повече от 1 на 10 души:

- бъбречни проблеми;
- високо кръвно налягане;
- главоболие;
- движение на тялото, което не може да бъде контролирано;
- прекомерно нарастване на тялото и окосмяване на лицето;
- повишени липиди в кръвта.

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Чести нежелани ефекти: Тези нежелани ефекти може да засегнат между 1 на 10 до всеки 100 души:

- припадъци (гърчове);
- чернодробни проблеми;
- умора;



- загуба на апетит;
- гадене (неразположение), повръщане, стомашна болка, запек, диария
- извънредно окосмяване;
- акне, горещи вълни;
- температура;
- ниско ниво на бели кръвни клетки;
- чувство на вцепенение и изтръпване;
- стомашна язва;
- нарастване на венеца и покриване на зъбите;
- високо ниво на пикочна киселина в кръвта, ниско ниво на магнезий.

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Нечести нежелани ефекти: тези нежелани ефекти може да засегнат между 1 и 10 на всеки 1000 души:

- симптоми на мозъчни нарушения, включително внезапни припадъци, умствено смущение, безсъние, дезориентация, нарушено виждане, неосъзнатост, чувство на слабост в крайниците, нарушени движения;
- обрив;
- общо подуване;
- напълняване;
- ниско ниво на червени кръвни клетки, ниско ниво на тромбоцити, което може да увеличи рискът от кървене;

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Редки нежелани ефекти: тези нежелани ефекти може да засегнат между 1 и 10 на всеки 10000 души:

- нервни проблеми със скованост и изтръпване на пръстите и краката;
- възпаление на панкреаса с тежка горна стомашна болка;
- мускулна слабост, загуба на мускулна маса, болка в мускулите на краката и ръцете или някъде по тялото;
- разрушаване на червените кръвни клетки, включително бъбречни проблеми със симптоми като подуване на лицето, стомаха, ръцете и/или ходилата, намалено уриниране, затруднено дишане, гръдна болка, скованост, неосъзнатост;
- промени на менструалния цикъл, уголемяване на гърдите при мъже.

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Много редки нежелани ефекти: Тези нежелани ефекти може да засегнат между 1 и 10 на всеки 100000 души:

- оток на задната част на окото, което може да е свързано с увеличение на налягането вътре в главата и нарушение на зрението.

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Други нежелани ефекти с неизвестна честота: честотата не може да бъде определена от наличните данни:

- сериозни чернодробни проблеми с и без пожълтяване на очите и кожата, гадене (неразположение), загуба на апетит, тъмно оцветена урина, подуване на лицето, стъпалата, ръцете и/или цялото тяло;
- подкожно кървене или пурпурна кожа, внезапно кървене без определена причина;
- мигрена или тежко главоболие често с чувство за отпадналост (гадене, повръщане) и чувствителност към светлината.

Ако някои от тях Ви засегне сериозно, кажете на Вашия лекар.

Допълнителни нежелани ефекти при деца и юноши

Няма допълнителни нежелани ефекти, които да се очакват при деца и юноши в сравнение с възрастните.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Цикорин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C. Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цикорин

- Активното вещество е циклоспорин.
Всяка мека капсула съдържа 100 mg циклоспорин.
- Другите съставки в капсулния пълнеж са: макроголглицерол хидроксистеарат, глицеролов монолинолеат, диетиленгликолов моноетилетер, етанол, безводен и D,L-α-токоферол.
- Другите съставки в капсулната обвивка са: желатин, глицерол 85%, некрystalизиращ сорбитол 70% (E420), глицин, титанов диоксид (E171), железен оксид, кафяв (E172) и парафин, лек течен.
- Другите съставки в печатното мастило са: шеллак (E904), пропил гликол, амоняк, концентриран разтвор и индиго кармин (E132).

Как изглежда Цикорин и какво съдържа опаковката

Меките капсули Цикорин от 100 mg са непрозрачни, бели до белезникави меки желатинови капсули, съдържащи безцветна до леко жълтеникава мазна течност, с отпечатано „100“. Приблизителен размер 24,7 x 9,9 mm.

Капсулите се предлагат в опаковки с 20, 30, 50, 50 x 1, 60, 90 и 100 в OPA/Alu/PVC – алуминиеви блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ул. “Н.В. Гогол” № 15, ет. 1

София 1124

България

Производители



Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov
Република Чехия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Унгария

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Обединено кралство

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Нидерландия

TEVA Santé
Rue Bellocier, 89100 Sens
Франция

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren
Германия

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow
Полша

Този лекарствен продукт е регистриран в държавите-членки на ЕИП под следните наименования

България: Ciqorin 25 mg, 50 mg, 100 mg capsules, soft
Република Чехия: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg měkké tobolky
Германия: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg Weichkapseln
Гърция: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg καψάκια, μαλακά
Испания: Ciqorin 25mg, 50 mg, 100 mg cápsulas blandas EFG
Италия: Ciqorin
Полша: Ciqorin
Португалия: Vanquoral
Словения: Ciqorin 10 mg, 25mg, 50 mg, 100 mg mehke kapsule
Словакия: Ciqorin 10 mg, 25mg, 50 mg, 100 mg Mäkká kapsuly
Обединено кралство: Vanquoral 10 mg, 25mg, 50 mg, 100 mg Capsules, soft

Дата на последно преразглеждане на листовката

