

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Приложение 2	
№ 20150108/09	
Разрешение № 35835-8	29-09-2016
Приложение №	

Листовка: информация за пациента

Цефепим Хоспира 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор
Cefepime Hospira 1 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Цефепим Хоспира 2 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор
Cefepime Hospira 2 g Powder for Solution for Injection or Infusion
Цефепим (Cefepime)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Цефепим Хоспира и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Цефепим Хоспира
3. Как да използвате Цефепим Хоспира
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефепим Хоспира
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цефепим Хоспира и за какво се използва

Цефепим Хоспира съдържа активното вещество цефепим (като цефепимов дихидрохлорид монохидрат).

Цефепим принадлежи към група антибиотици наречени цефалоспорины, които действат като убиват бактериите.

Цефепим се използва когато е известно или е вероятно инфекцията да е причинена от бактерии, чувствителни към цефепим. Използва се за лечение на следните инфекции:

- Гръдни инфекции като пневмония
- Инфекции на репродуктивните органи (при възрастни), пикочните пътища и бъбреците
- Кожни инфекции
- Инфекции в корема
- Инфекции на циркулираща кръв, причинени от бактерии (бактериемия)
- Инфекции в мозъка и гръбначния мозък при деца (менингит)
- Инфекции при хора с нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения)

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Цефепим Хоспира

Не използвайте Цефепим Хоспира

- ако сте алергични към цефепим или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Цефепим Хоспира:

- Ако имате проблеми с бъбреците
- Ако сте алергични към каквото и да е, неоописано в тази листовка
- Ако някога сте имали проблеми с червата, по-специално колит (възпаление на червата)
- Ако сте в напреднала възраст

Други лекарства и Цефепим Хоспира

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарствата, които купувате без рецепта и лекарствата на билкова основа. Това е важно защото Цефепим Хоспира може да повлияе начина по който действат някои лекарства. Също така, някои лекарства могат да повлияят начина по който действа Цефепим Хоспира.

По-специално, информирайте Вашия лекар или медицинска сестра ако приемате някое от следващите лекарства:

- Аминогликозиди или други антибиотици (използвани за лечение на инфекции)
- Антикоагуланти (лекарства, използвани за разреждане на кръвта)

Също така, трябва да уведомите Вашия лекар или медицинска сестра ако правите тестове за глюкоза в урината или кръвни тестове.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Цефепим Хоспира

Цефепим Хоспира винаги ще Ви бъде дават от лекар или медицинска сестра. Ще Ви бъде прилаган по един от следните начини:

- Като инжекция в мускул (като мускула на ръката Ви)
- Като бавна инжекция в една от вените Ви. Това може да отнеме от 3 до 5 минути.
- През малка тръбичка в една от вените Ви. Това се нарича „интравенозна инфузия“. Обикновено отнема поне 30 минути.

В зависимост от вида на инфекцията, която имате Цефепим Хоспира ще Ви бъде прилаган за 7 – 10 дни.

Възрастни и пациенти в напреднала възраст

Обичайната доза е 500 mg (милиграма) до 1 g (грам) на всеки 12 часа. Ако имате тежка инфекция, Вашият лекар може да Ви даде по-висока доза – до 2 g на всеки 8 часа.

Употреба при деца и юноши

Дозата се определя от лекаря въз основа на телесното тегло.

- При деца на възраст над 2 месеца и телесно тегло под 40 kg, обичайната доза е 50 mg на kg телесно тегло на всеки 12 часа. В зависимост от типа и тежестта на инфекцията, дозата може да бъде прилагана на всеки 8 часа.
- При деца на възраст под 2 месеца, доза от 30 mg на kg телесно тегло може да бъде прилагана на всеки 12 часа.
- При деца с тегло над 40 kg може да се прилага дозировката за възрастни.
- Максималната доза при деца не трябва да надвишава 2 g на всеки 8 часа.



Пациенти с бъбречни проблеми

Ако имате проблеми с бъбреците, възможно е да Ви бъде предписана по-ниска доза. Може да се наложи да ес направи кръвен тест, за да се провери, че получавате дозата, която Ви е нужна.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Цефепим Хоспира

Ако мислите, че Ви е приложен твърде много Цефепим Хоспира, информирайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тежки алергични реакции (редки, могат да засегнат по-малко от 1 на 1000 души)

Ако имате тежка алергична реакция, говорете с лекар веднага.

Признаците могат да включват:

- Внезапно подуване на лицето, гърлото, устните или устата. Това може да затрудни дишането или преглъщането.
- Внезапно подуване на ръцете, стъпалата или глезените.

Други възможни нежелани ефекти:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души

- Положителни резултати от тест на Кумбс (тест за някои кръвни проблеми)

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

- Проблеми с начина, по който се съсирва кръвта Ви. Признаците включват лесна поява на синини.
- Анемия, която може да Ви направи да изглеждате бледи, да се чувствате уморени и да не Ви достига въздух
- Възпаление или болка, или парене в мястото на инжектиране
- Диария
- Чернодробни проблеми, напр. жълтеница и промени в чернодробните ензими в кръвта
- Обрив

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

- Гъбична инфекция в устата
- Вагинални инфекции
- Промени в броя на белите кръвни клетки в кръвта Ви. Признаците включват внезапна висока температура (втрисане), треперене и болки в гърлото
- Главоболie
- Възпаление на дебелото черво (колон). Признаците включват диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха и температура
- Гадене и повръщане
- Уртикария, сърбеж и зачервяване на кожата
- Бъбречни проблеми (виждат се при кръвни тестове)
- Треска

Редки: могат да засегнат до 1 на 1000 души



- Гъбични инфекции
- Чувство за изтръпване и мравучкане по тялото
- Замаяност, припадъци (гърчове)
- Задух
- Коремна болка, запек
- Усещане за студ и треперене
- Генитален сърбеж
- Шум в ушите (тинитус)
- Задържане на течности
- Болки в ставите

С неизвестна честота: честотата не може да се определи въз основа на наличните данни

- Някои специфични видове анемия (хемолитична или апластична анемия)
- Фалшиво положителни резултати при изследвания на урина за съдържание на глюкоза
- Обърканост, халюцинации
- Загуба на съзнание, мозъчни нарушения
- Бъбречни проблеми
- Тежък кожен обрив с рани в устата, болки в ставите и болки в очите
- Частична или пълна загуба на способността да се общува вербално или с помощта на написани думи.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Цефепим Хоспира

Вашият лекар или фармацевт е отговорен за съхранението на това лекарство.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте флакона в картонената куия, за да предпазите от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефепим Хоспира

- Активното вещество е цефепим (като цефепимов дихидрохлорид монохидрат)
Всеки флакон съдържа 1 g цефепим като цефепимов дихидрохлорид монохидрат.
Всеки флакон съдържа 2 g цефепим като цефепимов дихидрохлорид монохидрат.



- Другата съставка е аргинин.

Как изглежда Цефепим Хоспира и какво съдържа опаковката

Цефепим Хоспира е прах. Той е бял до бледо жълт на цвят. Предлага се в стъклени флакони.

Преди да се приложи на пациента, Цефепим Хоспира се разтваря чрез добавяне на стерилна течност във флакона. След това правилната доза се взема от флакона. Може да се приложи на пациента или като инжекция или да се добави към сак с инфузионен разтвор, който се прилага през малка тръбичка в една от вените.

Цефепим Хоспира се предлага в опаковки от 1, 5 или 10 флакона в картонена кутия. Възможно е не всички видове опаковки да са пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Hospira UK Limited
Queensway
Royal Leamington Spa
Warwickshire
CV31 3RW
Обединеното Кралство

Производители

Hospira UK Limited
Queensway
Royal Leamington Spa
Warwickshire
CV31 3RW
Обединеното Кралство

Hospira Enterprises B.V.
Randstad 22-11, 1316 BN, Almere
Нидерландия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в ЕИП под следните имена:

Белгия: Cefepim Hospira 1 g 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
България: Цефепим Хоспира 1g 2g прах за инжекционен или инфузионен разтвор
Естония: Cefepime Hospira
Унгария: Cefepime Hospira 1g 2g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Италия: Cefepima Hospira
Латвия: Cefepime Hospira 1 g 2 g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
Литва: Cefepime Hospira 1 g 2 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui
Полша: Cefepime Hospira
Португалия: Cefepima Hospira 1 g 2 g, Pó para Solução Injectável ou Perfusão
Румъния: Cefepime Hospira 1 g 2 g, pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă
Словения: Cefepim Hospira 1 g 2 g – prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Словакия: Cefepime Hospira 1 g 2 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok
Испания: Cefepima Hospira 1 g 2 g polvo para solución inyectable y para perfusión

Дата на последно преразглеждане на листовката 10/2015



Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Цефепим Хоспира 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор
Cefepime Hospira 1 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Цефепим Хоспира 2 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор
Cefepime Hospira 2 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Цефепим (Cefepime)

За пълната лекарствена информация, моля направете справка с Кратката характеристика на продукта.

Опаковка

Флакони 1 g и 2 g: флакони 20 ml от прозрачно стъкло тип I, затворени с бромобутилова гумена запушалка и алуминиева обкатка.

Флаконите съдържат стерилен, бял до бледо жълт на цвят кристален прах. Съдържат също и аргинин.

Предлагат се в опаковка от 1, 5 или 10 флакона в картонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Дозировка и начин на приложение

Цефепим Хоспира може да се прилага интравенозно или интрамускулно.

След разтваряне, полученият разтвор е бледо жълт до кафеникав.

За цефепим, дозировката и начина на приложение се определят в зависимост от естеството и тежестта на инфекцията, чувствителността на патогена, бъбречната функция и общото състояние на пациента.

Интравенозното приложение е за предпочитане при пациенти с тежки или животозастрашаващи инфекции, особено когато е налице възможността за шок.

Възрастни с нормална бъбречна функция

В съответствие със следващата таблица:

Тежест на инфекцията	Дозировка и начин на приложение	Дозов интервал
Лека до умерена по тежест инфекция на пикочните пътища	500 mg до 1 g IV или IM	На 12 часа
Други лека до умерена по тежест инфекции (без инфекции на пикочните пътища)	1g IV или IM	На 12 часа
Тежки инфекции	2 g IV	На 12 часа
Много тежки или животозастрашаващи инфекции	2 g IV	На 8 часа

Продължителността на лечението обикновено е от 7 до 10 дни, но може да се изисква по-продължително лечение за по-тежки инфекции. За емпирично лечение на фебрилна неутропения продължителността на лечението обикновено е 7 дни или до отзвучаване на неутропенията.



При пациенти с тегло <40 kg се препоръчва дозировката за деца.

Пациенти в напреднала възраст

Не е необходимо да се коригира дозировката при пациенти с нормална бъбречна функция. Въпреки това, се препоръчва дозировката да се адаптира при пациенти с нарушена бъбречна функция (виж точка 4.4).

Нарушена бъбречна функция при възрастни

Дозата на цефепим трябва да се коригира, за да компенсира намаленото бъбречно елиминиране. При възрастни пациенти с лека до умерена бъбречна дисфункция, препоръчаната начална доза на цефепим трябва да бъде същата като при пациенти с нормална бъбречна функция. Препоръчаната поддържаща доза трябва да бъде в съответствие с инструкциите в таблицата по-долу.

Когато само серумния креатинин е известен, може да се използва следната формула (Gault и Cockcroft) за определяне на креатининовия клирънс. Серумният креатинин трябва да представлява стабилно състояние на бъбречната функция:

$$\text{Мъже: креатининов клирънс (ml/min)} = \frac{\text{тегло (kg)} \times (140 - \text{възраст})}{72 \times \text{серумен креатинин (mg/dl)}}$$

Жени: 0,85 x изчислената стойност, получена по формулата за мъже

Креатининов клирънс (ml/min)	Препоръчителна поддържаща доза			
> 50	Обичайна доза. Не е необходимо коригиране на дозата.			
	2 g, 3x ден	2 g, 2x ден	1 g, 2x ден	500 mg, 2x ден
30 до 50	2 g, 2x ден	2 g, 1x ден	1 g, 1x ден	500 mg, 1x ден
11 до 29	2 g, 1x ден	1 g, 1x ден	500 mg, 1x ден	500 mg, 1x ден
< 10	1 g, 1x ден	500 mg, 1x ден	250 mg, 1x ден	250 mg, 1x ден
Хемодиализа*	500 mg, 1x ден	500 mg, 1x ден	500 mg, 1x ден	500 mg, 1x ден

* Фармакокинетиката показва, че при пациенти на диализа е необходимо намаляване на дозата. При тези пациенти цефепим трябва да се дозира както следва: 1 грам цефепим на Ден 1 като начална доза, следвана от 500 mg/ден за всички инфекции, с изключение на фебрилна неутропения, при която дозата е 1 грам /ден. В деня на диализа, цефепим трябва да се прилага след хемодиализата. При възможност, цефепим трябва да се прилага по едно и също време всеки ден.

Пациенти на диализа

При пациенти на хемодиализа, приблизително 68% от общото количество на цефепим в началото на диализа ще бъде отстранено по време на 3-часова диализна сесия. В случаи на продължителна амбулаторна перитонеална диализа, цефепим може да се прилага в обичайните дози препоръчвани за пациенти с нормална бъбречна функция, т.е. 500 mg, 1 g, или 2 g, в зависимост от тежестта на инфекцията, но само при 48-часови интервали.

Деца с нормална бъбречна функция

Нормалната препоръчителна доза при деца е:

Вид на инфекцията	Деца над 2 месеца и тегло под 40 kg		
	Доза	Дозов интервал	Продължителност
Пневмония, инфекция на	50 mg / kg	12 часа	10 дни



пикочните пътища, инфекция на кожата и кожните структури		Тежки инфекции: 8 часа	
Бактериален менингит и емпирично лечение на фебрилна неутропения и лечение на пациенти с бактериемия, която възниква във връзка с или се подозира, че е свързана с някоя от изброените инфекции	50 mg / kg	8 часа	7-10 дни

Опитът при деца на възраст под 2 месеца е ограничен. Въз основа на данните получени във възрастовата група > 2 месеца, се препоръчва, базирано на фармакокинетичен модел, при деца на възраст между 1 и 2 месеца да се прилагат дози от 30 mg/kg на 12 часа или на 8 часа. Приложението на цефепим при тези пациенти трябва да се наблюдава внимателно.

При деца с тегло > 40 kg се прилагат инструкциите за дозиране при възрастни. Дозировката при педиатрични пациенти не трябва да надвишава максималната дневна доза за възрастни (2 g на 8 часа). Опитът с интрамускулно приложение при деца е ограничен.

При деца основния път на елиминиране на цефепим е бъбречна екскреция и отделяне с урината; дозировката трябва да се адаптира при деца с увредена бъбречна функция.

Дозировка от 50 mg/kg (пациенти на възраст между 2 месеца и 12 години) и доза от 30 mg/kg (пациенти на възраст между 1 и 2 месеца) са сравними с дози от 2 g при възрастни.

Препоръчва се същия интервал между дозите или същото намаляване на дозата, което е показано за възрастни с бъбречно увреждане.

Пациенти с увредена чернодробна функция

Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане.

Инструкции за употреба

След разтваряне, полученият разтвор е бледо жълт до кафеникав.

Интравенозно приложение

За директно интравенозно приложение Цефепим Хоспира трябва да се разтвори с 10 ml вода за инжекции, глюкоза 50 mg/ml (5%) или 100 mg/ml (10 %) инжекционен разтвор, или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор с глюкоза 50 mg/ml (5 %), Рингер лактат инжекционен разтвор, Рингер лактат инжекционен разтвор с глюкоза 50 mg/ml (5%) или натриев лактат 18,7 mg/ml (M/6) инжекционен разтвор. Приготвеният разтвор се инжектира бавно за период от 3 до 5 минути или директно във вена или в канюлата на инфузионната система, докато пациентът получава инфузия със съвместим интравенозен разтвор.

За интравенозни инфузии прахът се разтваря както е описано за директна интравенозна инжекция. Подходящо количество от получения разтвор се добавя към контейнер със съвместим разтвор за интравенозна инфузия. Разтворът трябва да се прилага за период приблизително 30 минути.



Интрамускулно приложение

Пригответе разтвор за интрамускулно приложение, като използвате 1g Цефепим Хоспира, разтворен с 3 ml вода за инжекции или разтвор на лидокаинов хидрохлорид 5 mg/ml (0,5%) или 10 mg/ml (1%).

Цефепим Хоспира е съвместим със следните инфузионни разтвори: стерилни вода за инжекции, натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор (с или без глюкоза 50 mg/ml (5%)), глюкоза 50 mg/ml (5%) или 100 mg/ml (10%) инжекционен разтвор, Рингер лактат инжекционен разтвор (с или без глюкоза 50mg/ml (5%)), натриев лактат 18,7 mg/ml (M/6) инжекционен разтвор.

Следващата таблица съдържа инструкции за разтваряне:

Количество	Добавен разтворител (ml)	Концентрация (приблизително, в mg/ml)
1 g IV	10,0	90
2 g IV	10,0	160
1 g IM	3,0	230

Цефепим Хоспира може да се прилага едновременно с други антибиотици или други лекарства, като не се използва същата спринцовка, същата перфузионна бутилка или същото място на инжектиране. Разтворите на Цефепим Хоспира са съвместими с амикацин, ампицилин, клиндамицин, хепарин, калием хлорид, теофилин.

Както други цефалоспорици, след разтваряне полученият разтвор може да стане леко жълтеникав, но това не е свързано със загуба на активност. Разтворът трябва да се използва само ако е бистър и свободен от частици.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Несъвместимости

Разтворите на Цефепим Хоспира **не** трябва да се смесват със следните антибиотици: метронидазол, ванкомицин, тентамицин, тобрамицин и нетилмицин, поради физическа или химическа несъвместимост. Ако е показано едновременното лечение, тези антибиотици трябва да се прилагат по отделно.

Срок на годност

Неотворен

2 години

След първо отваряне

Продуктът трябва да се използва веднага след отваряне.

Разтворен продукт

Когато се използва за интрамускулно приложение

Вода за инжекции:

Химическа и физическа стабилност при употреба е доказана за 12 часа при температура 15 до 25°C или 7 дни при не повече от 2 до 8°C.

Разтвор на лидокаинов хидрохлорид 5 mg/ml (0,5%) или 10 mg/ml (1%):

Химическа и физическа стабилност при употреба е доказана за 24 часа при температура 15 до 25°C или 7 дни при не повече от 2 до 8°C.



Когато се използва за интравенозно приложение

Вода за инжекции, натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор (с или без глюкоза 50 mg/ml (5%)), глюкоза 50 mg/ml (5%) или 100 mg/ml (10%) инжекционен разтвор, Рингер лактат инжекционен разтвор (с или без глюкоза 50 mg/ml (5%)) или натриев лактат 18,7 mg/ml (M/6) инжекционен разтвор:

Химическа и физическа стабилност при употреба е доказана за 24 часа при температура 15 до 25°C или 7 дни при не повече от 2 до 8°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и не трябва обичайно да са повече от 24 часа при 2 до 8 °C, освен ако разтварянето не е проведено при контролирани и валидирани асептични условия.

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте флакона в картонената кутия, за да предпазите от светлина.

