

ЛИСТОВКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20162385
Разрешение №	1-35608 / 21-11-2015
Одобрение №	/

Листовка: информация за потребителя

КАНЕСТЕН 500 mg мека вагинална капсула
клотримазол

CANESTEN 500 mg soft vaginal capsule
clotrimazole

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Канестен мека вагинална капсула и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Канестен мека вагинална капсула
3. Как да използвате Канестен мека вагинална капсула
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Канестен мека вагинална капсула
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Канестен мека вагинална капсула и за какво се използва

Активното вещество в Канестен мека вагинална капсула е клотримазол, който принадлежи към групата на имидазолите. Той има широк спектър на действие срещу гъбичките, т.е. разрушава гъбичките и подтиска техния растеж. Също така, той е ефективен срещу микроорганизми като дерматофити, дрожди и плесени.

Канестен мека вагинална капсула е предназначен за лечение на инфекции на вагината и на външните женски полови органи, причинени от чувствителни към клотримазол микроорганизми. Обикновено инфекциите са причинени от гъбички Кандида. Симптомите включват сърбеж, парене и вагинално течение.

Това лекарство се използва при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години.

Вие трябва да се консултирате с лекар, ако не се почувствате по-добре или ако се почувствате по-зле след 7 дни.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Канестен мека вагинална капсула

Не използвайте Канестен мека вагинална капсула:

- ако сте алергични към клотримазол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Канестен мека вагинална капсула, ако имате:

- Вашата първа вагинална инфекция
- повтарящи се инфекции, най-малко четири инфекции през предходната година



- температура от 38 °C или повече
- болки в долната част на корема, болки в гърба
- вагинално течение с неприятна миризма
- гадене
- вагинално кръвотечение и/или едновременно болка в рамената

Не използвайте тампони, вагинални промивки, продукти, които убиват сперматозоидите или други продукти, предназначени за вагинално приложение, едновременно с Канестен мека вагинална капсула.

Избягвайте полов контакт, докато използвате това лекарство, тъй като инфекцията може да се пренесе върху Вашия партньор.

Противозачатъчните свойства на латексовите контрацептиви, като презервативи и диафрагми, могат да бъдат намалени.

Не поглъщайте Канестен меки вагинални капсули.

Други лекарства и Канестен мека вагинална капсула

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Свържете се с Вашият лекар, ако приемате такролимус или сиролимус, лекарства които се използват за контролиране на имунния отговор на тялото след трансплантация на органи.

Също така е възможно концентрацията на определени лекарства да се повиши, ако те се използват едновременно с Канестен мека вагинална капсула. Въпреки това, не се очаква това да се случи при единична доза от 500 mg. Попитайте Вашият лекар за съвет, ако не сте сигурни относно приема на лекарство, едновременно с Канестен мека вагинална капсула.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

• **Бременност**

Като предпазна мярка, употребата на клотримазол трябва да се избягва по време на първите три месеца от бременността.

По време на бременност, не използвайте предоставения апликатор. За това, поставете меката вагинална капсула във влагалището с пръст, за да предотвратите наранявания на шийката на матката.

• **Кърмене**

Канестен мека вагинална капсула не се препоръчва по време на кърмене. Като предпазна мярка, се препоръчва кърменето да бъде прекратено по време на лечението. Попитайте Вашият лекар или фармацевт за съвет.

Шофиране и работа с машини

Канестен мека вагинална капсула няма ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Канестен мека вагинална капсула

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Препоръчителната доза е:

- Една мека вагинална капсула поставена дълбоко във влагалището, като единична доза вечер.

Канестен мека вагинална капсула не се препоръчва по време на менструация. Лечението трябва да бъде прекратено преди началото на менструацията.


Ако вашият сексуален партньор има симптомите на гъбична инфекция, те трябва да бъдат лекувани по същото време.

Ако Вашият сексуален партньор има симптоми на гъбична инфекция, те трябва да бъдат лекувани по същото време.


Инструкции за употреба

Меката вагинална капсула трябва да бъде поставена с помощта на предоставения апликатор, колкото е възможно по-дълбоко във влагалището, преди лягане.


1. Издърпайте навън буталото на апликатора, докато спре. Поставете меката вагинална капсула в апликатора.



2. Поставете меката вагинална капсула плътно в носача на апликатора, като го завъртите леко.



3. Поставете заредения апликатор дълбоко във влагалището. Това се постига най-лесно, когато легнете по гръб, с леко разтворени крака. Натиснете буталото на апликатора навътре докрай. Извадете апликатора с притиснатото бутало.



Поставяне на мека вагинална капсула без апликатор:

Ако сте бременна, поставете меката вагинална капсула във влагалището с пръсти.

Продължителност на лечението

Канестен мека вагинална капсула се използва за лечение като еднократна доза.

Свържете се с Вашия лекар, ако симптомите не са се подобрили значително след 7 дни от началото на лечението, за да се потвърди причината за инфекцията. Ако симптомите се влошат, свържете се с лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Страничните ефекти могат да се появят със следните честоти:

Чести, могат да засегнат до 1 на 10 души:

- парене

Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 души:

- болка в корема
- сърбеж
- зачервяване на кожата/възпаление

Редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 души:

- алергични реакции
- оток
- кожен обрив
- вагинално кървене

С неизвестна честота, според наличните данни:

- генитално олющване
- дискомфорт
- болки в таза

Спрете лечението, ако имате локални странични ефекти или алергични реакции.

Локалните реакции могат да бъдат подобни на симптомите на заболяването. Затова, понякога може да е трудно да различите симптомите на инфекцията от нежеланите реакции, причинени от лекарството.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителната агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg.



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Канестен мека вагинална капсула

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Канестен мека вагинална капсула

- Активното вещество е клотримазол.
 - Една мека вагинална капсула съдържа 500 mg клотримазол.
- Другите съставки са:
 - желатин
 - глицерол
 - бял мек парафин; течен парафин
 - пречистена вода
 - титанов диоксид (E171)
 - хинолиново жълто (E104)
 - сънсет жълто (E110)
 - лецитин (E322)
 - средноверижни триглицериди

Как изглежда Канестен мека вагинална капсула и какво съдържа опаковката

Една жълта вагинална мека капсула в опаковка от фолио и апликатор, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

- **Притежател на разрешението за употреба**
Байер България ЕООД
ул. Резбарска № 5
1510 София
България
- **Производител**
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия: Canesten 500 mg soft vaginal capsule



България: Канестен 500 mg меки вагинални капсули / Canesten 500 mg vaginal capsule, soft
Естония: Canesten
Италия: Gyno-Canesten monodose
Латвия: Canesten 500 mg vaginālā mīkstā kapsula/Canesten 500 mg vaginal soft capsule
Литва: Canesten 500 mg makšties minkštoji kapsulė / Canesten 500 mg vaginal capsule, soft
Полша: Canesten
Румъния: Canesten Gyn Uno 500 mg capsulă moale vaginală
Финландия: Canesten 500 mg vaginal capsule, soft

Дата на последно преразглеждане на листовката: ММ/ГГГГ

