

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Код Рег. №	20170056
Разрешение №	11-36829 / 13-03-2017
Срок действия №	

Листовка: информация за потребителя

Каспофунгин Кселия 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор
Caspofungin Xellia 50 mg powder for concentrate for solution for infusion

Каспофунгин
Caspofungin

Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или детето Ви да получите това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Каспофунгин Кселия и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да получите Каспофунгин Кселия
3. Как да използвате Каспофунгин Кселия
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Каспофунгин Кселия
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Каспофунгин Кселия и за какво се използва

Какво представлява Каспофунгин Кселия

Каспофунгин Кселия съдържа лекарство, наречено caspofungin. То принадлежи към група лекарства, наречени противогъбични.

За какво се използва Каспофунгин Кселия

Каспофунгин Кселия се използва за лечение на следните инфекции при деца, юноши и възрастни:

- Сериозни гъбични инфекции на Вашите тъкани или органи (наречени „инвазивна кандидоза“). Тази инфекция се причинява от гъбични (дрождеви) клетки, наречени кандида (Candida).
- Такъв тип инфекция могат да получат хора, които наскоро са оперирани или чиято имунна система е слаба. Най-честите признаци на такъв тип инфекция са повишена температура и втрисане, които не се повлияват от антибиотично лечение.
- Гъбични инфекции на носа, носните синуси или белите дробове (наречени „инвазивна аспергилоза“), ако други противогъбични лечения не са подействали или са причинили нежелани реакции. Тази инфекция се причинява от плесен, наречена аспергилус (Aspergillus).
- Такъв тип инфекция може да получат хора, които провеждат химиотерапия, които са имали трансплантация, както и хора със слаба имунна система.
- Подозирани гъбични инфекции, ако имате повишена температура, понижен брой на белите кръвни клетки, което не се подобрява от лечение с антибиотици. С риск да получат гъбична инфекция са хора, които наскоро са оперирани или чиято имунна система е слаба.



Как действа Каспофунгин Кселия

Каспофунгин Кселия прави гъбичните клетки податливи и спира нормалния растеж на гъбичките. Това спира разпространението на инфекцията и дава шанс на естествените защитни сили на тялото да се преборят напълно с нея.

2. Какво трябва да знаете, преди да получите Каспофунгин Кселия

Не използвайте Каспофунгин Кселия:

- ако сте алергични към caspofungin или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да приемете лекарството си.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да приемете Каспофунгин Кселия, ако:

- сте алергични към друго лекарство;
- някога сте имали чернодробни проблеми – може да се нуждаете от различна доза от това лекарство;
- вече приемате циклоспорин (използван за предотвратяване отхвърлянето на трансплантиран орган или за потискане на имунната Ви система) – тъй като може да е необходимо лекарят да Ви направи допълнителни кръвни изследвания по време на лечението;
- някога сте имали други здравословни проблеми.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да приемете Каспофунгин Кселия.

Други лекарства и Каспофунгин Кселия

Информирайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, отпускани без рецепта, включително билкови лекарства. Това се налага, тъй като Каспофунгин Кселия може да повлияе върху начина на действие на някои други лекарства. Също така някои други лекарства могат да повлияят върху начина на действие на Каспофунгин Кселия.

Кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

- циклоспорин или такролимус (използвани за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган или за потискане на имунната Ви система) – тъй като може да е необходимо лекарят да Ви направи допълнителни кръвни изследвания по време на лечението;
- някои лекарства против ХИВ, като ефавиренц или невирапин;
- фенитоин и карбамазепин (използвани за лечение на припадъци);
- дексаметазон (стероид);
- рифампицин (антибиотик).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да приемете Каспофунгин Кселия.



Кселия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

- Каспофунгин Кселия не е проучван при бременни жени. Трябва да се използва при бременност, само ако потенциалната полза надвишава потенциалния риск за нероденото бебе.
- Жените, приемащи Каспофунгин Кселия, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Няма данни, които да предполагат какво е влиянието на Каспофунгин Кселия върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Каспофунгин Кселия

Каспофунгин Кселия винаги ще се приготвя и прилага от медицински специалист. Ще приемате Каспофунгин Кселия:

- веднъж всеки ден;
- чрез бавно инжектиране във вената (интравенозна инфузия);
- за около 1 час.

Вашият лекар ще определи продължителността на лечението и по колко Каспофунгин Кселия трябва да приемате всеки ден. Вашият лекар ще проследява как Ви действа лекарството. Ако теглото Ви превишава 80 kg, може да се нуждаете от различна доза.

Деца и юноши

Дозата за деца и юноши може да се различава от дозата за възрастни.

Ако сте получили повече от необходимата доза Каспофунгин Кселия

Вашият лекар ще реши каква е необходимата за Вас доза и продължителност на Каспофунгин Кселия всеки ден. Ако се притеснявате, че сте приели твърде много Каспофунгин Кселия, незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някои от следните нежелани реакции – може да се нуждаете от спешна медицинска помощ:

- обрив, сърбеж, усещане за затопляне, подуване на лицето, устните или гърлото или затруднено дишане – може да сте получили хистаминова реакция към лекарството;
- затруднено дишане с хрипове или влошаващ се обрив – може да сте получили



алергична реакция към лекарството;

- кашлица, сериозни затруднения в дишането – ако сте възрастен и имате инвазивна аспергилоза, може да сте получили сериозен дихателен проблем, който е възможно да доведе до дихателна недостатъчност.

Както при всеки лекарствен продукт по лекарско предписание, някои нежелани реакции може да бъдат сериозни. За повече информация се обърнете към лекаря си.

Други нежелани реакции при възрастни включват:

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души:

- понижен хемоглобин (веществото, пренасящо кислород в кръвта), понижен брой на белите кръвни клетки;
- понижен албумин (тип протеин) в кръвта Ви, понижен калий или ниски нива на калий в кръвта;
- главоболие;
- възпаление на вената;
- задух;
- диария, гадене или повръщане;
- промени в някои лабораторни кръвни изследвания (включително повишени стойности в някои чернодробни изследвания);
- сърбеж, обрив, зачервяване на кожата или прекомерно изпотяване;
- болка в ставите;
- втрисане, повишена температура;
- сърбеж на мястото на инжектиране.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души:

- промени в някои лабораторни кръвни изследвания (включително нарушение на кръвосъсирването, тромбоцитите, червените кръвни клетки и белите кръвни клетки);
- загуба на апетит, повишено количество на телесните течности, нарушение на солевия баланс в организма, високи стойности на кръвна захар, ниски стойности на калций в кръвта, ниски стойности на магнезий в кръвта, повишена киселинност на кръвта;
- дезориентация, нервност, безсъние;
- чувство на замаяност, понижено усещане или чувствителност (особено по кожата), треперене, сънливост, промяна на вкуса, мравучкане или изтръпване;
- замъглено зрение, повишено слъзоотделяне, подуване на клепача, пожълтяване на бялата част на окото (жълтеница);
- усещане за бърз или неравномерен сърдечен ритъм, ускорен сърдечен ритъм, неравномерен сърдечен ритъм, нарушен сърдечен ритъм, сърдечна недостатъчност;
- зачервяване, топли вълни, високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане, зачервяване по хода на вена, която е извънредно чувствителна при докосване;
- стягане на група мускули около въздухоносните пътища (бронхоспазъм), което води до хрипове или кашлица, учестено дишане, недостиг на въздух, което Ви буди от сън, недостиг на кислород в кръвта, необичайни звуци при дишане, хрипящи звуци в белите дробове, затруднено дишане, запушен нос, болка в гърлото;
- коремна болка, болка в горната част на корема, раздуване, запек, трудно преглъщане, сухота в устата, нарушено храносмилане, отделяне на газове.



- стомашен дискомфорт, подуване поради събиране на течност в корема;
- понижено отделяне на жлъчна течност, увеличен черен дроб, пожълтяване на кожата и/или бялата част на очите, увреждане на черния дроб, причинено от лекарство или химично вещество, чернодробно нарушение;
- променена кожна тъкан, генерализиран сърбеж, копривна треска, разнообразен по вид обрив, променена кожа, червени и често сърбящи петна по крайниците, а понякога – по лицето и останалата част на тялото
- болка в гърба, болка в ръката или крака, болка в костите, мускулна болка, мускулна слабост;
- загуба на бъбречната функция, внезапна загуба на бъбречната функция;
- болка на мястото на катетъра, оплаквания на мястото на инжектиране (зачервяване, твърда бучка, болка, подуване, възпаление, обрив, копривна треска, изтичане на течност от катетъра в тъканта), възпаление на вената на мястото на инжектиране;
- повишено кръвно налягане и промяна в някои кръвни изследвания (включително бъбречни електролити и изследвания за съсирване на кръвта), повишени нива на лекарствата, които вземате и са довели до отслабване на имунната система;
- дискомфорт в областта на гръдния кош, болка в гръдния кош, усещане за промяна на телесната температура, общо неразположение, генерализирана болка, подуване на лицето, подуване на глезените, ръцете или стъпалата, подуване, болезненост, усещане за умора.

Нежелани реакции при деца и юноши

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души:

- повишена температура.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души:

- главоболие;
- учестен сърдечен ритъм;
- зачервяване, ниско кръвно налягане;
- промени в някои лабораторни кръвни изследвания (повишени стойности в някои чернодробни изследвания);
- сърбеж, обрив;
- болка на мястото на катетъра;
- втрисане;
- промени в някои лабораторни кръвни изследвания.

Други нежелани реакции, съобщени след пускане на това лекарство в продажба

С неизвестна честота: честотата не може да бъде оценена:

- чернодробни проблеми;
- подуване на глезените, ръцете или ходилата;
- съобщения за повишени нива на калций в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва всички възможни неопишани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8



1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Каспофунгин Кселия

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и флакона, след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват в хладилник (2°C – 8°C).

Разтвореният концентрат: трябва да се използва веднага. Данните за стабилност показват, че концентратът за инфузионен разтвор може да се съхранява до 24 часа, когато флаконът е съхраняван при температура до 25°C и разтворът е приготвен с вода за инжекции.

Готовият за прилагане на пациенти инфузионен разтвор: трябва да се използва веднага. Данните за стабилност показват, че продуктът може да се използва до 24 часа, когато се съхранява при температура до 25°C, или до 48 часа, когато интравенозният инфузионен сак (бутилка) се съхранява в хладилник (от 2 до 8°C) и е разреден със съвместим инфузионен разтвор.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията за съхранение на готовия за употреба разтвор преди употреба са отговорност на самия потребител и не трябва да надвишават 24 часа при 2 до 8°C, освен ако повторно не се разтвори и разрежи при контролирани и валидирани асептични условия.

След като е приготвен, Каспофунгин Кселия трябва да се използва незабавно. Това се налага поради факта, че не съдържа съставки, спиращи развитието на бактерии. Този лекарствен продукт трябва да се приготвя само от обучен медицински специалист, прочел пълните инструкции (моля, вижте по долу „Инструкции за разтваряне и разреждане на Каспофунгин Кселия“).

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Каспофунгин Кселия

- Активното вещество е caspofungin. Всеки флакон Каспофунгин Кселия съдържа 50 mg каспофунгин като ацетат. Концентрацията на разтворения флакон е 5,2mg/ml.
- Другите съставки са захароза, манитол, янтарна киселина и натриев хидроксид.



Как изглежда Каспофунгин Кселия и какво съдържа опаковката
Каспофунгин Кселия е стерилен, бял до светлосив компактен прах.

Всяка опаковка съдържа един флакон с прах.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Xellia Pharmaceuticals ApS
Dalslandsgade 11
2300 Copenhagen S
Дания

Производител

Xellia Pharmaceuticals Ltd
Szállás utca 3, 1107 Budapest
Унгария

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия	Каспофунгин Кселия 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Белгия	Каспофунгин Кселия 50 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
България	Каспофунгин Кселия 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор
Чешка република	Каспофунгин Кселия 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Германия	Каспофунгин Кселия 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Дания	Каспофунгин Кселия
Естония	Каспофунгин Кселия
Гърция	Каспофунгин Кселия 50 mg κόκκος για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Испания	Каспофунгин Кселия 50 mg Polvo para concentrado para solución para perfusión
Финландия	Каспофунгин Кселия 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Франция	Caspofungine Xellia 50 mg, poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion
Хърватия	Kaspofungin Xellia 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Унгария	Каспофунгин Кселия 50 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
Ирландия	Каспофунгин Кселия 50 mg Powder for concentrate for solution for infusion
Италия	Каспофунгин Кселия
Лихтенщайн	Каспофунгин Кселия 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung



	einer Infusionslösung
Литва	Caspofungin Xellia 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
Люксембург	Caspofungin Xellia 50 mg poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion
Латвия	Caspofungin Xellia 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Нидерландия	Caspofungine Xellia 50 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Норвегия	Caspofungin Xellia
Полша	Caspofungin Xellia
Португалия	Caspofungin Xellia 50 mg
Румъния	Caspofungină Xellia 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabila
Швеция	Caspofungin Xellia 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Словения	Kaspofungin Xellia 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
Словакия	Caspofungin Xellia 50 mg prášok na infúzny koncentrát
Великобритания (Обединено кралство)	Caspofungin 50 mg Powder for concentrate for solution for infusion

Дата на последно преразглеждане на листовката: юли 2016

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински или здравни специалисти:

Инструкции за разтваряне и разреждане на Каспофунгин Кселия:

Разтваряне на Каспофунгин Кселия

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛЮКОЗА, тъй като в тях Каспофунгин Кселия е нестабилен. НЕ СМЕСВАЙТЕ И НЕ ВЛИВАЙТЕ КАСПОФУНГИН КСЕЛИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, тъй като няма налични данни за съвместимостта между Каспофунгин Кселия и други интравенозно прилагани вещества, добавки или лекарствени продукти. Огледайте инфузионния разтвор за наличие на частици или промяна в цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ

Стъпка 1. Разтваряне на обикновени флакони

За да разтворите праха, поставете флакона на стайна температура и асептично добавете 10,5 ml вода за инжекции. Концентрацията на разтворения флакон ще бъде 5,2 mg/ml.

Този бял до светлосив компактен лиофилизиран прах се разтваря напълно. Смесете внимателно до получаване на бистър разтвор. Готовият разтвор трябва да се огледа за наличие на частици или промяна в цвета. Приготвеният разтвор може съхранява до 24 часа при температура до 25°C.



Стъпка 2. Добавяне на разтворения Каспофунгин Кселия към инфузионния разтвор за пациента

Разтворителите за приготвяне на крайния разтвор за инфузия са: инжекционен разтвор на натриев хлорид или разтвор на Рингер лактат. Инфузионният разтвор се приготвя чрез асептично добавяне на необходимото количество разтворен концентрат (както е показано на таблицата по-долу) към инфузионен сак или бутилка от 250 ml. При клинична необходимост, за дневните дози от 50 mg или 35 mg може да се използва инфузия с намален обем 100 ml. Да не се използва, ако разтворът е мътен или има утайка.

ПРИГОТВЯНЕ НА ИНФУЗИОННИЯ РАЗТВОР ЗА ВЪЗРАСТНИ

ДОЗА*	Обем на разтворения Каспофунгин Кселия за прехвърляне в интравенозен сак или бутилка	Стандартно приготвяне (разтвореният Каспофунгин Кселия се добавя към 250 ml) Крайна концентрация	Инфузия с намален обем (разтвореният Каспофунгин Кселия се добавя към 100 ml) Крайна концентрация
50 mg	10 ml	0,20 mg/ml	-
50 mg при намален обем	10 ml	-	0,47 mg/ml
35 mg при умерено чернодробно увреждане (от един флакон от 50 mg)	7 ml	0,14 mg/ml	-
35 mg при умерено чернодробно увреждане (от един флакон от 50 mg) при намален обем	7 ml	-	0,34 mg/ml

* 10,5 ml трябва да се използват за разтваряне на всички флакони

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ

Изчисляване на телесната повърхност (BSA) за дозиране при педиатрични пациенти

Преди да пригответе инфузията, изчислете телесната повърхност (BSA) на пациента чрез следната формула: (Формула на Mosteller)¹

- 1 Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. *N Engl J Med* 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)



$$\text{Телесна повърхност (m}^2\text{)} = \sqrt{\frac{\text{Ръст (cm)} \times \text{Телесно тегло (kg)}}{3600}}$$

Приготвяне на инфузия 70 mg/m² за педиатрични пациенти на възраст > 3 месеца (с помощта на флакон от 50 mg)

1. Определете действителната натоварваща доза, която ще се прилага на педиатричния пациент, като използвате BSA на пациента (изчислена по горния начин) и следното уравнение:
BSA (m²) X 70 mg/m² = натоварваща доза
Максималната натоварваща доза в Ден 1 не трябва да надвишава 70 mg, независимо от изчислената за пациента доза.
2. Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Кселия да достигне стайна температура.
3. Чрез асептична техника добавете 10,5 ml вода за инжекции.^a Така приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при температура до 25°C.^b По този начин крайната концентрация на caspofungin във флакона ще стане 5,2 mg/ml.
4. Изтеглете от флакона обема лекарство, равен на изчислената натоварваща доза (стъпка 1). Чрез асептична техника прехвърлете този обем (ml)^c разтворен Каспофунгин Кселия в интравенозен сак (или бутилка), съдържащ 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 0,9%, 0,45% или 0,225% или Рингер лактат за инжекции. Обемът (ml)^c разтворен Каспофунгин Кселия може също така да се добави към намален обем инжекционен разтвор на натриев хлорид 0,9%, 0,45% или 0,225% или Рингер лактат за инжекции, без крайната концентрация да надвишава 0,5 mg/ml. Този инфузионен разтвор трябва да се използва до 24 часа, ако се съхранява при температура до 25°C, или до 48 часа, ако се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8°C.

Приготвяне на инфузия 50 mg/m² за педиатрични пациенти на възраст > 3 месеца (с помощта на флакон от 50 mg)

1. Определете действителната дневна поддържаща доза, която ще се прилага на педиатричния пациент, като използвате BSA на пациента (изчислена по горния начин) и следното уравнение:
BSA (m²) X 50 mg/m² = дневна поддържаща доза
Дневната поддържаща доза в Ден 1 не трябва да надвишава 70 mg, независимо от изчислената за пациента доза.
2. Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Кселия да достигне стайна температура.
3. Чрез асептична техника добавете 10,5 ml вода за инжекции.^a Така приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при температура до 25°C.^b По този начин крайната концентрация на caspofungin във флакона ще стане 5,2 mg/ml.
4. Изтеглете от флакона обема лекарство, равен на изчислената дневна поддържаща доза (стъпка 1). Чрез асептична техника прехвърлете този обем (ml)^c разтворен Каспофунгин Кселия в интравенозен сак (или бутилка), съдържащ 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 0,9%, 0,45% или 0,225% или Рингер лактат за инжекции. Обемът (ml)^c разтворен Каспофунгин Кселия може също така да се добави към намален обем инжекционен разтвор на натриев хлорид 0,9%, 0,45% или 0,225% или Рингер лактат за инжекции, без крайната концентрация да надвишава 0,5 mg/ml. Този инфузионен разтвор трябва да се използва до 24 часа,



ако се съхранява при температура до 25°C, или до 48 часа, ако се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8°C.

Забележки за приготвянето:

- ^a Тази бяла до светлосива компактна маса се разтваря напълно. Смесете внимателно до получаване на бистър разтвор.
- ^b Проверявайте визуално приготвения разтвор за частици или промяна в цвета по време на разтварянето и преди инфузия. Да не се използва, ако разтворът е мътен или има утайка.
- ^c Каспофунгин Кселия е приготвен така, че при изтегляне на 10 ml от флакона се осигурява пълната доза, посочена върху флакона (50 mg).

