

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Цефподикон 40 mg/5 ml гранули за перорална суспензия
(цефподоксим)
Cefpodicon 40 mg /5 ml granules for oral suspension
(cefpodoxime)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате на детето си това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Цефподикон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефподикон
3. Как да приемате Цефподикон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефподикон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2018 0188
Разрешение №	B6/M8/Mp-51384
Одобрение №	24-07-2010

1. Какво представлява Цефподикон и за какво се използва

Цефподикон 40 mg/5 ml гранули за перорална суспензия съдържа активното вещество цефподоксим. То принадлежи към група антибиотици, наречени „цефалоспорини“.

Цефподикон се използва за лечение на следните бактериални инфекции на:

- ухото;
- носа, синусите (като например синусит);
- гърлото (като например тонзилит, фарингит);
- белите дробове (като например бронхит, пневмония).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефподикон

Не приемайте Цефподикон, ако:

- сте алергични към цефподоксим или към някоя от останалите съставки на този лекарствен продукт (изброени в точка 6).
- сте имали тежка алергична реакция към някой друг антибиотик (пеницилини, монобактами и карбапенеми), тъй като може да сте алергични също и към цефподоксим.

Ако смятате, че това се отнася до Вас, не приемайте Цефподикон, преди да сте се консултирали с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цефподикон:

- Ако някога ви е казано, че бъбреците Ви не функционират много добре, също така ако сте подложени на друг вид лечение (например диализа) при бъбречна недостатъчност. В този случай може да приемате Цефподикон, но в по-ниска доза;
- Ако страдате от смущения на стомашно-чревния тракт и по-специално хроничен колит;



• Това лекарство може да промени резултатите на някои тестове за откриване на глюкоза в урината (като например пробите на Benedict или Fehling). Ако имате диабет и тествате урината си редовно, уведомете Вашия лекар. Това се налага поради това, че трябва да се използват други тестове за контрол на диабета Ви, докато примате това лекарство.

Други лекарства и Цефподикон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

По-специално, кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

- антиацидни средства (използвани за лечение на проблеми с храносмилането);
- ранитидин или циметидин (използвани за лечение на язви);
- диуретици, използвани за увеличаване на количеството на отделената урина;
- аминогликозидни антибиотици (използвани за лечение на инфекции);
- кумаринови антикоагуланти, като например варфарин (използвани за разреждане на кръвта).

Антиацидните средства и/или противоязвените лекарства (например ранитидин или циметидин) трябва да се приемат 2—3 часа след цефподоксима. Вашият лекар знае за това и ще промени лечението, ако е необходимо.

Изследвания

Ако са Ви необходими някакви изследвания (на кръв, урина), докато приемате това лекарство, уведомете лекаря си, че приемате Цефподикон.

Цефподикон с храна, напитки и алкохол

Цефподикон може да се приема независимо от приема на храна и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство е предназначено за употреба при децата.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство е предназначено за употреба при децата.

Цефподикон гранули за перорална суспензия съдържа захароза и лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Цефподикон


Винаги използвайте Цефподикон, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приготвяне на суспензията

Преди приготвяне на суспензията, сушителят от силикагел поставен от вътрешната страна на капачката, трябва да се отстрани и изхвърли. За да пригответе суспензията първо трябва да се разклати бутилката. Прибавете вода до около средата на марката от 100 ml на бутилката и разклатете енергично. След това добавете вода до марката от 100 ml на бутилката и разклатете енергично, до получаване на еднородна суспензия.

Препоръчителната средна доза за деца до 11 години е 8 mg/kg/дневно, разделени на два приема в интервал от 12 часа.

Дозата се прилага с мерителната лъжица, която ще намерите в опаковката. Деленията на лъжицата съответстват на теглото на детето в килограми от 5 kg до 25 kg и по-малки деления на всеки 1 kg. Дозата се прилага направо с мерителната лъжица. Например ако Вашето дете тежи 12 kg, лъжицата трябва да се напълни до второто по-малко деление след делението 10 kg.



Мерителната лъжица е подходяща само за тази перорална суспензия.

Таблицата представя дозировката спрямо теглото на детето, както е означено на мерителната лъжица.

Телесно тегло в kg	Цефподоксим в mg, за прилагане два пъти дневно
5	20
10	40
15	60
20	80
25	100

Деца с бъбречни проблеми

В зависимост от сериозността на бъбречните проблеми, може цефподоксим да се приема порядко от два пъти дневно, например веднъж дневно или през ден. Вашият лекар ще прецени необходимата доза.

Важно е да приемате лекарството си точно в съответните часове от денонощието.

Как да приемате Цефподикон

Важно е да прилагате на детето си това лекарство точно в съответните часове от денонощието. Този лекарствен продукт може да се приема с или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цефподикон

Ако Вие или Вашето дете случайно приемете прекалено голямо количество от това лекарство, веднага говорете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Цефподикон

Ако сте зпропуснали да приемете дозата си в точното за това време, трябва да я приемете възможно най-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, пропуснете забравената доза. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза в правилното време и продължете както преди.

Ако сте спрели приема на Цефподикон

Не спирайте приема на Цефподикон, без да го обсъдите първо с Вашия лекар. Не спирайте да приемате Цефподикон само, защото се чувствате по-добре. Ако спрете приема на Цефподикон твърде рано, инфекцията може да се появи отново или пак да се влоши.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежелани лекарствени реакции са изброени по честота.

Състояния, за които трябва да следите

Следните нежелани реакции могат да засегнат малък брой от хора, но точната им честота е неизвестна:

- **тежка алергична реакция.** Признаците ѝ включват надигнат и сърбящ обрив, подуване, понякога на лицето или устата, което може да причини затруднено дишане,
- **кожен обрив,** който може да има мехурчета и да изглежда като малки мишени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около нея)



- широко разпространен обрив с мехури и лющене на кожата (това може да са признаци на *синдром на Стивънс-Джонсън* или на *токсична епидермална некролиза*).

Всички тези реакции изискват спешна медицинска помощ. Ако мислите, че имате някоя от тези нежелани реакции, спрете приема на това лекарство и се свържете с Вашия лекар или с най-близкия център за спешна помощ.

Чести: (могат да засегнат до 1 от 10 човека)

- стомашни проблеми: подуване, гадене, повръщане, стомашна болка, газове и диария;
- загуба на апетит.

Ако имате тежка диария, която може да бъде и кървава, незабавно спрете приема на това лекарство и се свържете с Вашия лекар.

Нечести: (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

- реакции на свръхчувствителност (кожни обриви, които са по-леки алергични реакции от изброените по-горе, надигнат обрив (копривна треска), сърбеж;
- главоболие;
- изтръпване и мравучкане (иглички) на крайниците;
- световъртеж;
- шум в ушите;
- слабост, чувство за общо неразположение.

Редки: (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека)

- промяна в чернодробните показатели;
- анемия;
- промяна в броя на кръвните клетки (симптомите могат да включват: умора, нова инфекция, лесна поява на синини или на кръвотечения;
- повишаване на някои видове бели кръвни клетки;
- повишаване броя на тромбоцитите, които са необходими за съсирването на кръвта.

Много редки: (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека)

- анафилактични реакции (напр. бронхоспазъм, пурпура и едем на лицето и крайниците);
- влошаване на бъбречната функция;
- чернодробни увреждания;
- повишена податливост на инфекции;
- много бързо разрушаване на червените кръвни клетки (*хемолитична анемия*).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Цефподикон



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте този лекарствен продукт след срока на годност, отбелязан върху опаковката (след съкращението EXP, използвано за отбелязване на срока на годност.) Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Неприготвеното лекарство трябва да се съхранява под 25°C в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Готовата суспензия трябва да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C), не повече от 10 дни.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефподикон

Активното вещество е цефподоксим.

След приготвяне на суспензията 5 ml перорална суспензия съдържат 40 mg цефподоксим под формата на цефподоксим проксетил.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, царевично нишесте, кроскармелоза натрий, жълт железен оксид (E172), хидроксипропилцелулоза, разтворима целулоза, колоиден безводен силициев диоксид, безводна лимонена киселина, натриев бензоат (E211), захароза, бананов аромат, натриев цитрат.

Как изглежда ЦЕФПОДИКОН и какво съдържа опаковката

Гранули за перорална суспензия

Белезникав гранулиран прах и белезникава суспензия с бананов вкус, след смесване с вода.

Цефподикон 40 mg/5 ml гранули за перорална суспензия за приготвяне на 100 ml суспензия е опакован в HDPE бутилка със защитена от деца запушалка.

Картонената кутия съдържа една (1) бутилка, мерителна лъжица и листовка за пациента.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

ФАРМАКОНС АД

бул. "Пейо К. Яворов" №44, ет.1,

София 1164

България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Май 2018г.

