

Листовка: информация за потребителя

ДОПОЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Ред. №

20100308

Приложение №

BG/MK/MP-73128-31

Карбоплатин Актавис 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Carboplatin Actavis 10 mg/ml concentrate for infusion solution

0.9-10-2018

741-73201

карбоплатин (carboplatin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Карбоплатин Актавис и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Карбоплатин Актавис
3. Как ще Ви приложат Карбоплатин Актавис
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как се съхранява Карбоплатин Актавис
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Карбоплатин Актавис и за какво се използва

Какво представлява Карбоплатин Актавис

Карбоплатин Актавис съдържа карбоплатин, който спада към група лекарства, известни като платина-съдържащи съединения, които се използват за лечение на рак.

За какво се използва Карбоплатин Актавис

Карбоплатин Актавис се използва за лечение на напреднал рак на яйчниците и дребноклетъчен рак на белия дроб.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Карбоплатин Актавис:

Карбоплатин Актавис не трябва да Ви се прилага:

- ако сте алергични към карбоплатин или някои от съставките на това лекарство (описани в точка 6);
- ако имате сериозни проблеми с бъбреците (креатининов клирънс 30 ml/min или по-малко);
- ако имате нарушен баланс на кръвните клетки (тежка миелосупресия);
- ако имате кървящи тумори;
- едновременно с ваксина против жълта треска.

Ако нещо от описаното по-горе се отнася до Вас и Вие още не сте го обсъждали с Вашия лекар или медицинска сестра, трябва да го направите възможно най-скоро и то преди да Ви бъде направена инфузията.



Карбоплатин Актавис обикновено се прилага на пациентите в болнични условия. Не се налага Вие да боравите с това лекарство. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви приложат лекарството и ще Ви наблюдават внимателно и често по време на лечението и след него. Преди всяко приложение ще Ви проведат изследване на кръвта.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да Ви приложат Карбоплатин Актавис:

- ако сте бременна или има вероятност да сте бременна;
- ако кърмите;
- ако имате главоболие, променена умствена дейност, гърчове и нарушено зрение от замъгляване до загуба на зрението, кажете на Вашия лекар;
- ако получите силна умора и задух с намален брой на червените кръвни клетки (симптоми на хемолитична анемия), самостоятелно или в комбинация с нисък брой тромбоцити, необичайни синини (тромбоцитопения) и бъбречно заболяване, при което отделяте малко или не отделяте никаква урина (симптоми на хемолитично-уремичен синдром), кажете на Вашия лекар;
- ако имате треска (температура по-висока или равна на 38°C), или втрисане, които може да са признаци на инфекция, незабавно уведомете Вашия лекар, тъй като може да сте изложени на риск от инфекция на кръвта;
- ако има вероятност да консумирате алкохол докато Ви правят инфузия.

Ако бъбреците Ви не функционират правилно, ефектът на карбоплатин върху кръвотворната система се засилва и удължава в сравнение с пациентите с нормална бъбречна функция. Вашият лекар ще иска да следи състоянието Ви по-редовно, ако бъбреците Ви не функционират правилно.

Ако нещо от описаното по-горе се отнася до Вас и Вие още не сте го обсъждали с Вашия лекар или медицинска сестра, трябва да го направите възможно най-скоро и то преди да Ви бъде направена инфузията.

По време на лечението с карбоплатин ще Ви бъдат дадени лекарства, които помагат за намаляване на потенциално животозастрашаващо усложнение, известно като тумор-лизис синдром, който се причинява от биохимични нарушения в кръвта поради разпад на умиращите ракови клетки, които освобождават съдържанието си в кръвта.

Вашата инфузия може да бъде разреждана с друг разтвор преди приложение. Необходимо е да обсъдите това с Вашия лекар, за да сте сигурни, че той е подходящ за Вас.

Кажете на лекаря, ако мислите, че детето Ви има проблеми със слуха, тъй като загубата на слух е по-силно изразено при деца, лекувани с това лекарство.

Други лекарства и Карбоплатин Актавис:

Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като те могат да взаимодействат с Карбоплатин Актавис:

- други лекарства, които потискат имунната система (напр. циклоспорин, такролимус, сиролимус и други противоракови лекарства);
- други лекарства, за които е известно, че са токсични за Вашите бъбреци (напр. аминогликозидни антибиотици);



- други лекарства, за които е известно, че увреждат слуха или функциите на ухото, свързани с баланса (напр. аминогликозидни антибиотици; фуросемид (използван за лечение на сърдечна недостатъчност и оток));
- хелиращи средства (вещества, които се свързват с карбоплатин, поради което намаляват неговия ефект);
- фенитоин и фосфенитоин (използвани за лечение на различни видове конвулсии и гърчове);
- антикоагуланти (използван за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци);
- бримкови диуретици (използвани при лечение на високо кръвно налягане и оток).

Докато се лекувате с карбоплатин не трябва да приемате ваксини, съдържащи живи вируси.

Карбоплатин Актавис с храна, напитки и алкохол

Не е известно да има взаимодействие между Карбоплатин Актавис и алкохол. Все пак трябва да се консултирате с Вашия лекар, тъй като Карбоплатин Актавис може да повлияе на способността на черния дроб да се справи с алкохола.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Ако нещо от описаното по-горе се отнася до Вас и Вие още не сте го обсъждали с Вашия лекар или медицинска сестра, трябва да го направите възможно най-скоро и то преди да Ви бъде направена инфузията.

Бременност

Не трябва да бъдете лекувана с Карбоплатин Актавис по време на бременност, освен в случай на ясни предписания от Вашия лекар. Проучвания върху животни показват възможен риск от аномалии за развиващия се плод. Ако Ви лекуват с Карбоплатин Актавис по време на бременността, трябва да обсъдите с Вашия лекар възможния риск от увреждане на нероденото Ви дете.

Жени в детеродна възраст трябва да използват ефективни средства против забременяване както преди, така и по време на лечението с карбоплатин. Тъй като карбоплатин може да доведе до генетично увреждане, ако по време на лечението с карбоплатин настъпи бременност се препоръчва провеждане на генетична консултация. Генетична консултация се препоръчва и за пациенти, които искат да имат деца след лечението с Карбоплатин Актавис.

Кърмене

Не е известно дали карбоплатин преминава в майчиното мляко, поради което по време на лечение с Карбоплатин Актавис кърменето трябва да се преустанови.

Фертилитет

Карбоплатин може да причини генетично увреждане. Жени в детеродна възраст трябва да бъдат съветвани да избягват забременяване, като използват ефективни контрацептивни средства по време на лечението. На жени, които вече са бременни или са забременели по време на лечението, трябва да се осигури генетична консултация.

Мъжете, които провеждат лечение с карбоплатин, трябва да бъдат съветвани да не стават бащи по време на лечението и до 6 месеца след лечението. Преди лечението те трябва да се консултират относно съхраняване на сперма поради възможността от необратими увреждания на възпроизводителната функция.



Шофиране и работа с машини

Карбоплатин не оказва влияние върху способността за шофиране и работата с машини. Все пак, трябва да сте изключително внимателни след приложение на първата инфузия, особено ако се чувствате замаяни и несигурни.

3. Как ще Ви приложат Карбоплатин Актавис

Инфузията се прилага винаги от медицинска сестра или лекар. Тя обикновено се прилага капково чрез бавно вливане във вената (интравенозно) в продължение на 15 до 60 минути. Ако Ви е необходима допълнителна информация, обърнете се към Вашия лекар и медицинската сестра, които ще проведат или са провели инфузията.

Дозата зависи от Вашата височина и тегло, от функционирането на кръвотворната Ви система и от бъбречната функция. Вашият лекар ще определи най-подходящата за Вас доза. Концентратът за инфузионен разтвор обикновено се разрежда преди употреба.

Възрастни

Обичайната доза е 400 g/m² телесна повърхност (изчислена на базата на височината и теглото).

Пациенти в старческа възраст

Могат да се използват обичайните дози за възрастни, макар че лекарят може да използва различна доза.

Бъбречни проблеми

Прилаганото количество може да варира в зависимост от функцията на бъбреците. Ако имате проблеми с бъбреците, Вашият лекар може да понижи дозата и да назначи често изследване на кръвта, както и проследяване на бъбречната функция. Инфузията се прилага от лекар, който има опит в прилагане на противоракови лекарства.

Употреба при деца и юноши

Няма достатъчно опит от приложението на карбоплатин при деца, за да могат да се направят препоръка за специфична дозировка.

Възможно е да почувствате, че Ви се гади в началото на лечението с Карбоплатин Актавис. Преди началото на лечението с Карбоплатин Актавис Вашият лекар може да Ви даде друго лекарство, което да намали тези ефекти.

Обикновено има интервал от четири седмици между всяка доза Карбоплатин Актавис. Вашият лекар може да поиска да Ви се провежда изследване на кръвта всяка седмица след вливане на Карбоплатин Актавис, за да може да определи правилно следващата Ви доза.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Карбоплатин Актавис

Малко вероятно е да получите твърде висока доза карбоплатин. Ако все пак това се случи, може да имате проблеми с бъбреците, черния дроб, зрението и слуха и нисък брой бели кръвни клетки. Ако се тревожите, че Ви е приложена твърде висока доза или имате въпроси относно приложената доза, обърнете се към лекаря или медицинската сестра, които прилагат лекарството.



Ако сте пропуснали да използвате Карбоплатин Актавис

Малко вероятно е да пропуснете една доза от лекарството, тъй като лекарят дава указания кога да Ви се прилага лекарството. Ако смятате, че има пропусната доза, обърнете се към Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Уведомете незабавно лекаря, ако забележите следните нежелани реакции:

- необичайни синини, кървене или признаци на инфекция, като възпалено гърло и повишена температура;
- силен кожен сърбеж (с надигнат обрив) или подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднения при гълтането или дишането (ангиоедем) и може да почувствате, че ще припаднете;
- стоматит (например възпалени устни или язви в устата).

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

- потисната функция на костния мозък, която се характеризира със силно намаляване на белите кръвни клетки, вследствие на което е по-вероятно възникване на инфекции (левкопения, неутропения);
- намален брой тромбоцити, което повишава риска от образуване на синини и кървене (тромбоцитопения);
- анемия (състояние, при което е намален броят на червените кръвни и това води до уморяемост);
- повишени стойности на пикочна киселина в кръвта, което може да предизвика подагра (хиперурикемия);
- лека загуба на слуха (загуба на слуха при високите честоти);
- гадене или повръщане;
- болки и спазми в областта на корема;
- необичайно усещане за умора или слабост;
- отклонения в стойностите на чернодробните ензими и отклонения в чернодробните функционални изследвания. Вашият лекар може да поиска да Ви наблюдава;
- понижена функция на Вашите бъбреци (намален бъбречен креатинов клирънс, повишена урея в кръвта);
- намаление на стойностите на соли в кръвта Ви (натрий, калий, калций, магнезий). Вашият лекар може да поиска да Ви наблюдава.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

- инфекции;
- необичайни синини или кървене (хеморагични усложнения);
- алергични реакции, вкл. обрив, уртикария, зачервяване на кожата, сърбеж, повишена температура;
- слабост, изтръпване или скованост (периферна невропатия);
- изтръпване и мравучкане;



- намалени дълбоки сухожилни рефлекс (рефлекторно съкращаване на мускула при почукване върху мускулното сухожилие);
- сетивни нарушения;
- промяна във вкуса;
- загуба или липса на сила;
- зрителни нарушения, включително временна загуба на зрението;
- звън в ушите (тинитус), увреждане на слуха и загуба на слуха;
- сърдечносъдово нарушение;
- белодробни нарушения, сраствания и уплътнения на белия дроб със затруднено дишане, понякога фатално (интерстициална белодробна болест), затруднено дишане;
- диария, запек;
- лигавични увреждания;
- косопад;
- кожни нарушения;
- сърбящ кожен обрив (уртикария);
- сърбеж (пруритус);
- червен обрив (еритематозен обрив);
- мускулно-скелетно нарушение;
- заболявания, засягащи пикочните пътища и половата система (урогенитални нарушения);
- грипоподобен синдром;
- повишени стойности на креатинин, билирубин и пикочна киселина в кръвта. Вашият лекар може да поиска да Ви наблюдава.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

- рак, причинен от химио- или лъчетерапията (вторични злокачествени образувания);
- повишена температура и втрисане без данни за инфекция;
- зачервяване, подуване и болка или мъртва кожа около мястото на инжектиране.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):

- общо неразположение с висока температура поради ниски стойности на белите кръвни клетки (фебрилна неутропения);
- тежки алергични реакции (анафилаксия/анафилактоидни реакции). Симптомите на тежка алергична реакция са: внезапно хриптене или стягане в гърдите, подуване на клепачите, лицето или устните, зачервяване на лицето, ниско кръвно налягане, ускорен сърдечен ритъм, уртикария, задух, замайване и анафилактичен шок;
- ниски нива на натрий в кръвта (хипонатриемия);
- загуба на апетит (анорексия);
- възпаление на зрителния нерв, което може да причини пълна или частична загуба на зрението (оптичен неврит);
- тежко увреждане на чернодробната функция, увреждане или смърт на чернодробни клетки. Вашият лекар може да поиска да Ви наблюдава.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):

- кръвоизлив в мозъка, който може да доведе до инсулт или загуба на съзнание;
- сърдечна недостатъчност;
- внезапно запушване на артерия (емболия), високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане.



С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

- хемолитично-уремичен синдром (заболяване, характеризиращо се с остра бъбречна недостатъчност/слабо отделяне на урина или липса на урина, намален брой червени кръвни клетки със силна слабост и нисък брой тромбоцити);
- патологична поява на синини или кръвене и признаци на инфекция;
- обезводняване;
- възпаление на устните или язви в устата (стоматит);
- група от симптоми, като главоболие, променена умствена дейност, гърчове и нарушено зрение от замъгляване до загуба на зрението (симптоми на синдром на обратима задна левкоенцефалопатия - рядко неврологично заболяване);
- панкреатит;
- белодробна инфекция;
- група от симптоми, като умора, синини и кръвене, инфекции, треска и необяснима загуба на тегло (симптоми на промиелоцитна левкемия - форма на рак, който засяга образуването на кръвни клетки в костния мозък);
- мускулни спазми, мускулна слабост, обърканост, загуба или нарушения на зрението, неравномерен пулс, бъбречна недостатъчност или отклонения в резултатите от кръвни изследвания (симптоми на тумор-лизис синдром, който може да бъде причинен от бързия разпад на туморните клетки) (вижте точка 2).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Карбоплатин Актавис

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Преди отваряне на флаконите: Да се съхранява под 25°C. Флаконът да се съхранява във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

След разтваряне: Химичната и физична стабилност при употреба са доказани в продължение на 8 часа при 25°C.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно, освен ако методът на разреждане не изключва риска от микробно замърсяване. Ако не се използва незабавно, срокът на съхранение и условията преди употреба са изцяло отговорност на потребителя.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Карбоплатин Актавис

- Активното вещество е карбоплатин. Един ml концентрат съдържа 10 mg карбоплатин.
- Другата съставка е вода за инжекции.

Как изглежда Карбоплатин Актавис и съдържание на опаковката

Карбоплатин Актавис е бистър, безцветен до бледожълт разтвор.

Видове опаковки: 1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 15 ml, 1 x 45 ml, 1 x 60 ml

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Исландия

Производители:

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.11th Ion Mihalache Blvd.

011171, Bucharest

Румъния

Actavis Italy S.p.A. – Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano, Milan

Италия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

България	Карбоплатин Актавис 10 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор
Чешка Република	Carbosol 10 mg/ml
Дания	Carboplatin Actavis
Естония	Carboplatin Actavis
Финландия	Carboplatin Actavis 10 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Германия	Carboplatin-Actavis 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Унгария	Bopactin 10 mg/ml
Исландия	Carboplatin Actavis
Италия	Carboplatino Aurobindo
Литва	Carboplatin Actavis 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
Латвия	Carboplatin Actavis 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Нидерландия	Carboplatine Aurobindo 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Норвегия	Carboplatin Actavis
Полша	Carboplatin Actavis
Швеция	Carboplatin Actavis
Словения	Bopacatin 10 mg/ml
Словакия	Bopacatin 10 mg/ml

Дата на последно преразглеждане на листовката:



Следната информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба – Цитотоксичен

Карбоплатин е предназначен само за интравенозно приложение. Препоръчителната доза

Карбоплатин Актавис при нелекувани възрастни пациенти с нормална бъбречна функция, т.е. креатининов клирънс $> 60 \text{ ml/min}$ е 400 mg/m^2 се прилага еднократно, под формата на краткотрайна 15 до 60-минутна интравенозна инфузия. Алтернативно за определяне на дозата може да се използва формула на Calvert, показана по-долу :

Доза (mg) = таргетно AUC ($\text{mg/ml} \times \text{min}$) $\times [\text{GFR ml/min} + 25]$

Доза (mg) = таргетно AUC ($\text{mg/ml} \times \text{min}$) $\times [\text{GFR ml/min} + 25]$		
Таргетно AUC	Планирана химиотерапия	Лечебен статус на пациента
5-7 $\text{mg/ml} \times \text{min}$	карбоплатин монотерапия	Нелекувани преди
4-6 $\text{mg/ml} \times \text{min}$	карбоплатин монотерапия	Лекувани преди
4-6 $\text{mg/ml} \times \text{min}$	карбоплатин плюс циклофосфамид	Нелекувани преди

Забележка: По формулата на Calvert, общата доза Карбоплатин Актавис се изчислява в mg, а не в mg/m^2 . Формулата на Calvert не трябва да се използва при пациенти с екстензивна предшестваща терапия**.

****Пациенти с екстензивна предшестваща терапия са онези, които вече са приемали:**

- Митомицин С
- Нитрозоурея
- Комбинирана терапия с доксорубицин/ циклофосфамид/цисплатин
- Комбинирана терапия с 5 или повече продукта
- Лъчетерапия $\geq 4500 \text{ rad}$, фокусирана върху поле $20 \times 20 \text{ cm}$ или върху повече от едно поле

Лечението с карбоплатин трябва да бъде преустановено при неотговарящ на лечението тумор, при прогресиращо заболяване и/или настъпване на непоносими нежелани лекарствени реакции.

Лечението не трябва да се повтаря преди да са изминали четири седмици от предишния курс на лечение с Карбоплатин Актавис или докато броят на неутрофилите е по-нисък от 2000 клетки/mm^3 , а броят на тромбоцитите е по-нисък от $100000 \text{ клетки/mm}^3$.

Препоръчва се началната доза да се понижи с 20-25% при пациенти с рискови фактори, като предшестващо миелосупресивно лечение и влошено общо състояние (ECOG-Zubrod 2-4 или Karnofsky под 80). За определяне на бъдещи дози се препоръчва определяне на хематологичния надир чрез ежеседмично проследяване на кръвните показатели по време на началния курс на лечение с Карбоплатин Актавис.

Нарушена бъбречна функция:

При пациенти с креатининов клирънс под 60 ml/min рискът от тежка миелосупресия е повишен.

Оптималната употреба на Карбоплатин Актавис при пациенти с нарушена бъбречна функция изисква адекватни корекции на дозата и често проследяване на хематологичния надир и на бъбречната функция.

Липсват достатъчно данни относно употребата на карбоплатин при пациенти с креатининов клирънс 15 ml/min или по-нисък, за да се дадат препоръки за лечение.



Комбинирана терапия:

Оптималната употреба на Карбоплатин Актавис в комбинация с други миелосупресивни средства изисква дозата да се коригира и адаптира според одобрените схема и режим на лечение.

Употреба при деца:

Наличната информация е недостатъчна, за да се препоръча дозировка при педиатричната популация.

Пациенти в старческа възраст:

При пациентите над 65 години е необходимо по време на началния и последващите терапевтични курсове дозата да се коригира в зависимост от общото състояние на пациента.

Разреждане и разтваряне:

Продуктът трябва да се разрежи преди инфузия с 5% декстроза разтвор или 0,9% разтвор на натриев хлорид, за постигане на най-ниска концентрация от 0,5 mg/ml.

Несъвместимости

Игли или инфузионни системи, съдържащи алуминиеви части, които могат да влязат в контакт с Карбоплатин Актавис не трябва да се използват при приготвяне или приложение на Карбоплатин Актавис.

Карбоплатин Актавис не трябва да се смесва с други лекарствени продукти с изключение на 5% декстроза разтвор или 0,9% натриев хлорид разтвор.

Карбоплатин може да влезе във взаимодействие с алуминий и да образува черен преципитат. Игли, спринцовки, катетри или инфузионни системи, съдържащи алуминиеви части, които могат да влязат в контакт с карбоплатин, не трябва да се използват при приготвяне или приложение на карбоплатин.

Срок на годност и съхранение

Карбоплатин Актавис е предназначен само за еднократна употреба.

Преди отваряне на флакона: Да се съхранява под 25°C. Флаконът да се съхранява във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

След разтваряне: Химичната и физична стабилност са доказани в продължение на 8 часа при 25°C.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва незабавно да бъде употребен, освен ако методът на разреждане не изключва риска от микробно замърсяване. Ако не се използва незабавно, срокът на съхранение и условията преди употреба са изцяло отговорност на потребителя.


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА, ПРИГОТВЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАРБОПЛАТИН АКТАВИС

Работа с Карбоплатин Актавис

Подобно на други антинеопластични средства, Карбоплатин Актавис трябва да се приготвя и с него да се работи много внимателно. Необходимо е да се вземат следните предпазни мерки при работа с Карбоплатин Актавис.

Персоналът трябва да бъде обучен в техниките за разтваряне и боравене с разтвора.

- 1 Карбоплатин Актавис трябва да се приготвя за приложение само от професионалисти, специално обучени относно безопасна работа с химиотерапевтици. Необходимо е



- персоналът да носи защитно облекло: очила, престилки и ръкавици, и маски за еднократна употреба.
- 2 Трябва да се отдели специално определена зона за приготвяне на инжекциите (за предпочитане при система с ламинарен поток). Работната повърхност трябва да се покрие с абсорбираща хартия (долният слой да бъде от пластмаса) за еднократна употреба.
 - 3 Всички изделия, използвани за разтваряне, приложение или почистване (включително ръкавици) трябва да се поставят в торби за изхвърляне на особено опасни отпадъци, които да бъдат изгорени при висока температура.
 - 4 Разсипани или разлети материали трябва да се третират с разреден натриев хидрохлорид (1% хлор), като за предпочитане е да се накснат, а след това да се измият с вода. Всички замърсени и почистващи материали трябва да се поставят в торби за изхвърляне на особено опасни отпадъци, които да бъдат изгорени. При случаен контакт с кожата или очите да се измие обилно с вода, или сапун и вода или разтвор на натриев бикарбонат. Кожата не трябва да се търка с четка. Да се потърси медицинска помощ. Ръцете да се измиват винаги след сваляне на ръкавиците.
 - 5 Бременни жени от персонала не трябва да боравят с цитотоксичния лекарствен продукт.

Приготвяне на разтвор за инфузия

Карбоплатин Актавис концентрат за инфузионен разтвор трябва да се разрежи преди употреба. Разреждането може да стане с декстроза или натриев хлорид, до достигане на ниска концентрация 0,5 mg/ml (500 micrograms/ml).

Изхвърляне

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в отпадните води или с битовите отпадъци. Всички материали, използвани за приготвяне, приложение или които са били в контакт с карбоплатин, трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за работа с цитотоксични лекарства.

