

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Cefprozime ESP Pharma 40 mg/5 ml powder for oral suspension
 Цефподоксим ЕСП Фарма 40 mg/5 ml прах за перорална суспензия
 цефподоксим (cefprozime)

Листовка - Приложение 2

Към Ред М. 20/20051

Разрешение № 20304 / 21.11.2012

Одобрен №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вашето дете. Не го прехвърляйте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като тези, на Вашето дете.
- Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:

1. Какво представлява Цефподоксим ЕСП Фарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да дадете Цефподоксим ЕСП Фарма на Вашето дете
3. Как да давате Цефподоксим ЕСП Фарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефподоксим ЕСП Фарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цефподоксим ЕСП Фарма и за какво се използва

Цефподоксим ЕСП Фарма 40 mg/5 ml прах за перорална суспензия съдържа лекарство, наречено цефподоксим. То принадлежи към група антибиотици, наречени „цефалоспоринови“.

Цефподоксим ЕСП Фарма 40 mg/5 ml прах за перорална суспензия е създаден специално за деца.

Преди да пригответе суспензията, отстранете капсулата, която се намира под капачката. Суспензията се приготвя като се добавя преварена охладена вода до маркировката в горния край на бутилката. Разклаща се внимателно, за да се получи равномерно разтваряне.

Цефподоксим ЕСП Фарма се използва за лечение на следните бактериални инфекции:

- Инфекции на ушите
- Инфекции на носа, синусите (синусит)
- Инфекции на гърлото (тонзилит, фарингит)
- Инфекции на белите дробове (bronхит, пневмония)
- Кожни инфекции (абсцеси, язви, инфектирани рани, възпалени космени фоликули, карбункули, фурункули, инфекции около ноктите, целулит)
- Инфекции на отделителната система (цистит и инфекции на бъбреците)

2. Какво трябва да знаете преди да дадете Цефподоксим ЕСП Фарма на Вашето дете

Не давайте това лекарство на Вашето дете:

- Ако детето Ви е алергично (свръхчувствително) към цефподоксим, към други цефалоспоринови или към някои от останалите съставки на това лекарство.
- Признаците на алергична реакция могат да бъдат: обрив, затруднено дишане, подуване на устните, лицето, гърлото и езика.



Не давайте това лекарство на детето Ви, ако става дума за някои от горните симптоми. Ако не сте сигурни, консултирайте се с педиатър или с Вашия фармацевт, преди да дадете Цефподоксим ЕСП Фарма.

- Ако детето Ви има фенилкетонурия (тъй като този продукт съдържа аспартам). Може да бъде вреден за Вашето дете
- Ако детето Ви не понася или не усвоява някои захари (тъй като този продукт съдържа захароза и лактоза монохидрат)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да дадете Цефподоксим ЕСП Фарма, ако Вашето дете:

- има алергия към антибиотици от пеницилиновата група
- страда от колит
- има проблеми с бъбреците
- е новородено, на възраст под 15 дни

Ако не сте сигурни дали детето Ви има едно от горепосочените състояния, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да дадете това лекарство.

Други лекарства и Цефподоксим ЕСП Фарма

Кажете на педиатъра или на Вашия фармацевт, ако детето Ви приема или наскоро е приемало други лекарства, или ще трябва да приема други лекарства, включително лекарства без рецепта и такива на билкова основа. Цефподоксим ЕСП Фарма може да окаже влияние върху действието на други лекарства. Някои медикаменти също могат да взаимодействат с Цефподоксим ЕСП Фарма.

Кажете на педиатъра, ако детето Ви приема някое от следните лекарства:

- антиациди (за понижаване киселинността на стомаха и лечение на нарушено храносмилане)
- лекарства за лечение на язва (ранитидин, циметидин)
- отводняващи лекарства (диуретици), използвани за увеличаване обема на урината
- аминогликозидни антибиотици (за лечение на инфекции)
- пробенецид (за подагра).
- кумаринови антикоагуланти, като варфарин (използвани за разреждане на кръвта)
- естрогени (хормони, които се съдържат в противозачатъчните)

Антиациди и лекарства за язва се приемат 2-3 часа след приема на Цефподоксим ЕСП Фарма. Вашият педиатър знае за това и ще промени лечението, при нужда.

Изследвания

Ако детето Ви има нужда от изследвания (на кръв или урина) докато взима това лекарство, уведомете педиатъра, че детето приема Цефподоксим ЕСП Фарма.

Цефподоксим ЕСП Фарма с храна, напитки и алкохол

Лекарството се усвоява по-добре, когато се приема по време на хранене.

Цефподоксим ЕСП Фарма 40 mg/5 ml за деца за перорална суспензия съдържа аспартам, лактоза монохидрат и захароза

Ако детето Ви е с установена непоносимост към някои захари, консултирайте се с педиатър преди да дадете това лекарство. Това е необходимо, защото Цефподоксим ЕСП Фарма съдържа захароза и лактоза (вж. точка „Предупреждения и предпазни мерки“).

Цефподоксим ЕСП Фарма съдържа аспартам, който е източник на фенилalaniн, който може да навреди на деца със заболяването, наречено „фенилкетонурия“. (вж. точка „Предупреждения и предпазни мерки“).



3. Как да давате Цефподоксим ЕСП Фарма

Винаги давайте Цефподоксим ЕСП Фарма според предписанията на педиатъра. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

- Давайте това лекарство на Вашето дете през устата
- Давайте това лекарство на Вашето дете по време на хранене
- Цефподоксим ЕСП Фарма е в комплект с мерителна лъжичка (5ml). Използвайте лъжичката, за да дадете лекарството.
- Ако мислите, че ефектът на лекарството е твърде слаб или твърде силен, не променяйте дозата сами, а се консултирайте с педиатър.

Колко Цефподоксим ЕСП Фарма да дадете на детето Ви

Попитайте Вашия фармацевт, ако не сте сигурни за дозата, която трябва да бъде дадена. Количеството на приетото лекарство зависи от теглото и възрастта на детето.

- Дозата обикновено се дава два пъти дневно (сутрин и вечер)
- Лекарството трябва да се взема за предписания брой дни. Фармацевтът ще Ви даде точното количество от лекарството за този период от време

Изследвания на кръвта

Ако детето Ви взима това лекарство за повече от 10 дни, лекарят или медицинската сестра може да назначат изследване на кръвта. Това е рутинна процедура и няма място за безпокойство.

Ако детето Ви приеме повече Цефподоксим ЕСП Фарма отколкото трябва

Ако детето Ви приеме твърде много от това лекарство, кажете на Вашия лекар веднага.

Ако забравите да дадете Цефподоксим ЕСП Фарма на Вашето дете

Не се притеснявайте, ако пропуснете една доза. Изчакайте до времето за следващата доза. Не давайте двойна доза на детето, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете да давате Цефподоксим ЕСП Фарма на Вашето дете

Не спирайте да давате лекарството, без преди това да сте се консултирали с Вашия лекар. Детето Ви не трябва да спира да взима Цефподоксим ЕСП Фарма, само защото се е почувствало по-добре, понеже инфекцията може да се повтори или да се влоши.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Кажете веднага на лекаря Ви или идете до най-близкото болнично заведение, ако забележите някоя от следните нежелани лекарствени реакции – детето Ви може да се нуждае от спешна медицинска помощ:

- Ако детето Ви има тежка алергична реакция. Симптомите включват подуване на врата, лицето или гърлото и трудно дишане.
- Поява на мехурчета или кръвене от кожата около устните, очите, устата, носа и гениталиите. Също така грипозни симптоми и висока температура. Това може да бъде състояние, наречено „синдром на Stevens-Johnson“.
- Тежък обрив с излющване на участъци от кожата, на мястото на който се появява подлежащата тъкан. Също така усещане за общо неразположение, треска, болки в мускулите. Това може да бъде състоянието, наречено „токсична епидермална некролиза“.



- Тежка чревна инфекция, характеризираща се с диария, треска и болка в областта на корема (което може да бъде тежко заболяване, наречено „псевдомембранозен колит“).
- Ако детето Ви има грипозни симптоми, консултирайте се с Вашия педиатър, тъй като синдромът на Stevens-Johnson и токсичната епидермална некролиза често започват с такива симптоми.

Ако при детето Ви се наблюдават кожни проблеми, трябва да престанете да му давате Цефподоксим ЕСП Фарма. Кажете веднага на Вашия педиатър.

Уведомете веднага педиатъра, ако детето получи:

- обрив, сърбеж или друг кожен проблем,
- треска,
- болки в ставите.

Това може да са признаци на алергия към медикамента. Педиатърът ще Ви посъветва какво да правите.

Други нежелани лекарствени реакции може да включват диария.

Ако тя стане тежка, спрете да давате лекарството на детето Ви и се свържете с Вашия педиатър.

Кажете веднага на педиатъра, ако детето:

- започне да се чувства зле
- има болки в стомаха
- има главоболие
- вие му се свят
- има шум в ушите
- се чувства уморено или слабо
- има изтръпване на крайниците
- има усещане за студ

Кажете на педиатъра, ако някоя от тези нежелани лекарствени реакции стане сериозна или продължава повече от няколко дни, или ако установите нежелани реакции, които не са посочени в листовката:

Това лекарство може да окаже ефект върху кръвта или черния дроб на детето, въпреки че това е много необичайно. Може да причини чувство на обща отпадналост и умора.

Ако смятате, че детето Ви реагира зле на това лекарство или има някакви проблеми, обсъдете ги с педиатъра или фармацевта Ви.

5. Как да съхранявате Цефподоксим ЕСП Фарма

Неразтвореният продукт трябва да се съхранява под 25°C.

Разтворената суспензия може да се съхранява до 10 дни в хладилник (2-8°C).

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, посочен на бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Политайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефподоксим ЕСП Фарма 40mg/5ml прах за перорална употреба



- Активното вещество във всяка лъжичка от 5 ml е 52,18 mg цефподоксим проксетил, еквивалентен на 40 mg цефподоксим.

- Другите съставки са: лактоза монохидрат, кармелоза натрий, кармелоза калций, хидроксипропилцелулоза, натриев лаурилсулфат, кроскармелоза натрий, силициев диоксид, колоиден безводен, натриев бензоат, лимонена киселина, безводна, натриев хлорид, аспартам, аромат на банан, моносодиев L-глутамат, талк, захароза.

Как изглежда Цефподоксим ЕСП Фарма и какво съдържа опаковката

Цефподоксим ЕСП Фарма 40mg/5ml прах за перорална суспензия се съдържа в бутилки от 50 ml, 100 ml със защитена от деца капачка и е в комплект с мерителна лъжичка (5 ml).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78,
Hafnarfjörður
Исландия

Производител

Orchid Europe Limited
Building 3, Chiswick Park
566 Chiswick High Road,
Chiswick, London
W4 5YA
Обединеното кралство

Този листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно преразглеждане на листовката – Август 2012 г.

