

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Цефподоксим ЕСП Фарма 200 mg филмирани таблетки
 Cefprozime ESP Pharma 200 mg film-coated tablets
 цефподоксим (cefprozime)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го претягвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите всякакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:

1. Какво представлява Цефподоксим ЕСП Фарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цефподоксим ЕСП Фарма
3. Как да приемате Цефподоксим ЕСП Фарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефподоксим ЕСП Фарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цефподоксим ЕСП Фарма и за какво се използва

Цефподоксим ЕСП Фарма 200 mg таблетки съдържа лекарство, наречено цефподоксим. То принадлежи към група антибиотици, наречени „цефалоспорины“.

Цефподоксим ЕСП Фарма се използва за лечение на следните бактериални инфекции:

1. Инфекции на носа, синусите (синусит)
2. Инфекции на гърлото (тонзилит, фарингит)
3. Инфекции на белите дробове (bronхит, пневмония)
4. Кожни инфекции (абсцеси, язви, инфектирани рани, възпалени космени фоликули, карбункули, фурункули, инфекции около ноктите, целулит)
5. Инфекции на отделителната система (цистит и инфекции на бъбреците)
6. Инфекции, предавани по полов път - гонорея.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цефподоксим ЕСП Фарма

Не приемайте Цефподоксим ЕСП Фарма филмирани таблетки :

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към цефподоксим, към други цефалоспорины или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Признаците на алергична реакция могат да бъдат: обрив, затруднено преглъщане или дишане, подуване на устните, лицето, гърлото и езика.

Не приемайте това лекарство, ако при Вас се наблюдава някоя от горните симптоми. Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар или фармацевт, преди да приемете таблетките.

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цефподоксим ЕСП Фарма, ако:

- има алергия към антибиотици от пеницилиновата група
- страдате от колит
- имате проблеми с бъбреците

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените състояния се отнася за Вас, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Други лекарства и Цефподоксим ЕСП Фарма

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали други лекарства, или ще трябва да приемате други лекарства, включително лекарства без рецепта и такива на билкова основа. Цефподоксим ЕСП Фарма може да окаже влияние върху действието на други лекарства. Някои медикаменти също могат да взаимодействат с Цефподоксим ЕСП Фарма.

Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

- антиациди (за понижаване киселинността на стомаха и лечение на нарушено храносмилане)
- лекарства за лечение на язва (ранитидин, циметидин)
- отводняващи лекарства (диуретици), използвани за увеличаване обема на урината
- аминогликозидни антибиотици (за лечение на инфекции)
- пробенецид (за подагра).
- кумаринови антикоагуланти, като варфарин (използвани за разреждане на кръвта)
- естрогени (хормони, които се съдържат в противозачатъчните)

Антиациди и лекарства за язва се приемат 2-3 часа след приема на Цефподоксим ЕСП Фарма.

Изследвания

Ако е необходимо да Ви се проведат някои изследвания (на кръв или урина) докато приемате това лекарство Вашият лекар трябва да знае, че приемате Цефподоксим ЕСП Фарма.

Цефподоксим ЕСП Фарма с храна, напитки и алкохол

Лекарството се усвоява по-добре, когато се приема по време на хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако приемате Цефподоксим ЕСП Фарма не трябва да кърмите, тъй като малки количества от антибиотика могат да преминат в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини

Ако почувствате замаяване след приема на Цефподоксим ЕСП Фарма филмирани таблетки, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Цефподоксим ЕСП Фарма съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Цефподоксим ЕСП Фарма

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Прием на продукта

- Лекарството се приема през устата.
- Приемайте лекарството по време на хранене.
- Таблетките не трябва да се чупят, стриват или дъвчат.
- Ако мислите, че ефектът на лекарството е твърде слаб или твърде силен, не променяйте дозата сами, а се консултирайте с лекар.

По колко таблетки да приемате

Дозировката зависи от вида и тежестта на инфекцията. Вашият лекар ще Ви посъветва по колко таблетки да приемате:

Възрастни

Инфекции на горните дихателни пътища (синусит, тонзилит, фарингит)

При синусит – по 1 таблетка два пъти дневно;

При тонзилит и фарингит цефподоксим се прилага само в краен случай, като резервен антибиотик.

Инфекции на долните дихателни пътища (бронхит, пневмония)

По 1 таблетка два пъти дневно.

Инфекции на пикочните пътища

Неусложнени инфекции на горните пикочни пътища – по 1 таблетка два пъти дневно.

Гонорея – 1 таблетка еднократно.

Инфекции на кожата и меките тъкани

По 1 таблетка два пъти дневно.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст с нормална бъбречна функция не е необходима корекция на дозата.

Чернодробни нарушения

Не е необходима корекция на дозата.

Бъбречни нарушения

Вашият лекар ще Ви назначи по-ниска доза.

Употреба при деца и юноши

Лекарствената форма не е подходяща за приложение при деца.

Изследвания на кръвта

Ако приемате това лекарство повече от 10 дни, лекарят или медицинската сестра може да назначат изследване на кръвта. Това е рутинна процедура и няма място за безпокойство.

Ако сте приели по-голяма от необходимата доза Цефподоксим ЕСП Фарма

Необходимо е да спазвате дозировката, посочена в тази листовка. Ако приемете по-голяма от необходимата доза, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. При предозиране могат да се наблюдават: обърканост, липса на емоции или интерес към всичко и възбуда.

Ако сте пропуснали да приемете Цефподоксим ЕСП Фарма

Не се притеснявайте, ако пропуснете една доза. Изчакайте до времето за следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.



Ако сте спрели приема на Цефподоксим ЕСП Фарма

Не спирайте да приемате лекарството, без преди това да сте се консултирали с Вашия лекар. Не трябва да прекратявате лечението с Цефподоксим ЕСП Фарма, само защото сте се почувствали по-добре, понеже инфекцията може да се повтори или да се влоши.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Кажете веднага на лекаря Ви или идете до най-близкото болнично заведение, ако забележите някоя от следните нежелани лекарствени реакции – Вие може да се нуждаете от спешна медицинска помощ:

- Ако имате тежка алергична реакция. Симптомите включват подуване на шията, лицето или гърлото и трудно дишане.
- Поява на мехурчета или кръвене от кожата около устните, очите, устата, носа и гениталните. Също така грипозни симптоми и висока температура. Това може да бъде състояние, наречено „синдром на Стивънс-Джонсън“.
- Тежък обрив с изпояване на участъци от кожата, на мястото на които се вижда подлежащата тъкан. Също така усещане за общо неразположение, температура, втрисане и болки в мускулите. Това може да бъде състоянието, наречено „токсична епидермална некролиза“.
- Ако имате кожен обрив или изменения на кожата под формата на петна с розов/червен пръстен и блед център, които сърбят, изпояват се или се пълнят с течност. Обривът може да се появи по дланите или ходилата на краката. Това са признаци на сериозна алергия към лекарство и се нарича "еритема мултиформе".
- По време на лечението с антибиотика Вие можете да получите инфекции, по-лесно, отколкото обикновено. Това може да се дължи на заболяване на кръвта и е по-вероятно да се случи, ако приемате таблетките продължително време.
- Тежка чревна инфекция, характеризираща се с диария, треска и болка в областта на корема (което може да бъде тежко заболяване, наречено „псевдомембранозен колит“).
- Пожълтяване на кожата, очите или устата и чувство на умора. Можете също така да бъдат по-пребледнали от нормалното. Това би могло да се дължи на тежка анемия.

Спрете да приемате лекарството и се свържете с Вашия лекар, ако:

- Имате тежка диария
- Уведомете лекуващия си лекар, ако някой от следните симптоми стане сериозен или продължава по-дълго от няколко дни:**
- повдигане или повръщане
 - болки в стомаха
 - главоболие
 - световъртеж
 - шум в ушите
 - чувство на умора или слабост
 - изтръпване и мравучкане на крайниците
 - усещане за студ



Изследвания на кръвта

Това лекарство може да промени стойностите на чернодробните ензими в кръвта Ви, което се наблюдава ако черният Ви дроб не функционира добре.

Ако смятате, че реагирате зле на това лекарство или имате някакви проблеми, обсъдете ги с Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Цефподоксим ЕСП Фарма

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите промени във вида или цвета на таблетката.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефподоксим ЕСП Фарма филмирани таблетки

- Активното вещество е цефподоксим (cefprozime) 200 mg.
- Помощните вещества са: кармелоза калций, кроскармелоза натрий, натриев лаурил сулфат, хидроксипропил целулоза, лактоза безводна, магнезиев стеарат. Филмово покритие: Опадрай бял.

Как изглежда Цефподоксим ЕСП Фарма филмирани таблетки и какво съдържа опаковката
Всяка филмирана таблетка е бяла до почти бяла, с овална форма с надпис 200 от едната страна и гладка от другата страна.

Филмираните таблетки са опаковани в Alu/Alu блистер.

По 6, 10, 14, 15 и 20 филмирани таблетки в опаковка.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78,

220 Hafnarfjörður

Исландия

Производител:

Orchid Europe Limited

Building 3, Chiswick Park

566 Chiswick High Road,

Chiswick, London



W4 5YA

Обединеното кралство

Този листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Активис ЕАД

Ул. "Атанас Дуков" № 29

1407 София, България

Тел. 02 9321762; 02 9321771

Дата на последно преразглеждане на листовката – юли, 2012 г.

