

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС 6,25 mg таблетки
КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС 12,5 mg таблетки
КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС 25 mg таблетки
CARVEDILOL GRINDEKS 6,25 mg tablets
CARVEDILOL GRINDEKS 12,5 mg tablets
CARVEDILOL GRINDEKS 25 mg tablets

Карведилол (*Carvedilol*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Карведилол Гриндекс и за какво се използва
2. Преди да използвате Карведилол Гриндекс
3. Как да използвате Карведилол Гриндекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Карведилол Гриндекс
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Контролна	20/20070-72
Разрешение №	19995/96/97-01.11.
Одобрение №	2012

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Карведилол Гриндекс съдържа карведилол, който е бета-блокатор. Лекарството има много действия, които разширяват употребата му при лечение на сърдечно-съдови заболявания. Активното вещество на Карведилол Гриндекс разширява кръвоносните съдове и намалява периферното съдово съпротивление. Затова Карведилол Гриндекс се използва за лечение на хипертония (високо кръвно налягане) и стенокардия. Клиничните данни показват, че Карведилол Гриндекс е подходящ за лечение на хипертония при пациенти с бъбречно заболяване или захарен диабет (*diabetes mellitus*).

Дългосрочното лечение с Карведилол Гриндекс има благоприятен ефект върху серумните липиди чрез намаляване на общия холестерол, липопротеините с ниска плътност и триглицеридите и повишаване на липопротеините с висока плътност. Карведилол Гриндекс притежава антиоксидантни свойства и ефекти за очистване на свободните радикали. Карведилол Гриндекс се използва също при лечение на сърдечна недостатъчност.

Карведилол Гриндекс се използва за лечение на:

- Есенциална хипертония (високо кръвно налягане).
- Хронична стабилна стенокардия. Карведилол Гриндекс се използва за профилактично лечение на хронична стабилна стенокардия.
- Симптоматична хронична сърдечна недостатъчност. Карведилол Гриндекс се използва за лечение на стабилна лека, умерена и тежка хронична сърдечна недостатъчност като допълнение към стандартните терапии, т.е. диуретици, дигоксин и АСЕ-инхибитори.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС



Не използвайте Карведилол Гриндекс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към карведилол или към някоя от останалите съставки на Карведилол Гриндекс
- ако имате нестабилна/декомпенсирана сърдечна недостатъчност,
- ако имате подчертано задържане на течности или претоварване, налагащи венозно приложение на лекарствени продукти, стимулиращи работата на сърдечния мускул,
- ако имате затруднения с дишането поради астма или хронично обструктивно белодробно заболяване (бронхит или бронхоспазм),
- ако имате много бавен сърдечен ритъм (< 50 удара в минута) или тежка хипотония (систолично кръвно налягане < 85 mmHg),
- други тежки сърдечни проблеми,
- феохромоцитом (освен ако не е адекватно контролиран чрез алфа блокада),
- ако имате чернодробна недостатъчност,
- ако имате повишена киселинност на кръвта (метаболитна ацидоза).

Ако страдате от някое от състоянията, посочени по-горе, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате Карведилол Гриндекс.

Обърнете специално внимание при употребата на Карведилол Гриндекс

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на Карведилол Гриндекс:

- ако имате проблеми с бъбреците;
- ако имате проблеми с черния дроб; Може да се наложи Вашият лекар да намали дозата;
- ако имате диабет (високо ниво на кръвната захар). Лекарството може да маскира някои симптоми на намаленото ниво на кръвната захар (хипогликемия). Поради това Вашата кръвна захар трябва да бъде редовно проследявана;
- ако имате склонност към бронхоспастични реакции;
- ако имате вид стенокардия, наречен „вариантна ангина на Принцметал“;
- ако имате проблеми с кръвоносните съдове (периферна съдова болест);
- ако имате проблеми с кръвообращението в пръстите на ръцете и краката (феномен на Рейно). Може да има обостряне на симптомите;
- ако имате феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза, който причинява пристъпи на повишено кръвно налягане);
- ако някога сте имали проблеми с щитовидната жлеза;
- ако страдате от тежка мускулна слабост (*Myasthenia gravis*);
- ако имате заболяване на кожата, наречено „псориазис“ (вижте също точка 4);
- ако някога сте имали сериозна алергична реакция (например внезапно подуване, водещо до затруднено дишане или преглъщане, подуване на ръцете, краката и глезените или тежък обрив);
- ако имате алергия и сте подложени на десенсибилизираща терапия;
- ако носите контактни лещи. Карведилол Гриндекс може да намали сълзенето.

Ако някое от горенброените се отнася за Вас или ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Карведилол Гриндекс.

При пациенти с хронична сърдечна недостатъчност е необходимо наблюдение на клиничното състояние 2-3 часа след започване на лечението, както и всеки път, при увеличение на дозата на Карведилол Гриндекс. Бъбречната функция ще се контролира преди увеличаване на дозата.

Пациенти с нарушения на проводимостта на сърцето трябва да използват Карведилол Гриндекс изключително според съвета на лекаря.

Карведилол Гриндекс може да причини много бавен сърдечен ритъм. Ако Вашият пулс падне под 55 удара в минута, Вашият лекар ще намали дозата.

Ако Ви предстои операция, информирайте Вашия лекар или медицински специалист, че приемате Карведилол Гриндекс.

Синдром на отнемане



Не прекъсвайте и не спирайте използването на Карведилол Гриндекс без да се посъветвате с Вашия лекар. Внезапното спиране на Карведилол Гриндекс може да предизвика нежелани лекарствени реакции (остри симптоми на стенокардия, повишен риск от инфаркт на миокарда и сърдечни аритмии, както и влошаване на симптомите на тиреотоксикоза). Приемът на Карведилол Гриндекс трябва да се спре постепенно в продължение на 1 - 2 седмици, когато е възможно. Ако стенокардията се влоши, препоръчва се незабавно възстановяване на приема на Карведилол Гриндекс, поне временно, в съответствие със съветите на лекаря.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Активното вещество карведилол може да повлияе начина, по който някои лекарства действат. Също така други лекарства могат да повлияят начина на действие на Карведилол Гриндекс.

По-специално, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

- дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност). Едновременната употреба може да доведе до повишени нива на дигоксин в кръвта. По тази причина нивото на дигоксин трябва да бъде следено. Карведилол Гриндекс може да засили брадикардията (забавен сърдечен ритъм), причинена от дигоксин;
- циклоспорин (използван след трансплантация на органи). Карведилол Гриндекс може да увеличи концентрацията на циклоспорин в кръвта, следователно, след започване на приема на Карведилол Гриндекс, кръвната концентрация на циклоспорин трябва да бъде следена;
- рифампицин (използван за лечение на инфекции). Действието на Карведилол Гриндекс може да бъде намалено;
- барбитурати (лекарства за лечение на епилепсия). Действието на Карведилол Гриндекс може да бъде намалено;
- циметидин (използван за лечение на нарушено храносмилане, киселини и язва на стомаха). Може да засили действието на карведилол;
- еритромицин (антибиотик, използван за лечение на инфекции). Може да засили действието на карведилол;
- флувоксамин (лекарство за лечение на депресия). Може да засили действието на карведилол;
- алуминиев хидроксид, коlestирамин: абсорбцията на карведилол се забавя, ако се използват едновременно;
- лекарства за диабет, включително инсулин. Лекарството може да маскира някои симптоми на понижаването ниво на кръвната захар (хипогликемия);
- пропранолол, инхибитори на катехоламините (MAO-инхибитори, резерпин);
- верапамил, дилтиазем или други антиаритмици (напр. амиодарон). Съществува риск от тежка брадикардия или сърдечен блок. Верапамил инжекции може да доведе до тежка хипотония. Амиодарон повишава риска от камерни (вентрикуларни) аритмии;
- клонодин (използван за лечение на високо кръвно налягане, мигрена и горещи вълни по време на менопауза);
- ерготамин, ергометрин;
- алпроstadin;
- антианарийни лекарства (риск от брадикардия);
- хлорпромазин;
- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане;
- нестероидни аналгетици и кортикостероиди.

Общи анестетици, хипнотици, лекарства със седативен ефект (анксиолитици), алкохол и усилват понижавания налягането (хипотоничен) ефект на Карведилол Гриндекс, а нестероидните аналгетици и кортикостероидите намаляват хипотоничния ефект.

Карведилол Гриндекс може да увеличи или намали пресорния ефект на адреналина.



Употреба на Карведилол Гриндекс с храни и напитки

Алкохолът увеличава хипотоничния ефект на Карведилол Гриндекс.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Карведилол Гриндекс не трябва да се използва по време на бременност, освен ако потенциалната полза за майката не надхвърля потенциалния риск за плода.

Карведилол се отделя в кърмата. По тази причина кърменето трябва да бъде преустановено за периода на лечение.

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно, ако забременеете, докато приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ако пациентът получи замаяване или сходни симптоми, той не трябва да шофира или да работи с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Карведилол Гриндекс

Карведилол Гриндекс таблетки съдържат лактоза. Ако сте уведомени от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, съържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС

Винаги приемайте Карведилол Гриндекс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Карведилол Гриндекс трябва да се приема с храна.

Есенциална хипертония

Възрастни

Дозата за започване на лечение е 12,5 mg веднъж дневно, увеличена след 2 дни до обичайната доза от 25 mg веднъж дневно. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличена през интервали от поне 2 седмици до максималната доза от 50 mg дневно, използвана като единична доза или като разделени дози.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст, в някои случаи доза от 12,5 mg осигурява задоволителен контрол. Ако отговорът е незадоволителен, дозата може да се повиши до препоръчителната максимална дневна доза от 50 mg, дадена като еднократна доза или като разделени дози.

Хронична стабилна стенокардия

Дозата за започване на лечение е 12,5 mg два пъти дневно, увеличена след 2 дни до 25 mg два пъти дневно.


Според данни от литературата, при лечение на стабилна стенокардия се препоръчва доза карведилол от 50 mg два пъти дневно.

Симптоматична хронична сърдечна недостатъчност

Лечението с Карведилол Гриндекс трябва започне под наблюдението на лекар в болница. Дозата ще бъде коригирана според индивидуалните нужди.

Възрастни

Препоръчителната доза за започване на лечение е 3,125 mg два пъти дневно в продължение на две седмици. Ако се понася, дозата трябва да се увеличи след това, през интервали от минимум



две седмици, до 6,25 mg два пъти дневно, последвано от 12,5 mg два пъти дневно и след това 25 mg два пъти дневно. Дозата трябва да се увеличи до най-високото ниво, поносимо за пациента. Препоръчителната максимална дневна доза е 25 mg два пъти дневно за всички пациенти с тежка сърдечна недостатъчност и при пациенти с лека до умерена сърдечна недостатъчност с тегло под 85 kg. При пациенти с лека до умерена сърдечна недостатъчност с тегло над 85 kg, препоръчителната максимална доза е 50 mg два пъти дневно.

Ако приемът на Карведилол Гриндекс спре за повече от две седмици, препоръчва се лечението да започне с 3,125 mg два пъти дневно и да се повишава според горните препоръки за дозиране.

Нарушения на чернодробната функция

Дозата на Карведилол Гриндекс трябва да бъде намалена при пациенти с нарушена чернодробна функция. Карведилол Гриндекс не трябва да се използва при пациенти с тежка чернодробна недостатъчност.

Бъбречни заболявания

Не се предвижда промяна на дозата, докато систоличното артериално налягане е над 100 mmHg.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на карведилол при деца (под 18 години) не е установена.

Ако имате чувство, че ефектът от Карведилол Гриндекс таблетки е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Карведилол Гриндекс:

Ако сте приели свръхдоза може да настъпи тежка хипотония, брадикардия, сърдечна недостатъчност и дори кардиогенен шок. При тежки епизоди може да настъпи сърдечен блок. Могат да възникнат и дихателни проблеми, бронхоспазм, повръщане, нарушено съзнание и генерализирани гръбове.

Пациентите трябва да се поставят в легнало положение. Веднага трябва да бъде повикана бърза помощ, която да предприеме интензивна терапия. В първите няколко часа след поглъщането може да бъде полезно да се извърши стомашна промивка или индуцирано повръщане. В случай на предозиране се консултирайте с Вашия лекар незабавно!

Ако сте пропуснали да приемете Карведилол Гриндекс:

Ако сте пропуснали да приемете Карведилол Гриндекс, приемете го незабавно. Не вземайте двойна доза, ако времето за следващата доза почти е настъпило, а продължете да приемате лекарствата според предписанието при спазване на интервалите между приемите.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Карведилол Гриндекс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на нежеланите реакции не зависи от дозата, с изключение на реакциите на замаяност, нарушено на зрението и брадикардия.

Много често (засягат повече от 1 на 10 души)

- Висина на свят*
- Главоболит*
- Сърдечна недостатъчност
- Ниско кръвно налягане
- Чувство на слабост и умора*

Често (засягат по-малко от 1 на 10 души)



- Инфекции на дихателните пътища (бронхит), белите дробове (пневмония), носа и гърлото (инфекция на горните дихателни пътища). Симптомите включват хрипове, недостиг на въздух, стягане в гърдите и болки в гърлото
- Инфекция на пикочните пътища
- Анемия (нисък брой червени кръвни клетки)
- Повишаване на телото
- Увеличение на нивата на холестерол (установено чрез изследване на кръв)
- Нарушение на контролираните нива на глюкозата в кръвта (хипогликемия или хипергликемия) при пациенти с диабет
- Депресия, потиснато настроение
- Проблеми със зрението, болки или сухота в очите поради по-малкото количество отделени слъзи, дразнене в очите
- Бавен сърдечен ритъм (брадикардия)
- Оток (включително генерализиран, периферен, зависим и генитален оток, оток на краката, стъпалата и глезените)
- Задръжане на течности. Симптомите включват общо подуване на тялото, подуване на части от тялото, т.е. ръцете, стъпалата, глезените и краката, и увеличаване на общото количество кръв в тялото
- Замайване или примаяване след изправяне.
- Нарушения на периферното кръвообращение (студени ръце и крака, периферна съдова болест, обостряне на интермитираща клаудикация и феномен на Рейно),
- Проблеми с дишането, белодробен оток, астма при предразположени пациенти
- Гадене или повръщане
- Диария
- Стомашно разстройство/лошо храносмилане
- Коремна болка
- Болка, вероятно в ръцете и краката
- Проблеми с бъбреците, включително промени в честотата на уриниране

Нечестни (засягат по-малко от 1 на 100 души)

- Нарушения на съня
- Цинидизъм¹
- Изтръпване или скованост на ръцете или краката
- Ангина пекторис
- Проводни нарушения на сърцето (AV блок)
- Занек
- Кожни реакции (алергична екзантема, дерматит, повишено изпотяване, уртикария, сърбеж, повишена или донин, чувство на сърбеж и сухи петна по кожата)
- Застъпване на кожата
- Невъзможност за получаване на ерекция (еректилна дисфункция)

Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 души)

- Тромбоцитопения (намален брой тромбоцити в кръвта). Симптомите включват кръвоизливания и кръвене от носа
- Затушен нос, хрипове, грипоподобни симптоми
- Сухота в устата

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 души)

- Невкиселина (намален брой на всички редици бели кръвни клетки). Симптомите включват инфекции на устата, венците, гърлото и белите дробове
- Сериозност (алергична реакция)
- Промени в последванията за функцията на черния дроб
- Инконтиненция на урина при жени, която преминава след прекратяване на лечението

* Настъпва особено в началото на лечението
Може да възникне обостряне на псориазис.



Карведилол Гриндекс може също да предизвика напредване на признаци на диабет при хора, които имат много лека форма на диабет, наречена „латентен диабет“.

При пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, по време на повишаване на дозата на Карведилол Гриндекс могат да възникнат влошаване на сърдечната недостатъчност и задържане на течности.

Ако някои от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАРВЕДИЛОЛ ГРИНДЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Карведилол Гриндекс

- Активното вещество е карведилол.

Всяка таблетка съдържа 6,25, 12,5 или 25 mg карведилол.

- Другите съставки са: лактоза монохидрат; микрокристална целулоза; кросповидон (тип А); силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.

Оцветители: Жълт железен оксид, Е 172 (6,25 и 12,5 mg таблетки), Червен железен оксид, Е 172 (12,5 mg таблетки).

Как изглежда Карведилол Гриндекс и какво съдържа опаковката

6,25 mg таблетка – кръгла, двойно изпъкнала таблетка с делителна черта от едната страна, жълтеникав цвят с тъмно жълти петна.

12,5 mg таблетка – кръгла, двойно изпъкнала таблетка с делителна черта от едната страна, розов цвят с тъмно розови петна.

25 mg таблетка – бяла, кръгла, двойно изпъкнала таблетка с делителна черта от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

PVC/Al блистери.

14 таблетки, опаковани в блистер.

2 блистера, опаковани в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия

Тел: +371 67083205

Факс: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката 10/2012

