

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20030208/09
Разрешение №	22780/81, 16.07.2013
Одобрение №	/.....

Листовка: информация за потребителя

Цероксим 250 mg таблетки
Цероксим 500 mg таблетки
(цефуроксим аксетил)

Ceroxim 250 mg tablets
Ceroxim 500 mg tablets
(Cefuroxime axetil)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Цероксим и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цероксим
3. Как да приемате Цероксим
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цероксим
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цероксим и за какво се използва

Цероксим е антибиотик, използван при деца и възрастни. Той действа, разрушавайки бактериите, причинител на инфекциите. Принадлежи към група лекарства, наречени *цефалоспори*ни.

Цероксим се използва при инфекции на:

- гърлото
- синусите
- средното ухо
- белите дробове или гърдния кош
- уринарния тракт
- кожата и меките тъкани.

Цероксим може също да се използва:

- за лечение на Лаймска болест (инфекция, разпространяваща се чрез паразити, наречени кърлежи)

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цероксим

Не приемайте Цероксим



- Ако имате алергия (хиперчувствителност) към някои цефалоспоринови антибиотици или към някоя от останалите съставки на Цероксим
 - Ако някога сте имали тежка алергична реакция (хиперчувствителност) към друг тип бета-лактамни антибиотици (пеницилини, монобактами или карбапенеми).
- Ако смятате, че някое от изброените се отнася за Вас, **не приемайте Цероксим** преди да се консултирате с Вашия лекар.

Обърнете специално внимание при употребата на Цероксим

Цероксим таблетки не се препоръчва при деца под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността не са проучени при тази възрастова група.

Докато приемате Цероксим, Вие трябва да следите за определени симптоми като алергични реакции, гъбични инфекции (например *candida*), както и тежка диария (*псевдомембранозен колит*). Това би намалило риска от появата на усложнения. Вижте „Състояния, за които е необходимо да следите“ в точка 4.

Ако е необходимо да Ви се правят лабораторни тестове на кръвта

Цероксим таблетки може да повлияе на нивата на захарта в кръвта или на лабораторно изследване, наречено тест на Coomb. Ако е необходимо да Ви се правят кръвни изследвания:

→ **Информирайте персонала, че приемате Цероксим.**

Други лекарства и Цероксим

Други лекарства и Цероксим таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпуснати без рецепта.

Лекарства, намаляващи киселинността в стомаха (например антиациди, използвани при киселини), могат да повлияят действието на Цероксим.

Пробенецид

Орални антикоагуланти

→ **Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от тези лекарства.**

Контрацептиви

Цероксим може да намали действието на противозачатъчните таблетки. Ако приемате такива, докато сте на лечение с Цероксим, Вие трябва да използвате **барьерни методи за контрацепция** (например презервативи). Консултирайте се с Вашия лекар.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Вашият лекар ще прецени ползата от лечението с Цероксим, имайки предвид риска за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини



Цероксим може да причини замаяност и има други странични ефекти, които намаляват концентрацията.

→ Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре.

3. Как да приемате Цероксим

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте Цероксим след хранене. Това ще направи лечението по-ефективно.

Таблетката се приема цяла с малко вода.

Таблетката не трябва да се дъвче, дели или разтрошава – това ще направи лечението по-малко ефективно.

Дозирание:

Възрастни

Обичайната доза на Цероксим е 250 mg или 500 mg два пъти дневно в зависимост от тежестта и типа на инфекцията.

Деца:

Обичайната доза на Цероксим е 10 mg/kg (максималко 125 mg) до 15 mg/kg (максималко 250 mg) два пъти дневно в зависимост от :

- типа и тежестта на инфекцията

Цероксим не се препоръчва при деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността не са проучени при тази възрастова група.

В зависимост от заболяването и от начина, по който Вашето дете реагира на лечението, първоначалната доза може да бъде променена или да възникне необходимост от още един курс на лечение.

Пациенти с бъбречни проблеми

Ако страдате от бъбречни проблеми, Вашият лекар може да промени дозата Ви.

→ **Консултирайте се с Вашия лекар, ако това се отнася за Вас.**

Ако сте приели повече от необходимата доза Цероксим

Ако сте приели повече от необходимата доза Цероксим, може да получите неврологични смущения, в частност - повишава се възможността за получаване на припадъци (конвулсии).

→ **Незабавно уведомете Вашия лекар или идете до най-близката бърза помощ. По възможност покажете опаковката на Цероксим.**

Ако сте пропуснали да приемете Цероксим

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза според обичайния режим на дозиране.

Не спирайте приема на Цероксим без лекарска консултация.

Цероксим е регистрирано лекарство.



Много е важно да вземате Цероксим до края на предписания курс на лечение. Не трябва да прекъсвате лечението без лекарска консултация само защото се чувствате по-добре. Ако спрете прекалено рано приема на лекарството, инфекцията може да се възобнови.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Цероксим може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които е необходимо да следите

Малък брой хора, приемащи Цероксим, получават алергични реакции или потенциално сериозни кожни реакции. Симптомите на тези реакции включват:

- **тежка алергична реакция.** Симптомите включват релефен и сърбящ обрив, подуване, понякога върху лицето или устата, водещ до затруднение в дишането.
- **кожен обрив,** който може да е изпъкнал с малки кръгли петна (с централна тъмна зона, заобиколена от по-светла област и тъмен контур).
- **генерализиран обрив с мехури и лющене на кожата.** (Може да бъде симптом на *синдрома на Стивънс-Джонсън* или на *токсична епидермална некролиза*).
- **гъбични инфекции.** Лекарства подобни на Цероксим могат да доведат до инфекции в тялото (например млечница), поради свръхрастеж на гъбички (*Candida*).
- **тежка диария (*псевдомембранозен колит*).** Лекарства подобни на Цероксим могат да причинят възпаление на дебелото черво, водещо до тежка диария, обикновено придружена с кръв, слуз, стомашна болка, треска.
- **реакция на Jarisch-Herxheimer.** При лечение на Лаймска болест с Цероксим при някои пациенти е възможна появата на висока температура (треска), студени тръпки, главоболие, мускулни болки и кожни обриви. Това състояние е познато като *реакция на Jarisch-Herxheimer*. Симптомите обикновено продължават от няколко часа до един ден.

→ **Незабавно се свържете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някой от тези симптоми.**

Чести нежелани реакции

Засягат повече от 1 на 10 пациенти, приемащи лекарството:

- гъбични инфекции (например *Candida*)
- главоболие
- замаяност
- диария
- гадене
- стомашна болка.

Чести нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвни тестове:

Често срещани нежелани реакции:



- повишаване на определен вид бели кръвни клетки (*еозинофилия*)
- повишаване на чернодробни ензими.

Нечести нежелани реакции

Засягат повече от 1 на 100 пациенти, приемащи лекарството:

- повръщане
- кожни обриви.

Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвни тестове:

- понижаване в броя на тромбоцитите (кървни клетки, отговорни за кръвосъсирването)
- понижаване в броя на белите кръвни клетки
- положителен тест на Coomb.

Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при малък брой пациенти, но тяхната честота не е известна.

- тежка диария (*псевдомембранозен колит*)
- алергични реакции
- кожни реакции (включително тежки)
- висока температура (*треска*)
- пожълтяване на бялата част на очите или на кожата
- възпаление на черния дроб (*хепатит*).

Нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвни тестове:

- бързо разрушаване на червените кръвни клетки (*хемолитична анемия*).

Ако забележите някакви странични ефекти

→ **Информирайте Вашия лекар или фармацевт.** Това включва всички нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка.

5. Как да съхранявате Цероксим

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C в оригиналната опаковка. Да се пази от влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след EXP/Годен до. Срокът на годност се отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Всички права са запазени.



Какво съдържа Цероксим

- Активното вещество е: цефуроксим аксетил.
- Помощните вещества са: натриев лаурилсулфат, силициев диоксид, колоиден безводен, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, стеаринова киселина.

Как изглежда Цероксим и какво съдържа опаковката

Цероксим таблетки се доставят в блистери по 10 таблетки, опаковани в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Екофарм Груп АД
бул. "Черни връх" 14, бл. 3
София 1421
България
Тел.: +359 2 963 15 96
Факс: +359 2 963 15 61

Производител, отговорен за освобождаване на партидите:

Екофарм ЕООД, бул. Черни връх 14, бл.3, 1421 София, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба ЕКОФАРМ ГРУП АД.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Март 2013г.

