

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
КМР № 112	26413
Разрешение №	16-07-2014
Одобрение №	

Листовка: информация за пациента №

Цефобид 1 g прах за инжекционен разтвор
Cefobid 1 g powder for solution for injection

Цефоперазон (cefoperazone)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Цефобид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да получите Цефобид
3. Как се прилага Цефобид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефобид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цефобид и за какво се използва

Цефобид е антибиотик, който принадлежи към групата на цефалоспорините. Вашият лекар може да Ви предпише Цефобид за лечение на инфекции, като инфекции на дихателните пътища, инфекции на уринарния тракт, коремни инфекции (перитонит, холецистит, холангит и други), инфектиране на кръвта (септицемия), възпаление на мозъчните обвивки (менингит), инфекции на кожата и меките тъкани, инфекции на костите и ставите, възпалителни заболявания в таза, възпаление на лигавицата на матката (ендометрит), гонорея и други инфекции на половата система.

Цефобид може да бъде използван за предпазване от инфекция след операция при пациенти, претърпели коремна, гинекологична, сърдечно-съдова или ортопедична операция.

Поради широкия му спектър на активност, с приложението само на този антибиотик могат да бъдат лекувани успешно повечето инфекции. Въпреки това Цефобид може да Ви бъде прилаган в комбинация с други антибиотици, според преценката на Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да получите Цефобид

Не използвайте Цефобид

- ако сте алергични към активното вещество,
- ако сте алергични към други антибиотици от групата на цефалоспорино,
- ако сте алергични към лидокаин (когато лекарството се прилага интрамускулно)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да приемете Цефобид:

- ако имате или преди сте имали алергия към цефалоспорино, пеницилини или други лекарства,
- ако имате или преди сте имали чернодробни или бъбречни проблеми,



- ако сте подложени на строга диета или сте били на режим на продължително интравенозно хранене,
- ако имате нарушения на някои кръвни клетки (тромбоцити),
- ако сте развивали или по време на лечението с Цефобид развиете стомашно-чревно разстройство (диария), включително до 2 месеца след прекратяване на лечението,

Деца

Цефобид е прилаган успешно при малки деца. Той обаче не е широко проучен при недоносени кърмачета и новородени. Ето защо, преди назначаване на лечение с този продукт при недоносени кърмачета и новородени, Вашият лекар ще прецени потенциалните ползи и възможните рискове.

Други лекарства и Цефобид

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако сте на изкуствено хранене, трябва да се избягват разтвори, съдържащи етанол.

Едновременната употреба на Цефобид с аминогликозиди може да доведе до нарушение на бъбречната Ви функция. Ако това лекарство се прилага с аминогликозид, Вашият лекар ще следи за правилното функциониране на Вашите бъбреци по време на лечението.

Някои лабораторни изследвания за глюкоза в урината Ви могат да дадат неверни резултати.

Цефобид с храна, напитки и алкохол

Приемът на алкохол под всякаква форма по време на лечението с Цефобид трябва да се избягва, включително до петия ден след прекратяване на лечението.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Поради липсата на съответни проучвания при хора, приложението на Цефобид по време на бременност и кърмене трябва да се избягва, освен при доказана необходимост и с повишено внимание.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Цефобид да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

3. Как се прилага Цефобид

Цефобид ще Ви бъде приложен във вена или в мускул от лекар или медицинска сестра. Обичайната доза при възрастни е 2-4 g дневно, разделени на равни дози на всеки 12 часа. Дозата при кърмачета и деца е от 50 до 200 mg/kg дневно, разделени на равни дози на всеки 8 до 12 часа, като максималната доза не трябва да надвишава 12 g на ден.

В зависимост от Вашето състояние или съпътстващи заболявания (тежка жлъчна обструкция, тежко или придружено с бъбречно нарушение чернодробно заболяване) Вашият лекар може да повиши или намали обичайната доза.

Ако сте получили повече от необходимата доза Цефобид

Лекарството ще Ви бъде прилагано от медицински специалист, поради което е малко вероятно да бъде предозирано. Ако се притеснявате, че може да Ви е дадена прекалено голяма доза Цефобид, говорете незабавно с Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали доза Цефобид



Ако се притеснявате, че може да сте пропуснали доза, говорете незабавно с Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души) са:

- понижен хемоглобин или хематокрит

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души) са:

- намаление на броя на белите кръвни клетки в организма Ви, което може да доведе до повишен риск от инфекции (неутропения), положителен на определен вид кръвен тест (директен тест на Кумбс), намаляване на броя на съсирващите клетки в кръвта Ви (тромбоцитопения), повишение на броя на определен вид бели кръвни клетки, което може да е свързано с кожни и алергични заболявания и инфекции (еозинофилия)
- възпаление на вена (флебит) на мястото на вливане
- диария
- повишени чернодробни показатели (аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, алкална фосфатаза в кръвта), жълтеница
- сърбеж, копривна треска (уртикария), кожен обрив с малки, плоски и повдигнати червеникави петна (макулопапулозен обрив)

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души) са:

- повръщане
- болка на мястото на приложение, повишена температура

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка) са:

- промяна на някои кръвни елементи (хипопротромбинемия)
- алергия (свръхчувствителност), тежка алергична реакция, която предизвиква затруднено дишане или замайване (анафилактоидна реакция), включително шок
- кръвоизлив
- вид инфекция на червата (псевдомембранозен колит)
- тежка алергична реакция с обриви по кожата и лигавиците и мехури по кожата (синдром на Стивънс-Джонсън), отделяне на повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Цефобид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Цефобид прах за инжекционен разтвор трябва да се съхранява при температура под



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефобид

- Активното вещество е цефоперазон (под формата на цефоперазон натрий).

Как изглежда Цефобид и какво съдържа опаковката

Цефобид е бял кристален прах за инжекционен разтвор в стъклен флакон. Приготвеният разтвор е безцветен до сламеножълт, в зависимост от неговата концентрация.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

PFIZER EUROPE MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Обединено кралство

Производител:

Pfizer Italia S.r.l.

Strada Statale 156 Km 50

Borgo San Michele-Latina

Италия

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Аминогликозиди

Разтворите на цефоперазон и аминогликозидите не трябва директно да се смесват, тъй като има физическа несъвместимост между тях. Ако се планира лечение с цефоперазон и с аминогликозид, това може да се постигне с последователна краткотрайна интравенозна инфузия, при положение че се използва отделна вторична интравенозна система, а първичната интравенозна система се промие старателно с одобрен разтворител между дозите. Препоръчва се също така цефоперазон да бъде приложен преди аминогликозида.

Следните парентерални разредители и приблизителни концентрации на цефоперазон дават стабилни разтвори при следните условия за указаните периоди от време.

Контролирана стайна температура (15-25°C) за 24 часа (след указаните периоди от време неизползваните остатъци от разтворите трябва да се изхвърлят).

Разтвори

Приблизителни концентрации

Бактериостатична вода за инжекции
5% глюкоза
5% глюкоза в Рингер лактат
5% глюкоза в 0,9% натриев хлорид
5% глюкоза в 0,2% натриев хлорид
10% глюкоза
Рингер лактат
0,5% лидокаинов хидрохлорид
0,9% натриев хлорид
Нормозол М и 5% глюкоза

300 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml
2 mg/ml
300 mg/ml
2 mg до 300 mg/ml
2 mg до 50 mg/ml



Нормозол R	2 mg до 50 mg/ml
Стерилна вода за инжекции	300 mg/ml

Приготвените разтвори на цефоперазон могат да се съхраняват в стъклени или пластмасови спринцовки или в стъклени или меки пластмасови контейнери за парентерални разтвори в продължение на 5 дни при хладилни температури (2-8°C).

<u>Разтвори</u>	<u>Приблизителни концентрации</u>
Бактериостатична вода за инжекции	300 mg/ml
5% глюкоза	2 mg до 50 mg/ml
5% глюкоза в 0,9% натриев хлорид	2 mg до 50 mg/ml
5% глюкоза в 0,2% натриев хлорид	2 mg до 50 mg/ml
Рингер лактат	2 mg/ml
0,5% лидокаинов хидрохлорид	300 mg/ml
0,9% натриев хлорид	2 mg до 300 mg/ml
Нормозол M и 5% глюкоза	2 mg до 50 mg/ml
Нормозол R	2 mg до 50 mg/ml
Стерилна вода за инжекции	300 mg/ml

Приготвените разтвори на цефоперазон могат да се съхраняват в стъклени или пластмасови спринцовки или в стъклени или меки пластмасови контейнери за парентерални разтвори в продължение на 3 седмици във фризер при температури (-20 до -10°C).

<u>Разтвори</u>	<u>Приблизителни концентрации</u>
5% глюкоза	50 mg/ml
5% глюкоза в 0,9% натриев хлорид	2 mg/ml
5% глюкоза в 0,2% натриев хлорид	2 mg/ml
5 седмици	
0,9% натриев хлорид	300 mg/ml
Стерилна вода за инжекции	300 mg/ml

Приготвените разтвори на цефоперазон могат да се съхраняват в пластмасови спринцовки или в меки пластмасови контейнери за парентерални разтвори.

Замразените разтвори трябва да се размразяват при стайна температура преди употреба. След размразяване неизползваната част трябва да се изхвърли. Да не се замразява повторно.

Интравенозно приложение

Флаконите със стерилен прах цефоперазон може първоначално да се разтворят с минимум 2,8 ml на грам цефоперазон от който и да било от съвместимите, подходящи за интравенозно приложение разтворители, изброени в Таблица 1 по-долу. За по-лесно приготвяне се препоръчва използването на 5 ml съвместим разтворител на грам цефоперазон.

Таблица 1. Разтвори за начално приготвяне

5% глюкоза
10% глюкоза
5% глюкоза в 0,9% натриев хлорид
0,9% натриев хлорид
Нормозол M и 5% глюкоза
5% глюкоза в 0,2% натриев хлорид
Нормозол R



Стерилна вода за инжекции

След това цялото количество от получения разтвор се разрежда за приложение с някое от средствата за интравенозна инфузия, изброени в Таблица 1 по-долу:

Таблица 2. Вехикулуми за интравенозна инфузия

5% глюкоза
10% глюкоза
5% глюкоза в Рингер лактат
Рингер лактат
0,9% натриев хлорид
5% глюкоза в 0,9% натриев хлорид
Нормозол М и 5% глюкоза
Нормозол R
5% глюкоза в 0,2% натриев хлорид

Интрамускулно приложение

Стерилната вода за инжекции или бактериостатичната вода за инжекции могат да бъдат използвани за приготвяне на разтвор на цефоперазон за интрамускулно приложение. Когато трябва да се въвеждат концентрации от 250 mg/ml или по-големи, трябва да се използва разтвор на лидокаин. Тези разтвори трябва да се приготвят, като се използва комбинация от стерилна вода за инжекции и 2% лидокаинов хидрохлорид, което е приблизително 0,5% разтвор на лидокаинов хидрохлорид.

Препоръчва се разреждането да се извърши на два етапа, както следва: първо – прибавете необходимото количество стерилна вода за инжекции и го разклатете, докато прахът цефоперазон се разтвори напълно; второ – прибавете необходимото количество 2% лидокаин и разклатете.

	Крайна концентрация на цефоперазон	Стъпка 1 Количество стерилна вода за инжекции	Стъпка 2 Количество 2% лидокаин	Количество, което може да се изтегли*
1,0 g флакон	250 mg/ml	2,6 ml	0,9 ml	4,0 ml
	333 mg/ml	1,8 ml	0,6 ml	3,0 ml

* Във флакона се съдържа достатъчно допълнително количество от лекарственото вещество, за да може да се изтеглят и приложат посочените количества.

