

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Лекарство - Приложение 2
Код Рег. № 20110675
Разрешение № 27728 / 25-11-2014
Одобрение № /

Листовка: информация за пациента

**Клаксит 500 mg таблетки с удължено освобождаване
Claxirit 500 mg prolonged-release tablets**

кларитромицин (clarithromycin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Клаксит и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клаксит
3. Как да приемате Клаксит
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клаксит
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Клаксит и за какво се използва

Кларитромицин е антибиотик, принадлежащ към групата лекарства, наречени макролиди. Антибиотиците спират растежа на бактериите, които причиняват инфекции. Клаксит са таблетки с удължено освобождаване, което означава, че активната съставка се освобождава бавно от таблетката, така че Вие трябва да я приемате само веднъж дневно.

Клаксит се използва при възрастни и деца над 12 години за лечение на инфекции като:

- инфекции на долните дихателни пътища, напр. бронхит и пневмония
- инфекции на гърлото напр. фарингит
- инфекции на синусите (синусит)
- инфекции на кожата и тъканите, напр. фоликулит, целулит и еризипел.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клаксит

Не използвайте Клаксит

- ако сте алергични към кларитромицин, към други макролидни антибиотици, напр. еритромицин или азитромицин, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



- ако приемате някое от следните лекарства, консултирайте се с Вашия лекар относно алтернативно лечение:
 - ерготамин или дихидроерготамин таблетки (при мигрена)
 - цизаприд (при стомашни нарушения), пимозид (при някои психични заболявания), терфенадин и астемизол (при сенна хрема или алергия), тъй като комбинирането на тези лекарства с кларитромицин може понякога да предизвика сериозни нарушения на сърдечния ритъм.
 - ловастатин или симвастатин (при висок холестерол)
 - тикагрелор (лекарство за разреждане на кръвта)
 - ранолазин (за лечение на стенокардия)
 - колхицин (за лечение на подагра)
- ако имате бъбречни проблеми
- ако имате ниски нива на калий в кръвта (хипокалиемия)
- ако имате или сте имали удължаване на QT интервала, отклонение в електрокардиограмата (ЕКГ) или неправилен сърдечен ритъм (камерна сърдечна аритмия)
- ако имате тежки чернодробни проблеми в комбинация с бъбречни проблеми.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Клаксирит

- ако сте бременна
- ако имате чернодробни проблеми
- ако получите тежка или продължителна диария по време на или след приема на Клаксирит, консултирайте се незабавно с Вашия лекар
- ако приемате триазолам и мидазолам (седативи)
- ако приемате други ототоксични лекарствени продукти, особено аминогликозиди (група лекарства за лечение на някои инфекции)
- ако имате исхемична болест на сърцето, тежка сърдечна недостатъчност, патологично ниско ниво на магнезий в кръвта (хипомагнезиемия), бавен сърдечен ритъм (брадикардия)
- ако имате повтарящи се инфекции с бактерии или гъбички. Посъветвайте се с Вашия лекар.
- ако приемате аторвастатин или розувастатин (при висок холестерол)
- ако приемате някои антидиабетни лекарства (напр. натеглинид, пиоглитазон, репаглинид и розиглитазон), тъй като Клаксирит може да понижи нивата на кръвната захар
- ако приемате антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта)

При настъпване на тежки остри реакции на свръхчувствителност, напр. анафилаксия, синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза, терапията с Клаксирит трябва да се преустанови незабавно и спешно да се започне подходящо лечение.

Други лекарства и Клаксирит

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако вземате някое от следните лекарства:

- цизаприд (при стомашни нарушения)
- пимозид (антипсихотично лекарство)



- терфенадин или астемизол (при сенна хрема или алергия)
- ерготамин или дихидроерготамин (при мигрена)
- колхицин (при подагра)
- итраконазол или флуконазол (противогъбичкови лекарства)
- зидовудин, ритонавир, атазанавир, саквинавир, етравирин, невирапин или ефавиренц (антивирусни [анти-HIV] лекарства)
- рифабутин (антибиотик, действащ срещу някои инфекции)
- рифампицин и рифапентин (за лечение на туберкулоза)
- аминогликозиди (антибиотици) като еритромицин
- дигоксин, хинидин, дизопирамид, амлодипин, дилтиазем (лекарства за сърце)
- карбамазепин, валпроат, фенобарбитал или фенитоин (лекарства при епилепсия)
- статини при висок холестерол (напр. ловастатин, симвастатин, аторвастатин, розувастатин)
- варфарин (за разреждане на кръвта)
- силденафил, тадалафил или варденафил (за лечение на еректилна дисфункция)
- теофилин (помага на дишането)
- толтеродин (за лечение на симптоми на синдрома на свръхактивен пикочен мехур)
- триазолам, алпразолам или мидазолам (успокоителни)
- омепразол (при стомашни нарушения)
- такролимус, сиролимус или циклоспорин (при органна трансплантация)
- метилпреднизолон (кортикостероид за лечение на възпаление)
- винбластин (химиотерапевтично средство, използвано за лечение на рак)
- цилостазол (използван за подобряване на кръвообращението в краката)
- жълт кантарион (билково лекарство)
- верапамил
- инсулин или перорални антидиабетни лекарства като натеглинид или репаглинид (за намаляване на нивата на кръвната захар).

Клаксит с храна и напитки

Клаксит трябва да се приема с храна и таблетките трябва да се преглъщат цели, без да се дъвчат.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, не приемайте Клаксит без да се посъветвате първо с Вашия лекар, тъй като безопасността на Клаксит при бременност и кърмене не е известна.

Шофиране и работа с машини

Клаксит е възможно да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с машини, тъй като може да предизвика замаяване, обърканост и дезориентация.

Клаксит съдържа лактоза



Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Клаксит

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Клаксит трябва да се приема с храна и таблетките трябва да се преглъщат цели, без да се дъвчат. Трябва да приемате всяка доза по едно и също време всеки ден през целия курс на лечение.

Възрастни и деца над 12 години

Препоръчителната доза на Клаксит е една 500 mg таблетка с удължено освобождаване веднъж на ден в продължение на 6 до 14 дни.

Вашият лекар може да повиши дозата на две таблетки с удължено освобождаване от 500 mg при тежки инфекции. Трябва да вземате и двете таблетки едновременно.

Деца на възраст 12 години и по-малки

Тези таблетки не са подходящи за деца на 12 години и по-малки. Вашият лекар ще предпише друго подходящо лекарство на Вашето дете.

Пациенти с бъбречни проблеми

Тези таблетки не са подходящи за пациенти с бъбречни проблеми. Вашият лекар ще предпише друго подходящо лекарство.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клаксит

Ако случайно вземете повече от необходимата доза Клаксит или дете случайно погълне няколко таблетки, потърсете спешно лекарска помощ. Предозирането на Клаксит може да причини повръщане и стомашни болки. Възможно е също да получите алергични реакции.

Ако сте пропуснали да приемете Клаксит

Ако забравите да вземете таблетка Клаксит, вземете я веднага след като се сетите. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Клаксит

Не спирайте приема на Клаксит, когато се почувствате по-добре. Важно е таблетките да се приемат толкова дълго, колкото ви е казал лекарят, иначе проблемът може да се възобнови.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции, спрете приема на Класирит и се свържете незабавно с лекар:

- силна болка в корема и гърба, причинена от възпаление на панкреаса. Този ефект е с неизвестна честота.
- тъмна урина, светли изпражнения, жълтеница (пожълтяване на кожата и/или очите), гадене и треска, което може да бъде симптоми на проблеми с черния дроб. Този ефект е с неизвестна честота.
- внезапни хрипове, подуване на устните, лицето или тялото, обрив, припадане или затруднение при преглъщане (тежки алергични реакция). Този ефект е с неизвестна честота.
- тежка и болезнена диария, причинена от възпаление на червата (псевдомембранозен колит). Този ефект е с неизвестна честота.
- зачервяване на кожата с мехури или обелване, което може да е свързано с треска и ставна болка. Може също да има тежко състояние с образуване на мехури и кръвене от устните, очите, устата, носа и гениталиите. Това може да бъде синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза. Този ефект е с неизвестна честота.

Други възможни нежелани реакции

Чести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти

- безсъние
- болка в областта на корема, диария, повръщане, храносмилателен дискомфорт и гадене
- промени в усещането за вкус (дизгеузия), главоболие
- разширение на кръвоносен съд¹
- отклонения в чернодробните функционални тестове
- обрив, прекомерно изпотяване

Нечести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 100 пациенти

- млечница и вагинална млечница (кандидоза), стомашен грип, инфекции, вагинални инфекции, възпаление на кожата, причинено от инфекции
- промяна в броя на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения), неутрофилите (неутропения) или белите кръвни клетки (левкопения)
- повишен брой на бели кръвни клетки, наречени еозинофили (еозинофилия)
- анафилактична реакция¹, свръхчувствителност
- анорексия, намален апетит
- тревожност, нервност³, крещене³
- загуба на съзнание¹, затруднение при контролиране на движенията¹, замаяване, сънливост и тремор
- шум в ушите (тинитус), усещане за виене на свят (вертиго) и увреждане на слуха
- спиране на ударите на сърцето (сърдечен арест)¹, неравномерна сърдечна дейност и честота на пулса, абнормна електрическа активност на сърцето (ЕКГ), усещане на ударите на сърцето (сърцебиене), преждевременни сърдечни удари (екстрасистолы)
- астма, кръвене от носа², запушване на белодробните артерии



- възпаление на хранопровода¹, киселини, възпаление на стомаха, болка в ректума (прокталгия)², възпаление вътре в устата (стоматит), възпаление на езика (глосит), запек, подут стомах (раздуване на корема)⁴, оригване, сухота в устата, метеоризъм
- недостатъчен приток на жлъчка (холестаза), възпаление на черния дроб (хепатит)⁴, повишение на някои чернодробни ензими (аспартат аминотрансфераза и гама-глутамилтрансфераза⁴)
- възпаление на кожата с образуване на мехури (булозен дерматит)¹, сърбеж на кожата, кожен обрив и уртикария, обрив, характеризиращ се с плоски зачервени участъци по кожата, покрити с малки сливащи се издатини (макуло-папуларен обрив)³
- мускулни спазми³, мускулна болка², мускулно-скелетна скованост¹
- липса на енергия⁴, слабост или загуба на сила, треска⁴, болка в гърдите⁴, студени тръпки⁴, психична или физическа умора⁴
- повишение на креатинина и уреята в кръвта¹
- промяна на някои кръвни тестове (повишение на алкалната фосфатаза⁴ и лактат дехидрогеназата⁴), отклонения в съотношението албумин-глобулин¹

Нежелани реакции с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

- възпаление на червата, предизвикващо силна и болезнена диария, бактериални кожни инфекции (еризипел)
- тежък остър дефицит на неутрофили (вид кръвни клетки), симптомите включват висока температура и язви в устата и гърлото (агранулоцитоза); намаление на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения)
- внезапни алергични реакции (подуване на лицето, устните, гърлото или езика или затруднение в дишането или при преглъщане), ангиоедем (подуване на лицето, устните, гърлото или езика)
- абнормни сънища, объркано състояние, деперсонализация, депресия, дезориентация, халюцинация (привиждане на някои неща), психотично нарушение
- гърчове, промени в усещането за обоняние, загуба на усещането за вкус, скованост, изтръпване или мравучкане (парестезия)
- глухота
- неравномерен сърдечен ритъм, забързан сърдечен ритъм
- кървене
- промяна на цвета на езика, внезапно възпаление на панкреаса, промяна на цвета на зъбите
- чернодробна недостатъчност, жълтеница
- алергични реакции, включително обриви. В много редки случаи може да възникнат затруднение в дишането, припадане и подуване на лицето и гърлото, които може да налагат спешно лечение. Тежестта на алергичните обриви може да варира от леко сърбящи кожни обриви до по-рядкото, по-сериозно състояние, наречено синдром на Stevens-Johnson (който може да предизвика разязвяване на устата, устните и кожата) или токсична епидермална некролиза (която предизвиква тежко състояние и лющене на кожата), или лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS синдром)
- Акне
- мускулна слабост, чувствителност или болка (рабдомиолиза), мускулна слабост
- бъбречна недостатъчност, възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит)
- отклонения в цвета на урината



- повишено време на кръвосъсирване (повишено INR [международно нормализирано съотношение] и протромбиново време)

¹ нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма прах за инжекционен разтвор

² нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма таблетка с удължено освобождаване

³ нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма гранули за перорална суспензия

⁴ нежелани реакции, докладвани само за лекарствената форма с незабавно освобождаване

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София

Тел.: 02 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Клаксирит

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт е без специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след “Годен до”.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Клаксирит

Активното вещество е кларитромицин. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа кларитромицин цитрат, еквивалентен на 500 mg кларитромицин.

Помощните вещества са: *ядро на таблетката*: лактоза монохидрат, хипромелоза, хипромелоза фталат, талк, магнезиев стеарат; *обвивка на таблетката*: хипромелоза, лактоза монохидрат, хинолиново жълто алуминиев лак (E104), титанов диоксид (E171), талк, макрогол/PEG 4000, макрогол/PEG 400.



Как изглежда Клаксирит и какво съдържа опаковката

Жълти, овални, двойно изпъкнали филмирани таблетки с дължина $19,15 \pm 0,2$ mm, ширина $8,95 \pm 0,2$ mm и дебелина $7,55 \pm 0,2$ mm, без маркировка.

Блистер от PVC/PVDC/алуминий в картонена кутия.

Размери на опаковката:

6, 7, 10 и 14 таблетки с удължено освобождаване.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Исландия

Производител

„Балканфарма-Дупница“ АД
ул. „Самоковско шосе“ № 3
2 600 Дупница
България

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИО под следните имена:

Португалия	Claritromicina Actavis
Австрия	Clarithromycin Actavis 500 mg Retardtabletten
България	Клаксирит
Дания	Clarithromycin SR tabs
Естония	Clarithromycin Actavis
Унгария	KLARILID 500 mg retard tabletta
Естония	Klaram LA 500 mg Prolonged Release
Литва	Clarithromycin Actavis 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Латвия	Clarithromycin Actavis 500 mg ilgstošās darbības tabletes
Малта	Klarimide SR
Нидерландия	Claritromycine Actavis SR 500 mg
Румъния	CLAXIRIT 500 mg comprimate cu eliberare prelungită
Обединеното кралство	Febzin XL 500 mg Prolonged-release Tablets

Дата на последно преразглеждане на листовката: май 2014 г.

