

Листовка: Информация за потребителя

Briglau 2 mg/ml eye drops, solution

Бриглау 2 mg/ml капки за очи, разтвор


Бримонидинов тартарат (*Brimonidine tartrate*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Бриглау и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Бриглау
3. Как да използвате Бриглау
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бриглау
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



1. Какво представлява Бриглау и за какво се използва

Бриглау се използва за понижаване на налягането в окото.

Той може да бъде прилаган или самостоятелно или заедно с други капки за очи за понижаване на повишеното налягане в окото, което възниква при откритоъгълна глаукома или очна хипертензия.

Активното вещество в Бриглау е бримонидинов тартарат, който действа чрез понижаване налягането в очната ябълка.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Бриглау

НЕ използвайте Бриглау

- ако сте алергични към бримонидинов тартарат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако приемате инхибитори на моноаминооксидазата (MAO-инхибитори) или някои антидепресанти, например трициклически антидепресанти или миансерин. Ако вече приемате някакъв антидепресант, попитайте Вашия лекар, дали може да прилагате Бриглау.
- ако кърмите.
- при новородени/бебета (от раждането до 2 годишна възраст).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате това лекарство, ако:

- страдате или сте страдали от депресия, понижено на умствения капацитет, понижено кръвоснабдяване на мозъка, сърдечни проблеми, нарушено кръвоснабдяване на крайниците или нарушение на кръвното налягане.
- имате или в миналото сте имали бъбречни или чернодробни проблеми.



Деца и юноши

Бриглау не се препоръчва за употреба при деца под 12 годишна възраст. Ако Бриглау е предписан на дете под 12 годишна възраст, моля преди употреба консултирайте се Вашия лекар.

Други лекарства и Бриглау

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате или наскоро сте използвали някакви други лекарства, включително и такива без рецепта.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства, тъй като те може да окажат влияние върху лечението Ви с Бриглау:

- болкоуспокояващи, седативни (успокоителни) средства, оприати, барбитурати или редовно консумирате алкохол.
- анестетици (упойки).
- лекарства за лечение на сърдечни състояния или за понижаване на кръвното налягане.
- лекарства, които може да повлияят на метаболизма (обмяната), като хлорпромазин, метилфенидат и резерпин.
- лекарства, които действат върху същите рецептори, както Бриглау, например изопреналин и празозин.
- инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори) и други антидепресанти.
- лекарства за лечение на всякакви други състояния, дори такива които не са свързани с Вашето състояние на очите.

Уведомете Вашия лекар и в случаите, когато дозата на някое от лекарствата, които приемате е променена.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на което и да е лекарство. Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате бременност. Бриглау не трябва да се прилага по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Бримонидинов тартарат може да причини замъгляване или нарушение на зрението, особено през нощта или при намалено осветление.

При някои пациенти бримонидинов тартарат може да доведе и до сънливост или умора.

Ако получите нещо от изброеното по-горе, не шофирайте и не работете с машини до отминаване на симптомите.

Бриглау съдържа бензалкониев хлорид

Консервантът бензалкониев хлорид, съдържащ се в Бриглау може да предизвика дразнене в очите, както и да промени цвета на меките контактни лещи. Ето защо е необходимо да се избягва контакт с меки контактни лещи. Ако носите меки контактни лещи трябва да ги свалите преди прилагането на Бриглау и след това да изчакате 15 минути преди да ги поставите отново.

3. Как да използвате Бриглау

Винаги използвайте Бриглау точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни, юноши и деца над 12 години

Обичайната доза е една капка два пъти дневно в засегнатото око(очи), през около 12 часа.

Деца под 12 годишна възраст

Бриглау не трябва да се прилага при малки деца под 2 годишна възраст.

Бриглау не се препоръчва за приложение при деца (от 2 до 12 годишна възраст).




Инструкции за употреба

Бриглау е предназначен за приложение само под формата на капки за очи. Не го приемайте през устата.

Винаги измивайте ръцете си преди да поставите капките. На Вашата рецепта е указано колко капки трябва да поставяте всеки път. Ако използвате Бриглау заедно с други капки за очи, то е необходимо да изчакате 5-15 минути преди да приложите другия очен продукт.

Прилагайте Вашите капки за очи по следния начин:



1. Наведете главата си назад и погледнете към тавана.
2. Леко издърпайте надолу долния клепач докато не се образува малък джоб.
3. Стиснете обърната с акликатора надолу бутилка, така че да поставите капка в окото си.
4. Държейки затворено засегнатото око, притиснете с пръст вътрешния ъгъл на затвореното око (ъгъла на окото от към страната на носа) и задръжте за 1 минута.

Избягвайте допира на капкомера към окото или някаква друга повърхност. Поставете обратно и затегнете капачката веднага след употреба. Ако носите меки контактни лещи трябва да ги свалите преди прилагането на Бриглау и след това да изчакате 15 минути преди да ги поставите отново. Известно е, че съдържащия се в тези капки за очи консервант причинява обезцветяване на меките контактни лещи.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Бриглау

Възрастни

Ако сте поставили повече капки от Бриглау в окото(очите), това обикновено не води до вредни последствия. Приложете следващата доза в обичайното за това време.

Деца

Съобщавани са няколко случая на предозиране при деца, приемали капки за очи, съдържащи бримонидинов тартарат като част от лечението на глаукома. Признаците включват сънливост, отпуснатост, ниска телесна температура и затруднено дишане. Ако това се случи при Вас, незабавно потърсете Вашия лекар.

Възрастни и деца

Ако някой случайно погълне това лекарство, незабавно потърсете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да поставите Бриглау

Ако сте пропуснали доза, поставете я веднага щом се сетите. Ако вече е наближило времето за следващата доза, пропуснете пропуснатата и продължете с обичайната доза в обичайното за това време.

Ако сте спрели употребата на Бриглау

За да бъдат ефективни, тези капки трябва да се поставят всеки ден. Не спирайте прилагането на Бриглау докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.



Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Бриглау може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Честотата на нежеланите ефекти е представена както следва:

Много чести	Появяват се при повече от 1 на 10 пациента
Чести	Появяват се при по-малко от 1 на 10, но при повече от 1 на 100 пациента
Нечести	Появяват се при по-малко от 1 на 10, но при повече от 1 на 1 000 пациента
Редки	Появяват се при по-малко от 1 на 1 000, но при повече от 1 на 10 000 пациента
Много редки	Появяват се при по-малко от 1 на 10 000 пациента, включително отделни случаи

Следните нежелани ефекти от страна на очите може да бъдат наблюдавани при Бриглау :

Много чести: Дразнене на окото (зачервяване на окото, горене, парене, чувство на чуждо тяло в окото, сърбеж, фоликули и бели петна върху покриващия повърхността на окото прозрачен слой), замъглено зрение, алергична реакция от страна на окото.

Чести: Локално дразнене (възпаление и оток на клепачите, оток на покриващия повърхността на окото прозрачен слой, залепване на очите, болка и съзене), чувствителност към светлина, ерозия на повърхността на окото и появата на петна, сухота в очите, побеляване на покриващия повърхността на окото прозрачен слой, нарушено зрение, възпаление на покриващия повърхността на окото прозрачен слой.

Много редки: Възпаление на окото, намаляване размера на зеницата (свиване на зеницата)

Нежелани ефекти с неизвестна честота: Сърбеж на клепачите

Може да получите и следните ефекти от страна на останалите части на тялото:

Много чести: Главоболне, сухота в устата и умора/сънливост.

Чести: Замаяност, грип-подобни симптоми, проблеми от страна на стомаха и/или червата, нарушения на вкуса и обща слабост.

Нечести: Депресия, сърцебиене или промени в сърдечния ритъм, сухота в носа и общи алергични реакции.

Редки: Недостиг на въздух (затруднено дишане).

Много редки: Сънливост, припадъци и високо или ниско кръвно налягане.

Нежелани ефекти с неизвестна честота:

Кожни реакции, включително зачервяване, оток на лицето, сърбеж, обрив, разширяване на кръвоносните съдове.



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Бриглау

Този лекарствен продукт не изисква никакви специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте бутилката, ако защитният пръстен на капачката е разрушен преди първото използване.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и картонената кутия, след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Изхвърлете бутилката 28 дни след нейното първо отваряне, независимо от наличието на останал разтвор.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бриглау

- Активното вещество е бримонидинов тартарат. 1 ml разтвор съдържа 2,0 mg бримонидинов тартарат, еквивалентно на 1,3 mg бримонидин.
- Другите съставки са: бензалкониев хлорид (консервант), поливинилов алкохол, натриев хлорид, натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат, хлороводородна киселина или натриев хидроксид (за коригиране на pH) и вода за инжекции.

Как изглежда Бриглау и какво съдържа опаковката

Бриглау е прозрачен жълтеникаво-зелен разтвор под формата на капки за очи, поставен в пластмасова бутилка.

Всяка бутилка съдържа 5 ml капки за очи.

Бриглау се предлага в опаковка, съдържаща 1 бутилка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Medana Pharma SA
10 Władysława Łokietka Str., 98-200 Sieradz
Полша

Производител:

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pielplińska Str., 83-200 Starogard Gdański
Полша

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страни-членки на ЕИО под следните имена:

NL, HU, LV, PL, SK: Briglau

BG: Бриглау 2 mg/ml капки за очи, разтвор



CZ: Glaudix 2 mg/ml

LT: Briglau 2 mg/ml akių lašai, tirpalas

RO: Briglau 2 mg/ml picături oftalmice, soluție

Дата на последно преразглеждане на листовката

