

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Алуми гел® 345,8 mg/113 mg/5 ml перорална суспензия
Alumi gel® 345,8 mg/113 mg/5 ml oral suspension
алуминиев хидроксид/магнезиев хидроксид
(aluminium hydroxide/magnesium hydroxide)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 12-14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Алуми гел и за какво се използва
2. Преди да приемете Алуми гел
3. Как да приемате Алуми гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алуми гел
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Ред. №	20120423
Разрешение №	4-19621 / 20.09.2012
Одобрение №	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛУМИ ГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Алуми гел е лекарствен продукт, който намалява повишената киселинност в хранопровода и стомаха. Представлява балансиран гел на алуминиев и магнезиев хидроксид. Действа локално върху стомашната лигавица, като я предпазва от дразнещото действие на стомашната солна киселина и от други вредни вещества и храни.

Използва се за симптоматично лечение при заболявания на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника, свързани с повишена киселинност като: възпаление на хранопровода (езофагит), хятусова херния, гастроэзофагеална рефлуксна болест (преминаване на стомашно съдържимо в хранопровода), остър и хроничен гастрит, възпаление на стомаха и дванадесетопръстника, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, гастрит след хирургични операции на стомаха.

Използва се и за профилактика на нарушения на стомаха и дванадесетопръстника (намаляване на дразнещото и разязвяващо действие, свързано с прием на лекарства).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ АЛУМИ ГЕЛ

Не приемайте Алуми гел

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Алуми гел;
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност (риск от повишаване на нивото на магнезий и алуминиева интоксикация).

Обърнете специално внимание при употребата на Алуми гел

- ако имате: тежък запек, коремни болки с неясен произход и съмнение за остър апендицит, язвен колит, дивертикулоза (малки джобове по стените на дебелото черво), колостомия или илеостомия (създаване на изход на дебелото черво или тънкото черво на коремната стена), хронична диария, обострени хемороида;



- ако имате нарушения в алкално-киселинното равновесие на организма като метаболитна алкалоза (натрупване на твърде много алкални вещества, напр. бикарбонати);
- ако имате чернодробна цироза;
- ако имате тежка застойна сърдечна недостатъчност;
- ако имате токсикоза на бременността;
- ако имате бъбречни нарушения, поради опасност от повишаване нивата на магнезия в кръвта и алуминиева интоксикация. Тъй като алуминият се натрупва в нервната тъкан, приложението на алуминий-съдържащи антиацидни продукти трябва да бъде изключително ограничено при възрастни пациенти и такива с болест на Алцхаймер. При много възрастни пациенти е възможно влошаване на костно-ставни заболявания.
- при по-продължителна употреба (над 14 дни) е необходимо проследяване нивото на магнезий в кръвта при болни с бъбречни увреждания.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

При едновременно лечение с други лекарства, те трябва да бъдат прилагани 1-2 часа преди или след приема на Алуми гел.

Алуми гел понижава киселинността на стомашния сок, което оказва влияние върху действието на голям брой лекарствени продукти, прилагани едновременно с него.

Алуми гел намалява ефекта на противоязвени лекарства (циметидин, ранитидин, фамотидин), сърдечни гликозиди, железни соли, литиеви препарати, хинидин, мексилетин, фенотиазинови продукти, тетрациклинови антибиотици, ципрофлоксацин, изониазид и кетоконазол.

При едновременен прием с лекарства, които са под формата на ентérosолвентни таблетки, понижената киселинност на стомашния сок може да доведе до по-бързото разграждане на покритието им и да предизвика дразнене на стомаха и дванадесетопръстника.

Алуми гел може да промени резултатите от някои лабораторни и функционални изследвания и тестове: намалява нивото на стомашна секреция и така променя резултатите от функционалното изследване за определяне на стомашната киселинност; променя резултатите от изследвания, при които се използва технеций (Tc99), като напр. костна сцинтиграфия и някои изследвания на хранопровода; повишава кръвните нива на фосфора, стойностите на pH в кръвта и урината.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Употребата на Алуми гел не се препоръчва по време на бременност или ако това се налага, продължителността на приложение не трябва да е повече от 5–6 дни и следва да се извършва под лекарско наблюдение. При токсикоза на бремеността употребата на продукта трябва да се избягва. Възможно е излъчване на активните вещества в майчиното мляко в малки количества, въпреки че няма данни за неблагоприятни ефекти върху новороденото. По време на кърмене да се прилага за не повече от 5–6 дни под лекарско наблюдение.

Шофиране и работа с машини

Алуми гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Алуми гел

- Алуми гел съдържа сорбитол в състава си. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат лекарствения продукт.
- В състава на продукта се съдържат метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат и бутил парахидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЛУМИ ГЕЛ



Винаги приемайте Алуми гел точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Симптоматично лечение на киселини

Възрастни и деца над 14-годишна възраст

По 5-10 ml 3-4 пъти дневно.

При необходимост еднократната доза може да се увеличи до 15 ml.

Алуми гел се прилага 1/2 до 1 час след хранене, както и вечер преди лягане.

След постигане на терапевтичен ефект дневната доза трябва да се намали до 5 ml 3-4 пъти дневно в продължение на 2-3 месеца.

Деца под 14-годишна възраст

Лекарственият продукт не се препоръчва при деца под 14-годишна възраст поради липса на данни за безопасност.

За профилактика на стомашни нарушения при прием на лекарства

По 5-15 ml 15 минути преди всеки прием на лекарства с дразнещо действие.

Препоръчвана продължителност на приема – 12 дни.

При пациенти с нарушена бъбречна функция дневната доза трябва да бъде намалена или интервалът между приемите удължен в зависимост от степента на бъбречните нарушения.

Преди всеки прием суспензията трябва да бъде хомогенизирана чрез разклащане на бутилката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Алуми гел

При еднократен прием на доза, надвишаваща препоръчваната, обикновено не се наблюдават признаци на предозиране освен запек, метеоризъм (повишено образуване на газове в червата), метален вкус в устата. При продължителна употреба на по-високи дози може да се наблюдава образуване на камъни в бъбреците, тежък запек, лека сънливост, повишаване на магнезия в кръвта. Възможно е развитие на метаболитна алкалоза (промяна в алкално киселинното равновесие на организма): промени в настроението или умствената активност, изтръпване или болки в мускулите, нервност или лесна уморяемост, забавено дишане, неприятен вкус в устата.

В тези случаи е необходимо да се предприемат мерки за бързото елиминиране от организма посредством предизвикване на повръщане, стомашна промивка и прием на активен въглен.

При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!

Ако сте пропуснали да приемете Алуми гел

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Алуми гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Алуми гел може да предизвика запек, който се облекчава чрез намаляване на дозата. В редки случаи може да предизвика гадене, повръщане, стомашни спазми, промяна във вкуса, алергични реакции и хипермагнезиемия (повишаване нивото на магнезия в кръвта).

При пациенти с бъбречна недостатъчност и такива на хемодиализа, при продължително приложение лекарството може да предизвика промени в настроението или умствената активност.

Продължителното приложение във високи дози, съпроводено с фосфатен дефицит в храната, може да предизвика остеомаляция (размекване на костите), поради понижаване съдържанието на фосфати в кръвта.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЛУМИ ГЕЛ



Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се използва до 1 месец след отваряне на бутилката.

Не използвайте Алуми гел след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Алуми гел

- Активните вещества са: алуминиев хидроксид 345,8 mg и магнезиев хидроксид 113 mg в 5 ml суспензия.
- Другите съставки са: сорбитол, пропиленгликол, лимоново масло, сукралоза, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, бутил парахидроксибензоат, кармелоза натрий, ксантанова гума, пречистена вода.

Как изглежда Алуми гел и какво съдържа опаковката

Перорална суспензия с бял, до почти бял цвят, с мирис на лимон, която при съхранение може да отдели бистър слой на повърхността и при енергично разклащане възстановява хомогенността си. Суспензия по 170 ml в кафяви ПЕТ бутилки с полиетиленова капачка. По 1 бутилка в картонена кутия, заедно с мерителна чашка и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: юни 2010.

