

Листовка: Информация за пациента

Aminoplasma Paed 10% solution for infusion Аминоплазмал Пед 10% инфузионен разтвор За употреба при деца (0-11-годишна възраст)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като при Вашето дете.
- Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Аминоплазмал Пед 10% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди детето Ви да получи Аминоплазмал Пед 10%
3. Как да използвате Аминоплазмал Пед 10%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Аминоплазмал Пед 10%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ЛЕКАРСТВАТА	
ИЗПОЛЗВАТЕЛНА АГЕНЦИЯ	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20130392
Разрешение №	/.....
Одобрение №	3.1.-03-2016

ИМ 14242

1. Какво представлява Аминоплазмал Пед 10% и за какво се използва

Аминоплазмал Пед 10% съдържа аминокиселини, които са от основно значение за растежа или възстановяването на организма. Разтворът е адаптиран с цел да отговаря на специфичните нужди на недоносени и на родени на термин новородени, кърмачета и деца. Те ще получат този разтвор като част от интравенозното хранене, ако не са в състояние да се хранят нормално. Възможно е да получат и други хранителни съставки, като глюкозни разтвори или мастни емулсии, в комбинация с Аминоплазмал Пед 10%.

2. Какво трябва да знаете, преди детето Ви да получи Аминоплазмал Пед 10%

Не използвайте Аминоплазмал Пед 10%, ако Вашето дете

- е алергично към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
- има вродени нарушения на метаболизма на белтъчините и/или аминокиселините
- има животозастрашаващо състояние на кръвообращението (шок)
- има необичайно ниско ниво на калий
- има киселинни вещества, които се натрупват в кръвта (ацидоза)
- има тежка сърдечна слабост с нарушено кръвообращение (декомпенсирана сърдечна недостатъчност)
- има недостиг на кислород
- има наднормено количество вода в тялото, отоци по крайниците (хиперхидратация).
- натрупване на течност в белите дробове (белодробен оток)



Вашият лекар ще вземе предвид, че по принцип не трябва да се използват съдържащи аминокиселини разтвори, ако вашето дете

- страда от тежко чернодробно заболяване (тежка чернодробна недостатъчност)
- страда от тежка бъбречна недостатъчност, която не се лекува със заместителна бъбречна терапия
- е в състояние на кома в резултат на тежка чернодробна недостатъчност (чернодробна кома)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате Аминоплазмал Пед 10%, ако Вашето дете

- страда от увреждане на обмяната на белтъчините и/или аминокиселините, причинено от всяко друго състояние, различно от вродено нарушение на метаболизма (вижте точка „Не използвайте Аминоплазмал Пед 10%, ако Вашето дете...“).
- страда от увреждане на чернодробната и/или бъбречната функция
- има силно концентриран кръвен серум (висок серумен осмоларитет)
- има нужда от ограничаване приема на течности

Допълнителни предпазни мерки от страна на Вашия лекар

Преди и докато децата получават този разтвор, лекарят ще проверява нивата на течностите, биохимичните и други кръвни показатели, функцията на черния дроб и бъбреците.

Обикновено децата получават Аминоплазмал Пед 10% като част от интравенозно хранене, което включва и енергийни добавки (глюкозни разтвори, мастни емулсии), витамини, електролити и микроелементи.

Други лекарства и Аминоплазмал Пед 10%

Информирайте Вашия лекар, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало или е възможно да приеме други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да получите това лекарство.

Аминоплазмал Пед 10% е предназначен за употреба само при деца (под 12-годишна възраст).

Шофиране и работа с машини

Неприложимо.

3. Как да използвате Аминоплазмал Пед 10%

Аминоплазмал Пед 10% се прилага от здравни работници.

Лекарят ще прецени какво количество от това лекарство е необходимо и за колко време това лекарство ще се прилага при деца.

Разтворът ще се прилага през малка пластмасова тръбичка, поставена във вена.

Ако детето Ви получи повече от необходимата доза Аминоплазмал Пед 10%



Ако това лекарство се прилага твърде бързо, възможно е да не се понесе добре. Тогава детето Ви може да се почувства зле, възможно е да повърне или да се наблюдава зачервяване на лицето и усещане за топлина. Възможно е също детето Ви да загуби аминокиселини с урината и в резултат от това е възможно да настъпи промяна в пропорциите на аминокиселините в организма му.

В случай на предозиране, Вашият лекар ще приложи на детето Ви всяко необходимо лечение.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Подобни нежелани реакции не са свързани със самия разтвор на Aminoplasma Paed 10 %, а са възможни при всякакво парентерално хранене, особено в началото му.

Нечести (може да засегнат 1 100 души):

- гадене, повръщане
- главоболие
- треперене
- повишена телесна температура

Възпаление на вена плюс образуване на кръвен съсирек (тромбофлебит), може да възникне, когато продуктът не е достатъчно разреден и се прилага през малка вена.

Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Аминоплазмал Пед 10%

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да не се замразява. Да не се използва, ако случайно е бил замразен и извърлите сака.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Аминоплазмал Пед 10%

Активните вещества са

Аминокиселини	в 1 ml	в 100 ml	в 250 ml
Изолевцин	5,10 mg	0,51 g	1,28 g
Левцин	7,60 mg	0,76 g	1,90 g
Лизинов монохидрат (еквивалент на лизин)	9,88 mg (8,80 mg)	0,99 g (0,88 g)	2,47 g (2,20 g)
Метионин	2,00 mg	0,20 g	0,50 g
Фенилаланин	3,10 mg	0,31 g	0,78 g
Треонин	5,10 mg	0,51 g	1,28 g
Триптофан	4,00 mg	0,40 g	1,00 g
Валин	6,10 mg	0,61 g	1,53 g
Аргинин	9,10 mg	0,91 g	2,28 g
Хистидин	4,60 mg	0,46 g	1,15 g
Аланин	15,90 mg	1,59 g	3,98 g
Глицин	2,00 mg	0,20 g	0,50 g
Аспарагинова киселина	6,60 mg	0,66 g	1,65 g
Глутаминова киселина	9,30 mg	0,93 g	2,33 g
Пролин	6,10 mg	0,61 g	1,53 g
Серин	2,00 mg	0,20 g	0,50 g
N-ацетилтирозин (еквивалент на тирозин)	1,30 mg (1,06 mg)	0,13 g (0,11 g)	0,33 g (0,27 g)
Ацетилцистеин (еквивалент на цистеин)	0,700 mg (0,520 mg)	0,070 g (0,052 g)	0,175 g (0,13 g)
Таурин	0,300 mg	0,030 g	0,075 g

	в 1 ml	в 100 ml	в 250 ml
Съдържание на аминокиселини	0,1 g	10 g	25 g
Съдържание на азот	0,0152 g	1,52 g	3,8 g

Енергийна стойност [kJ/l (kcal/l)]	1700 (400)
Теоретичен осмоларитет [mOsm/l]	790
Киселинност (титриране до pH 7,4)	23 mmol
pH	прибл. 6,1

Другите съставки са лимонена киселина монохидрат (за корекция на pH) и вода за инжекции.



Как изглежда Аминоплазмал Пед 10% и какво съдържа опаковката

Аминоплазмал Пед 10% е бистър, безцветен до светложълт разтвор.
Доставя се в гъвкави сакове, съдържащи 100 ml или 250 ml разтвор на аминокиселини.
Саковете са направени от многослойно фолио. Вътрешният слой, който е в контакт с разтвора, е от полипропилен.

Контейнерът не съдържа PVC, DEHP и латекс.

Сакът е опакован в защитен пластмасов сак. Между сака и външната обвивка има абсорбер за кислород (съдържащ прахообразен железен хидроксид).
Различни размери контейнери са опаковани в картонени кутии, съдържащи по 12 сака.
Опаковки: 12 x 100 ml и 12 x 250 ml
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

Пощенски адрес:

34212 Melsungen, Германия

34209 Melsungen, Германия

Телефон: +49/5661/71-0

Факс: +49/5661/71-4567

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕО под следните имена:

Австрия	Aminoplasma Paed 10% Infusionslösung
Белгия	Aminoplasma Paediatric oplossing voor infusie/solution pour perfusion/Infusionslösung
България	Аминоплазмал Пед 10% инфузионен разтвор
Чешка република	Amipred
Дания	Amipred
Финландия	Amipred
Германия	Aminoplasma Paed 10% Infusionslösung
Гърция	Aminoplasma Paed 10%
Унгария	Aminoplasma Paed 10% Oldatos infúzió
Италия	Amipred
Люксембург	Aminoplasma Paed 10%
Нидерландия	Aminoplasma Paed 100 mg/ml oplossing voor infusie
Норвегия	Amipred
Полша	Aminoplasma Paed 10%
Португалия	Aminoplasma Paed
Словакия	Amipred
Словения	Aminoplasma Paed 100 mg/ml raztopina za infundiranje
Швеция	Amipred
Обединено кралство	Aminoplasma Paediatric 10% solution for infusion

Дата на последно преразглеждане на листовката Септември 2015.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:



Дозировка

Педиатрична популация

Дозите за тези възрастови групи, както са посочени по-долу, са средни ориентировъчни стойности. Точната доза следва да се определи индивидуално в зависимост от възрастта, стадия на развитие, водещото заболяване и вида на терапия.

Прилагането трябва да започне със скорост на инфузия по-ниска от целевата и да се увеличи до целевата стойност в рамките на първия час.

Парентерално набавяне на аминокиселини, което се счита за адекватно при повечето педиатрични пациенти:

Недоносени: 1,5-4,0 g аминокиселини/kg телесно тегло на ден = 15-40 ml /kg т.т./д

Новородени на термин (0-27 дни): 1,5-3,0 g /kg т.т./д = 15-30 ml/kg т.т./д

Новородени и деца в кърмаческа възраст (28 дни до 23 месеца): 1,0-2,5 g /kg т.т./д = 10-25 ml/kg т.т./д

Деца (2 до 11 години): 1,0-2,0 g/kg т.т./д = 10-20ml/kg т.т./д

За тежко болни деца препоръчителният прием на аминокиселини може да е по-висок (до 3,0 g аминокиселини/kg телесно тегло на ден).

Максимална скорост на инфузия до 0,1 g аминокиселини/kg телесно тегло на час, съответстваща приблизително на 1 ml/kg телесно тегло и час

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Да не се използва, ако външната обвивка е била отваряна или е повредена. Използвайте само сакове, които не са повредени, и в които аминокиселинният разтвор е бистър и без видими частици.

Аминоплазмал Пед 10% се доставя в контейнери за еднократна употреба. Неизползвани остатъци трябва да бъдат изхвърлени.

Разтворът винаги трябва да се оставя да достигне стайна температура преди инфузия.


От съществено значение е всякакво смесване да става със строго асептична техника, понеже тази смес от хранителни вещества поддържа бактериален растеж.

Аминоплазмал Пед 10% трябва да се използва незабавно след отваряне на контейнера.

Аминоплазмал Пед 10%: Работа с продукта

Фигура А: Сак и външна обвивка






Oxygen Adsorber

Tear Notches	Точки за закъсване
Overwrap	Външна обвивка
Oxygen adsorber	Абсорбер за кислород

Фигура В: Сак



Infusion Port

Medication Port

Bag Hanger	Закачалка за окачване на сака
Infusionport	Порт за инфузия
Medication Port	Порт за лекарства


Отваряне:

Извадете торбичката от защитната външна обвивка, като започнете от точката за закъсване в горната част (Фигура 1).

Изхвърлете външната опаковка и абсорбера за кислород.

Проверете за течове. Ако установите теч от сака, изхвърлете продукта, понеже е възможно стерилността да е нарушена.







Добавяне на лекарствени продукти:

Смесите трябва да се приготвят по строго асептични техники.

Съвместими допълнителни лекарства могат да бъдат добавяни през порта за лекарства (прозрачен).

1. Подгответе порта за лекарства (прозрачен) като отстраните алуминиевото фолио (Фигура 2a). Моля, обърнете внимание: Областта под фолиото на порта за лекарства е стерилна.
2. Пробийте порта за лекарства, който може отново да бъде запечатван, и инжектирайте добавката(ите) (Фигура 2b).
3. Смесете добре разтвора и медикамента (Фигура 3a).
4. Портът за лекарства може да бъде избърсан с тампон, напоен с дезинфектант (напр. изопропанол), преди да бъде отново пробит.
5. Огледайте сместа за наличието на видими частици (Фигура 3b).



Подготовка за приложение:

1. Отстранете алуминиевото фолио на порта за инфузия (зелен) в долната част на контейнера (Фигура 4a) и включете системата (Фигура 4b): използвайте не-вентилирани системи за инфузия или затворете входа за въздух на вентилирана система. Следвайте указанията за употреба на системата за инфузия. Моля, обърнете внимание: Областта под фолиото на порта за инфузия е стерилна.



2. Окачете сака на статив за i.v. инфузия (Фигура 5).

