

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Ацетилин® С 400 mg/240 mg ефервесцентни таблетки
ацетилсалицилова киселина/аскорбинова киселина

Acetylin® С 400 mg/240 mg effervescent tablets
acetylsalicylic acid/ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
 - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
- Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Ацетилин С и за какво се използва;
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ацетилин С;
3. Как да приемате Ацетилин С;
4. Възможни нежелани реакции;
5. Как да съхранявате Ацетилин С;
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20110300
Разрешение №	11-33581 / 02-06-2016
Одобрение №	

1. Какво представлява Ацетилин С и за какво се използва

Ацетилин С е комбиниран лекарствен продукт, който съдържа ацетилсалицилова и аскорбинова киселина (витамин С). Ацетилсалициловата киселина облекчава болката и намалява възпалението, понижава повишената телесна температура. Витамин С подобрява обмяната на веществата в клетката, има антиоксидантно действие, стимулира защитните сили на организма.

Ацетилин С се използва за облекчаване на болка при главоболие, зъбобол, заболявания и травми на мускулите и ставите. Подходящ е при някои простудни и вирусни заболявания, вкл. грип за овладяване на повишената температура.

Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ацетилин С

Не приемайте Ацетилин С ако:

- сте алергични (свръхчувствителни) към ацетилсалицилова киселина, салицилати или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);



Ако приемате лекарства за лечение на захарен диабет, вкл. инсулин, е необходимо да знаете, че е възможно нивото на кръвната захар да се понижи, поради което е желателно да се консултирате с лекар, който ще прецени налага ли се промяна в дозировката на тези лекарства.

Ацетилин С с храна и напитки

Когато приемате този продукт не трябва да консумирате алкохол, тъй като рискът от увреждане на стомаха и червата е по-висок.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност: продуктът не трябва да се прилага в първите три месеца на бременността, защото може да доведе до увреждане на плода. Приемането му по време на третото тримесечие на бременността повишава риска от забавяне на раждането, както и от кръвоизливи при майката и новороденото. Ацетилин С не трябва да се прилага в последните три месеца на бременността.

Кърмене: ацетилсалициловата киселина се отделя с кърмата. Ако е необходимо продуктът да се приема по-продължително време или в по-високи дози, е препоръчително преустановяване на кърменето за времето на лечение с продукта.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за неблагоприятно влияние на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.

Ацетилин С съдържа натрий

Всяка таблетка съдържа 229 mg натрий, което трябва да имате предвид, ако е необходимо да спазвате диета с ограничен прием на готварска сол.

3. Как да приемате Ацетилин С

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Продуктът е предназначен за приложение през устата. Таблетките се разтварят в чаша вода преди употреба. Препоръчително е да се приемат по време или непосредствено след хранене.

Възрастни

Препоръчителна дневна доза – 1-2 таблетки, 3-4 пъти дневно.

Максимална дневна доза – 10 таблетки (общо съдържание на ацетилсалицилова киселина 4 g).

Деца над 12-годишна възраст

Препоръчителна еднократна доза - 15 mg/kg ацетилсалицилова киселина на всеки 6 часа или 10 mg/kg на всеки 4 часа (1 ефервесцентна таблетка).

Препоръчителна дневна доза - 60 mg/kg ацетилсалицилова киселина, разпределена в 4-6 равномерни приема (3-4 ефервесцентни таблетки).

Препоръчва се 400 mg ацетилсалицилова киселина като еднократна доза, съответстваща на 1 ефервесцентна таблетка.

Посъветвайте се с Вашия фармацевт, за да прилагате точната доза при деца.

Продължителност на приложение - средно 3 дни в случаите, при които се прилага за понижаване на температурата и средно 5 дни за повлияване на болката.

Ацетилин С не трябва да се прилага при деца под 12-годишна възраст, освен по изрично лекарско предписание.



По-голяма продължителност на лечение се допуска след лекарско назначение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ацетилин С

Ако Вие сте приели повече от посочената доза, можете да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Предозирането (при лечение или случайно) с ацетилсалицилова киселина може да доведе до интоксикация, която да бъде сериозна при лица в напреднала възраст и малки деца, като в някои случаи може да има фатален изход. Най-често се появяват шум в ушите, нарушения на слуха, главоболие, световъртеж, обърканост.

Ако обаче в хода на лечение с продукта телесната температура се повиши значително, появи се учестено дишане, налице е значимо понижение на кръвното налягане, дишането се затрудни, е необходимо веднага да потърсите съвет от лекар или да посетите най-близкото лечебно заведение. В случай на предозиране веднага трябва да се прекрати приемът на продукта, да се предизвика повръщане, да се приложи активен въглен и други подходящи средства, както и водно-солеви разтвори.

Ако сте пропуснали да приемете Ацетилин С

Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили, за да може лекарството да окаже очаквания ефект. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви други въпроси относно приложението на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ацетилин С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират по честота както следва:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека)

- коремна болка, киселини, оригване и парене зад гръдната кост, гадене, повръщане, подуване и неразположение в областта на корема;
- намаляване на броя на тромбоцити (кръвните плочици), което повишава риска от кървене или образуване на синини;
- копривна треска, кожни обриви и сърбеж, астма, тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

- повръщане на кръв, наличие на кръв в изпражненията, язви на стомаха и дванадесетопръстника. Срещат се по-често при прием на високи дози;
- световъртеж, шум в ушите, главоболие, сънливост. Обикновено се наблюдават при предозиране.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека)

- потискане на бъбречната функция.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека)

- повишени стойности на пикочна киселина и урея.



С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- изолирани случаи на нарушения във функцията на черния дроб;
- увреждане на бъбречните тъкани.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София, тел: +359 28903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ацетилин С

Да се съхранява при температура под 25° С.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да предпази от влага.

Не използвайте Ацетилин С след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 7 (седем) месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ацетилин С

- Активни вещества в 1 таблетка: ацетилсалицилова киселина 400 mg и аскорбинова киселина 240 mg.
- Другите съставки са: лимонена киселина, безводна, повърхностно модифицирана; мононатриев цитрат, безводен; натриев хидрогенкарбонат; повърхностно модифициран; манитол; силициев диоксид, колоиден безводен; адипинова киселина.

Как изглежда Ацетилин С и какво съдържа опаковката

Ацетилин С представлява кръгли, плоски таблетки с бял до почти бял цвят.

10 ефервесцентни таблетки са опаковани в полипропиленова опаковка за таблетки, затворена с полиетиленова капачка, съдържаща сушител.

1 полипропиленова опаковка заедно с листовка за потребителя се опаковат в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Производители

Фармацевтични заводи Милве АД



с. Търнак 3249, Бяла Слатина, България

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: Март 2016 г.

