

Листовка: информация за пациента

Бозентан Сандоз 62,5 mg филмирани таблетки
Bosentan Sandoz 62,5 mg film-coated tablets

Бозентан Сандоз 125 mg филмирани таблетки
Bosentan Sandoz 125 mg film-coated tablets
Бозентан (Bosentan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бозентан Сандоз и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозентан Сандоз
3. Как да приемате Бозентан Сандоз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бозентан Сандоз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВОУЩЕТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

20140001/02

Разрешение № 33883-7, 28-06-2018

Досрочане №

1. Какво представлява Бозентан Сандоз и за какво се използва

Бозентан Сандоз таблетки съдържа бозентан и принадлежи към група лекарства, наречени "ендотелин рецепторни антагонисти".

Бозентан Сандоз се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ). БАХ е високо кръвно налягане в кръвоносните съдове (белодробните артерии), които носят кръв от сърцето към белите дробове. Бозентан Сандоз разширява белодробните артерии, като по този начин улеснява сърцето да изтласква кръвта през тях. Това понижава кръвното налягане и облекчава симптомите.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозентан Сандоз

Не приемайте Бозентан Сандоз

- ако сте алергични към бозентан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако имате чернодробни проблеми (посъветвайте се със своя лекар)
- ако сте бременна или бихте могла да забременеете, тъй като не използвате надеждни методи за контрацепция (използването само на хормонални контрацептиви не е достатъчно ефективно, когато приемате Бозентан Сандоз)
- ако приемате циклоспорин А (лекарство, използвано след трансплантация на органи или за лечение на псориазис)

Ако някое от горните се отнася за Вас, кажете на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Бозентан Сандоз.

Изследвания, които Вашият лекар ще Ви назначи преди лечението

- кръвни изследвания, с цел проверка на чернодробната Ви функция
- кръвни изследвания, за да се провери наличието на анемия (нисък хемоглобин)
- тест за бременност, ако сте жена с детероден потенциал

При някои пациенти, приемащи Бозентан Сандоз, са установени отклонения в резултатите от изследванията на чернодробната функция и анемия (нисък хемоглобин). По време на лечението с Бозентан Сандоз Вашият лекар ще Ви назначава редовни кръвни изследвания за установяване на промени в чернодробната функция и нивото на хемоглобина.

Относно всички тестове, моля проверявайте картата за бележки на пациента (вътре в опаковката на таблетките Бозентан Сандоз). Важно е да провеждате тези редовни кръвни изследвания, докато приемате Бозентан Сандоз. Съветваме Ви да записвате датата на Вашите последни изследвания, както и на следващите изследвания (попитайте Вашия лекар за датата) на картата за бележки на пациента, за да си помогнете да не забравите кога трябва да направите следващите изследвания.

Кръвни изследвания на чернодробна функция:

Тези изследвания ще се правят всеки месец, докато трае лечението с Бозентан Сандоз. При повишаване на дозата ще се направи допълнително изследване след 2 седмици.

Бозентан Сандоз може да засегне черния Ви дроб. Признаците, че черният Ви дроб може би не работи правилно, включват:

- гадене (позиви за повръщане)
- повръщане
- треска (висока температура)
- болка в стомаха (корема)
- жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)
- тъмно оцветяване на урината
- сърбеж на кожата
- летаргия или прекомерна умора (необичайна умора или изтощение)
- грипopodobен синдром (ставни и мускулни болки с температура)

Ако забележите някои от тези признаци:

Съобщете незабавно на Вашия лекар

Кръвни изследвания за анемия:

Тези изследвания ще се правят всеки месец през първите 4 месеца от лечението, след това на всеки 3 месеца, тъй като пациентите, приемащи Бозентан Сандоз могат да развият анемия.

Ако тези резултати са извън нормалните граници, Вашият лекар може да реши да намали дозата Ви или да прекъсне лечението с Бозентан Сандоз и ще направи допълнителни изследвания, за да установи причината.

Тестове за бременност при жени в детеродна възраст:

Бозентан Сандоз може да увреди неродените бебета, заченати преди започването или по време на лечението. Ако сте жена, която би могла да забременее, Вашият лекар ще Ви помоли да направите тест за бременност, преди да започнете да приемате Бозентан Сандоз и да правите тестове за бременност редовно, докато приемате Бозентан Сандоз.

- Не приемайте Бозентан Сандоз, ако сте бременна или планирате бременност.

- Ако има вероятност да забременеете, използвайте надежден метод за контрол на забременяването (контрацепция), докато приемате Бозентан Сандоз. Вашият лекар или



гинеколог ще Ви препоръча надеждни методи за контрацепция, докато приемате Бозентан Сандоз. Тъй като Бозентан Сандоз може да направи хормоналните контрацептиви (например перорални, инжекционни, имплантанти или пластири за кожа) неефективни, този метод сам по себе си не е надежден. Поради това, ако ползвате хормонални контрацептиви, трябва заедно с това да прилагате и бариерен метод (например женски кондом, диафрагма, контрацептивна гъбичка или Вашият партньор трябва да използва кондом). Вътре в опаковката с таблетки Бозентан Сандоз ще откриете карта за напомняне на пациента. Трябва да попълните тази карта и да я занесете на Вашия лекар при следващото посещение, за да може Вашият лекар или гинеколог да прецени дали се нуждаете от допълнителни или алтернативни надеждни методи за контрацепция. Препоръчва се всеки месец да правите тест за бременност, докато приемате Бозентан Сандоз, ако сте в детеродна възраст.

Информирайте веднага Вашия лекар, ако забременеете, докато приемате Бозентан Сандоз, или ако планирате бременност в близко бъдеще.

Кърмене:

Уведомете веднага Вашия лекар, ако кърмите. Той ще Ви посъветва да спрете да кърмите, ако Ви е назначено лечение с Бозентан Сандоз, тъй като не е известно дали това лекарство преминава в кърмата.

Други лекарства и Бозентан Сандоз

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и лекарства без рецепта. Особено важно е да кажете на Вашия лекар, ако приемате:

- хормонални контрацептиви (тъй като те са неефикасни като единствен метод за контрацепция, докато приемате Бозентан Сандоз). Вътре в опаковката с таблетки Бозентан Сандоз ще откриете карта с бележки на пациента, която трябва внимателно да прочетете. Вашият лекар и/или гинеколог ще установи какъв метод за контрацепция е подходящ за вас.
- глибенкламид (лекарство за диабет) (тъй като тази комбинация може да увеличи риска от нежелани реакции)
- циклоспорин А (лекарство, използвано след трансплантация на органи или за лечение на псориазис) или други лекарства, използвани, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантираните органи (тъй като тези лекарства могат да повишат концентрациите на Бозентан Сандоз в кръвта)
- флуконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции) (тъй като това лекарство може да повиши концентрациите на Бозентан Сандоз в кръвта)
- рифампицин (лекарство за лечение на туберкулоза) (тъй като това лекарство може да понижи ефикасността на Бозентан Сандоз)
- лекарства за лечение на инфекция с ХИВ

Бозентан Сандоз с храна и напитки

Бозентан Сандоз може да се приема независимо от приема на храна.

Шофиране и работа с машини

Ако се чувствате замаяни докато приемате Бозентан Сандоз, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

3. Как да приемате Бозентан Сандоз

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако чувствате, че ефектът на Бозентан Сандоз е прекалено силен или прекалено слаб, говорете с Вашия лекар, за да се установи дали Вашата доза трябва да бъде променена.



Обичайна доза

Възрастни

При възрастни, обикновено лечението започва с 62,5 mg два пъти дневно (сутрин и вечер), през първите 4 седмици, а след това обикновено лекарят ще Ви посъветва да приемате по една таблетка от 125 mg два пъти дневно, в зависимост от това как реагирате на Бозентан Сандоз.

Деца и пациенти с ниско телесно тегло

Лечението с Бозентан Сандоз при деца и пациенти с ниско тегло, обикновено започва с доза от 2 mg на килограм телесно тегло два пъти дневно (сутрин и вечер). Вашият лекар ще Ви даде съвет относно дозата Ви.

Таблетките трябва да се приемат (сутрин и вечер) с вода. Таблетките могат да се приемат с или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бозентан Сандоз

Ако приемете повече таблетки, отколкото Ви е било казано, веднага се свържете със своя лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Бозентан Сандоз

Ако забравите да приемете Бозентан Сандоз, вземете дозата веднага, когато се сетите, след това продължете да приемате таблетките в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Бозентан Сандоз

Внезапното спиране на лечението с Бозентан Сандоз може да доведе до влошаване на Вашите симптоми. Не спирайте приема на Бозентан Сандоз, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Вашият лекар може да Ви назначи намаляване на дозата за няколко дни, преди пълното спиране на лечението. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Когато Бозентан Сандоз е приеман по време на клинични изследвания, са наблюдавани следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

- Главоболие
- Необичайни чернодробни функционални изследвания
- Оток (подуване на краката и глезените или други признаци за задръжка на течности)

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- Анемия (нисък брой червени кръвни клетки) или понижен хемоглобин
- Зачервяване на лицето
- Реакции на свръхчувствителност (включват възпаление на кожата, сърбеж и обрив)
- Гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на киселини)
- Разстройство (диария)
- Зачервяване на кожата

Следните нежелани реакции са настъпили след пускането на пазара на Бозентан Сандоз:



Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- Синкоп (припадък)
- Палпитации (бързо или нередовно сърцебиене)
- Ниско кръвно налягане
- Запушване на носа

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

- Тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити)
- Неутропения/левкопения (нисък брой бели кръвни клетки)
- Повишени резултати от изследвания на чернодробната функция с хепатит (възпаление на черния дроб) включително възможно усложнение на подлежащ хепатит и/или жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

- Анафилаксия (обща алергична реакция), ангионевротичен оток (оток, най-често около очите, устните, езика или гърлото)
- Цироза (увреждане на тъканта) на черния дроб, чернодробна недостатъчност (сериозни нарушения на чернодробната функция)

Неизвестни (честотата не може да се установи въз основа на наличните данни)

- Анемия (нисък брой на червените кръвни клетки) или понижаване на хемоглобина, което понякога налага преливане на кръв

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции или признаци на алергична реакция (например, подуване на лицето или езика, обрив, сърбеж), докато приемате Бозентан Сандоз, или ако някоя от гореспоменатите нежелани реакции Ви притеснява, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бозентан Сандоз

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



Какво съдържа Бозентан Сандоз

Бозентан Сандоз 62,5 mg филмирани таблетки: Активното вещество е бозентан. Всяка таблетка съдържа 62,5 mg бозентан (съответстващ на 64,541 mg бозентанов монохидрат).

Бозентан Сандоз 125 mg филмирани таблетки: Активното вещество е бозентан. Всяка таблетка съдържа 125 mg бозентан (съответстващ на 129,082 mg бозентанов монохидрат).

Другите съставки в ядрото на една таблетка са царевично нишесте, прежелатинизирано царевично нишесте, натриев нишестен гликолат тип А, повидон К-30, глицеролов дибехенат, магнезиев стеарат, полоксамер 188, силиконов диоксид колоиден.

Филмовото покритие съдържа хипромелоза, титанов диоксид (E171), етилцелулоза, триацетин (E1518), талк, жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172).

Как изглежда Бозентан Сандоз и какво съдържа опаковката

Бозентан Сандоз 62,5 mg филмирани таблетки са светло оранжеви, кръгли, двойноизпъкнали, филмирани таблетки с размер 6 mm.

Бозентан Сандоз 125 mg филмирани таблетки са светло оранжеви, елипсовидни, двойноизпъкнали, филмирани таблетки с размер 11 mm.

Блистери от PVC/ PVDC/алуминий

Опаковката съдържа 14, 56 или 112 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

Verovskova 57, SI-1000 Ljubljana

Словения

Производител

Cemelog-BRS Ltd., Budaors, Vasút u.13, 2040, Унгария

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Словения

Lek S.A.,

Административен адрес: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Полша

Място на производство: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Полша

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Румъния

GE Pharmaceuticals Ltd., Industrial Zone, Chekanitza-South area, 2140 Botevgrad, България

Този лекарствен продукт е одобрен в страните-членки на ЕИП със следните наименования:

България	Бозентан Сандоз 62,5 mg филмирани таблетки Бозентан Сандоз 125 mg филмирани таблетки
Чехия	Bosentan Sandoz
Естония	Bosentan Sandoz
Литва	Bosentan Sandoz 62,5 mg plėvele dengtos tabletes



Латвия	Bosentan Sandoz 125 mg plēvele dengtos tabletes Bosentan Sandoz 62,5 apvalkotās tablete Bosentan Sandoz 125 apvalkotās tablete
Полша	Bosentan Sandoz
Словения	Bosentan Sandoz 62,5 mg filmsko obložene tablete Bosentan Sandoz 125 mg filmsko obložene tablete

Дата на последно преразглеждане на листовката
ММ/ГГГГ

НАПОМНЯЩА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТА

Важна информация за безопасност при пациенти, приемащи Бозентан Сандоз.
Тази карта съдържа важна информация за Бозентан Сандоз. Моля, прочетете информацията внимателно, преди да започнете лечение с Бозентан Сандоз.

Вашето име: _____

Лекуващ лекар: _____

Ако имате въпроси, свързани с Бозентан Сандоз, попитайте Вашия лекар.
Бозентан Сандоз 62,5 mg филмирани таблетки
Бозентан Сандоз 125 mg филмирани таблетки
Притежател на разрешението за употреба: Sandoz d.d., Verovskova 57, SI-1000 Ljubljana, Словения

Прочетете тази страница внимателно, ако сте пациентка в детеродна възраст

Бременност

Лечението с бозентан може да причини увреждане на плода. Затова, не трябва да приемате Бозентан Сандоз ако сте бременна, и не трябва да забременявате по време на лечението с Бозентан Сандоз.

Освен това, ако страдате от белодробна хипертония, настъпването на бременност може да доведе до тежко влошаване на симптомите на заболяването. Ако подозирате, че сте бременна, уведомете Вашия личен лекар или гинеколог.

Предпазване от забременяване

Хормоналните средства за контрол на забременяването, като перорални противозачатъчни средства или контрацептивни хапчета, хормонални инжекции, противозачатъчни импланти или кожни пластири, не осигуряват надеждно предпазване от забременяване при жени, приемащи Бозентан Сандоз.

За целта, освен някое от посочените хормонални средства, трябва да използвате бариерен противозачатъчен метод – презерватив, диафрагма или контрацептивна гъбичка. Обсъдете с Вашия лекуващ лекар или гинеколог всички свои въпроси на тази тема – отбележете отговорите на въпросите, посочени на гърба на тази карта, и я носете със себе си при следващото посещение при Вашия личен лекар или гинеколог.

Преди да започнете да приемате Бозентан Сандоз и всеки месец по време на лечението,
трябва да правите тест за бременност, дори да смятате, че не сте бременна.

Дата на първия ежемесечен тест: _____

Предпазване от бременност

В момента използвате/ приемате ли противозачатъчни средства?

☐ Да ☐ Не



Ако отговорът е „Да”, посочете наименованията им:

Носете тази карта със себе си при следващото посещение при Вашия личен лекар или гинеколог, за да може той/тя да Ви посъветва, ако се нуждаете от допълнителни или други противозачатъчни мерки.

Проведен ежесмесчен тест за бременност:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Януари | ☐ Май | ☐ Септември |
| ☐ Февруари | ☐ Юни | ☐ Октомври |
| ☐ Март | ☐ Юли | ☐ Ноември |
| ☐ Април | ☐ Август | ☐ Декември |

Кръвни изследвания на чернодробната функция

При някои пациенти, приемащи бозентан, са наблюдавани отклонения в резултатите от чернодробните изследвания. По време на лечението с Бозентан Сандоз, Вашият лекар ще Ви назначи редовни кръвни изследвания за проверка на настъпили промени в чернодробната функция.

Помнете, че трябва да преминавате чернодробните изследвания всеки месец.

При повишаване на дозата, 2 седмици по-късно ще бъде направено допълнително изследване.

Дата на първото ежесмесчно изследване: _____

Вашият месечен график за кръвни чернодробни изследвания:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Януари | ☐ Май | ☐ Септември |
| ☐ Февруари | ☐ Юни | ☐ Октомври |
| ☐ Март | ☐ Юли | ☐ Ноември |
| ☐ Април | ☐ Август | ☐ Декември |

