

Листовка: информация за потребителя

Бринзоламид Актавис 10 mg/ml капки за очи, суспензия Brinzolamide Actavis 10 mg/ml eye drops, suspension

бринзоламид (brinzolamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бринзоламид Актавис и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бринзоламид Актавис
3. Как да използвате Бринзоламид Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бринзоламид Актавис
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Активис	20150334
Към Рег. №	
Разрешение №	
Одобрение №	JA-22462 / 31-05-2017

1. Какво представлява Бринзоламид Актавис и за какво се използва

Бринзоламид Актавис съдържа бринзоламид, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на карбоанхидразата. Той намалява вътреочното налягане.

Бринзоламид Актавис се използва за лечение на повишено вътреочно налягане. Това налягане може да доведе до заболяване, наречено глаукома.

Ако налягането в окото е твърде високо, то може да увреди Вашето зрение.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бринзоламид Актавис

Не използвайте Бринзоламид Актавис:

- ако имате тежки бъбречни проблеми.
- ако сте алергични към бринзоламид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични към лекарства, наречени сулфонамиди. Примери за това са лекарства, използвани за лечение на диабет и инфекции, а също и диуретици (таблетки за отводняване). Бринзоламид Актавис може да предизвика същата алергия.
- ако имате твърде висока киселинност на кръвта (състояние, наречено хиперхлоремична ацидоза).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар за съвет.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Бринзоламид Актавис

- ако имате бъбречни или чернодробни проблеми
- ако имате сухи очи или проблеми с роговицата



- ако приемате други сулфонамидни лекарства
- ако имате псевдоексfolиативна глаукома или пигментна глаукома
- ако имате закритоъгълна глаукома

Деца и юноши

Бринзоламид Актавис не трябва да се използва от новородени, деца и юноши под 18-годишна възраст, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.

Други лекарства и Бринзоламид Актавис

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително и лекарства, които се отпускат без лекарско предписание.

Говорете с Вашия лекар, ако приемате друг инхибитор на карбоанхидразата (ацетазоламид или дорзоламид, вижте точка 1 Какво представлява Бринзоламид Актавис и за какво се използва).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

На жените, които могат да забременеят, се препоръчва да използват ефективна контрацепция по време на лечението с Бринзоламид Актавис.

Използването на Бринзоламид Актавис не се препоръчва по време на бременност или кърмене. Не използвайте Бринзоламид Актавис, освен ако не е назначен категорично от Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте машини, докато зрението Ви не се проясни. Възможно е да откриете, че зрението ви е замъглено непосредствено след поставянето на Бринзоламид Актавис.

Бринзоламид Актавис може да наруши способността за изпълнение на задачи, изискващи повишена концентрация и/или физическа координация. Ако сте засегнати, бъдете внимателни при шофиране или работа с машини.

Бринзоламид Актавис съдържа бензалкониев хлорид

Бринзоламид Актавис съдържа консерванта (бензалкониев хлорид), който може да причини очно дразнене и е известно, че променя цвета на меките контактни лещи. Трябва да се избягва контакт с меки контактни лещи.

Ако носите контактни лещи трябва да ги отстраните преди прилагането на Бринзоламид Актавис и да изчакате поне 15 минути след прилагането на дозата преди да поставите контактните лещи обратно.

3. Как да използвате Бринзоламид Актавис

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Използвайте Бринзоламид Актавис само за накапване във Вашите очи. Да не се поглъща или инжектира.

Препоръчителната доза е

1 капка в засегнатото око или очи, два пъти дневно - сутрин и вечер.

Използвайте по толкова, освен ако Вашият лекар Ви е казал да направите нещо различно.


Използвайте Бринзоламид Актавис и в двете очи, само ако вашият лекар Ви е казал да го направите.

Използвайте го толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви е казал.





1



2



3

- Вземете бутилката Бринзоламид Актавис и огледало.
- Измийте си ръцете.
- Разклатете бутилката и отворете капачката. След като отстраните капачката, ако защитният пръстен е разхлабен, отстранете го преди да използвате продукта.
- Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и показалеца си.
- Наведете главата си назад. Разтворете клепача, с почистените вече пръсти, докато не се образува "джоб" между него и окото. Капката трябва да попадне на това място (снимка 1).
- Приближете върха на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това помага.
- **Не докосвайте с капкомера окото или клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности.** Това може да замърси капките (снимка 2).
- Внимателно стиснете бутилката, за да изпусне капка.
- След използване на Бринзоламид Актавис, натиснете с пръст ъгълчето на окото си, близо до носа (снимка 3). Това ще помогне да се преустанови навлизането на Бринзоламид Актавис в други части на тялото.
- Ако поставяте капки в двете очи, повторете стъпките и за другото око.
- Завъртете здраво капачката на бутилката веднага след употреба.
- Използвайте бутилката докрай, преди да отворите следващата бутилка.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако използвате други капки за очи оставете поне 5 минути между поставянето на Бринзоламид Актавис и другите капки. Очните мази трябва да се използват накрая.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Бринзоламид Актавис
Ако сте поставили твърде много капки в очите си, незабавно ги изплакнете с хладка вода. Не поставяйте повече капки, докато настъпи време за следващата обичайна доза.

Ако сте пропуснали да използвате Бринзоламид Актавис
Използвайте една капка веднага след като се сетите и след това спазвайте обичайна схема. **Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.**

Ако сте спрели употребата на Бринзоламид Актавис
Ако сте спрели да използвате Бринзоламид Актавис без да сте се консултирали с Вашия лекар налягането в окото Ви няма да бъде контролирано, което би могло да доведе до загуба на зрението.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са наблюдавани с Бринзоламид Актавис.



Чести нежелани лекарствени реакции
(могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

- **Ефекти, свързани с окото:** замъглено зрение, очно дразнене, болка в окото, секрети от окото, сърбеж на окото, сухота в окото, необичайно усещане в окото, зачервяване на окото.
- **Общи нежелани реакции:** лош вкус

Нечести нежелани лекарствени реакции
(могат да засегнат до 1 на 100 пациенти)

- **Ефекти, свързани с окото:** чувствителност към светлина, възпаление или инфекция на конюнктивата, подуване на окото, сърбеж на клепача, зачервяване или подуване, отлагания в очите, отблясъци, усещане за парене, разраствания по повърхността на окото, повишена пигментация на окото, уморени очи, корички по клепача или повишено сълзене.
- **Общи нежелани реакции:** забавена или намалена сърдечна функция, усещане на ударите на сърцето, забавен сърдечен ритъм, затруднено дишане, задух, кашлица, намален брой на червените кръвни клетки в кръвта, повишено ниво на хлор в кръвта, замаяност, затруднения с паметта, депресия, нервност, намалена емоционалност, кошмари, обща слабост, умора, необичайно усещане, болка, двигателни проблеми, разтрисане, намалено сексуално желание, сексуални затруднения при мъжете, симптоми на настинка, натрупване на секрет в долните дихателни пътища, инфекция на синусите, дразнене в гърлото, болки в гърлото, необичайна или намалена чувствителност в устата, възпаление на лигавицата на хранопровода, болки в корема, гадене, повръщане, разстроен стомах, засилена перисталтика, диария, чревни газове, лошо храносмилане, болки в бъбреците, мускулни болки, мускулни спазми, болки в гърба, кървене от носа, хрема, запушен нос, кихане, обрив, необичайно усещане по кожата, сърбеж, гладък кожен обрив или зачервяване с надигнат обрив, стягане на кожата, главоболие, сухота в устата, замърсяване на очите (чуждо тяло).

Редки нежелани реакции
(могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)


- **Ефекти, свързани с окото:** подуване на роговицата, двойно или намалено зрение, нарушено зрение, виждане на примигващи светлини, намалена очна чувствителност, подуване около очите, повишено очно налягане, увреждане на зрителния нерв.
- **Общи нежелани реакции:** нарушения на паметта, сънливост, болка в гърдите, натрупване на секрет в горните дихателни пътища, запушване на синусите, запушване на носа, сухота в носа, шум в ушите, косопад, генерализиран сърбеж, чувство за нервност, раздразнителност, неравномерен сърдечен ритъм, слабост на тялото, затруднено заспиване, хрипове, сърбящ кожен обрив.

С неизвестна честота (не може да бъде оценена от наличните данни)

- **Ефекти, свързани с окото:** аномалии на клепача, зрителни нарушения, нарушения на роговицата, очна алергия, намален растеж или брой на миглите, зачервяване на клепачите.
- **Общи нежелани реакции:** повишени симптоми на алергия, намалена чувствителност, треперене, загуба или намаляване на вкуса, понижено кръвно налягане, повишено кръвно налягане, ускорен сърдечен ритъм, болки в ставите, астма, болки в крайниците, зачервяване на кожата, възпаление или сърбеж, отклонения в кръвните изследвания на черния дроб, подуване на крайниците, често уриниране, намален апетит, усещане за виене на свят, обща слабост.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Бринзоламид Актавис

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Трябва да изхвърлите бутилката 4 седмици след първото отваряне, за да се избегнат евентуални инфекции. Напишете отдолу датата, на която сте отворили всяка от бутилките в полето по-долу и върху етикета на бутилката и картонената кутия. За опаковка, която съдържа само 1 бутилка напишете една дата.

Отворена (1):

Отворена (2):

Отворена (3):

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бринзоламид Актавис

Активното вещество е бринзоламид 10 mg/ml.

Другите съставки са: бензалкониев хлорид, карбомер 974Р, динатриев едетат, манитол (Е421), пречистена вода, натриев хлорид. Малки количества хлороводородна киселина или натриев хидроксид, се добавят за да се поддържа нормално ниво на рН.

Как изглежда Бринзоламид Актавис и какво съдържа опаковката

Бринзоламид Актавис е бяла до почти бяла течност (суспензия) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 5 ml с капачка на винт, защитен пръстен при отваряне и капкомер, или в опаковката се съдържат три пластмасови бутилки от 5 ml с капачка на винт, защитен пръстен при отваряне и капкомер.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Исландия

Производители

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Rua Norberto de Oliveira, no 1/5,
Póvoa de Santo Adrião, 2620-111,
Португалия



Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

България	Бринзоламид Актавис 10 mg/ml капки за очи, суспензия
Чешка република	Brinzolamid Actavis 10 mg/ml
Финландия	Brinzolamide Actavis
Ирландия	Brinzolamide Actavis 10 mg/ml Eye drops, Suspension
Малта	Brinzolamide Actavis
Холандия	Brinzolamide Actavis 10 mg/ml oogdruppels, suspensie
Норвегия	Brinzolamide Actavis
Полша	Brinzolamide Actavis
Словакия	Brinzolamide Actavis 10 mg/ml
Швеция	Brinzolamide Actavis
Обединено кралство	Brinzolamide Actavis 10 mg/ml Eye Drops, Suspension

Дата на последно преразглеждане на листовката –

