

## Листовка: информация за пациента

№ Рег. №

20150120

Амоксиклав 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор

Amoksiklav 2000 mg/200 mg powder for solution for infusion

амоксицилин и клавуланова киселина (amoxicillin and clavulanic acid)

04-10-2018

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Амоксиклав и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Амоксиклав
3. Как се прилага Амоксиклав
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амоксиклав
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Амоксиклав и за какво се използва**

Амоксиклав е антибиотик и действа чрез унищожаване на бактериите, причинители на инфекциите. Той съдържа две различни лекарства, наречени амоксицилин и клавуланова киселина. Амоксицилин принадлежи към групата лекарства, наречени "пеницилини", чието действие понякога може да бъде спряно (да се инактивира). Другият активен компонент (клавуланова киселина) не позволява това да се случи.

Амоксиклав се използва при възрастни и деца за лечение на следните инфекции:

- тежки инфекции на ушите, носа и гърлото
- инфекции на дихателните пътища
- инфекции на пикочните пътища
- инфекции на кожата и меките тъкани, включително зъбни инфекции
- инфекции на костите и ставите
- вътрекоремни инфекции
- инфекции на женските полови органи.

Амоксиклав се използва при възрастни и деца за предотвратяване на инфекции, свързани с големи хирургически процедури.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Амоксиклав****Не използвайте Амоксиклав:**

- ако сте алергични към амоксицилин, клавуланова киселина, пеницилин или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
- ако някога сте имали тежка алергична реакция към друг антибиотик. Това може да включва кожен обрив или подуване на лицето или гърлото
- ако някога сте имали проблеми с черния дроб или жълтеница (пожълтаване на кожата) при приемане на антибиотик.



**Не използвайте Амоксиклав, ако някое от горепосочените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Амоксиклав.**

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Амоксиклав, ако:

- имате жлезиста треска
- се лекувате за чернодробни или бъбречни проблеми
- не уринирате редовно.

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Амоксиклав.

В някои случаи, лекарят може да изследва вида на бактерията, която причинява Вашата инфекция. В зависимост от резултатите, може да Ви се даде Амоксиклав с различно съдържание или друго лекарство.

#### **Състояния, за които трябва да внимавате**

Амоксиклав може да влоши съществуващи състояния или да причини сериозни странични реакции. Сред тях са алергични реакции, гърчове (припадъци) и възпаление на дебелото черво. Трябва да внимавате за някои симптоми, докато приемате Амоксиклав, за да се намали рискът от проблеми. Вижте *“Състояния, за които трябва да внимавате”* в точка 4.

#### **Изследвания на кръв и урина**

Ако Ви се правят кръвни изследвания (като изследване на състоянието на червените кръвни клетки или изследване на чернодробната функция) или изследване на урина (за глюкоза), предупредете лекаря или медицинската сестра, че приемате Амоксиклав. Това е необходимо, тъй като Амоксиклав може да повлияе на резултатите от тези видове изследвания.

#### **Други лекарства и Амоксиклав**

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства без рецепта и билкови продукти.

Ако приемате алопуринол (използван за лечение на подагра) с Амоксиклав, може да повиши вероятността да получите алергична кожна реакция.

Ако приемате пробенецид (използван за лечение на подагра), Вашият лекар може да реши да коригира Вашата доза от Амоксиклав.

Ако лекарствата, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци (като варфарин), се приемат с Амоксиклав, могат да бъдат необходими допълнителни кръвни изследвания.

Амоксиклав може да повлияе начина на действие на метотрексат (лекарство, използвано за лечение на рак или ревматични заболявания).

Амоксиклав може да повлияе на начина на действие на микофенолат мофетил (лекарство, използвано за предотвратяване отхвърлянето на присадени органи).

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди употребата на това лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

Амоксиклав може да причини нежелани реакции и симптомите могат да Ви направят неспособни да шофирате. Не шофирайте и не работете с машини, освен ако се чувствате добре.





- Амоксиклав съдържа приблизително 125,9 mg (5,5 mmol) натрий, еквивалентно на 6,295 % от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастни.
- Амоксиклав съдържа приблизително 39,3 mg (1,0 mmol) калий. Това трябва да се има предвид при пациенти с бъбречни проблеми или на диета с контролирано съдържание на калий.

### 3. Как се прилага Амоксиклав

Вие никога няма да си прилагате сами това лекарство. То ще Ви бъде прилагано от квалифицирано лице, като лекар или медицинска сестра.

Препоръчителните дози са:

**Възрастни и деца с тегло 40 kg и повече**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартна доза                                            | 1000 mg/100 mg на всеки 8 до 12 часа.                                                                                                                                                                                                                   |
| По-висока доза                                             | 1000 mg/100 mg на всеки 8 часа или 2000 mg/200 mg на всеки 12 часа<br>За много тежки инфекции, дозата може да се увеличи до 2000 mg/200 mg на всеки 8 часа.                                                                                             |
| За предотвратяване на инфекции по време на и след операция | 1000 mg/100 mg до 2000 mg/200 mg преди операцията, когато Ви дават упойката.<br><br>Дозата може да се различава в зависимост от вида на операцията, която Ви се прави. Вашият лекар може да повтори дозата, ако операцията Ви продължи повече от 1 час. |

#### Деца с тегло по-малко от 40 kg

- Всички дози са определени в зависимост от телесното тегло на детето в килограми.

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Деца на възраст 3 месеца и повече:                                | 50 mg/5 mg на килограм телесно тегло на всеки 8 часа.  |
| Деца на възраст по-малко от 3 месеца или с тегло по-малко от 4 kg | 50 mg/5 mg на килограм телесно тегло на всеки 12 часа. |

#### Пациенти с бъбречни и чернодробни проблеми

- Ако имате проблеми с бъбреците, може да се прилага различна доза. Вашият лекар може да избере различна концентрация или друго лекарство.
- Ако имате проблеми с черния дроб, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и може да Ви се правят по-редовни изследвания на функцията на черния Ви дроб.


#### Как ще Ви се прилага Амоксиклав

- Амоксиклав ще се прилага чрез интравенозна инфузия.
- Задължително пийте много течности, докато приемате Амоксиклав.
- Обикновено няма да Ви се прилага Амоксиклав повече от 2 седмици, без лекарят да преразгледа лечението Ви.

#### Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Амоксиклав

Малко вероятно е да Ви се приложи по-голяма доза от предписаната, но ако мислите, че Ви е приложен повече Амоксиклав от необходимата доза, незабавно кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Признаците може да включват стомашно неразположение (гадене, повръщане или диария) или гърчове.

Ако имате допълнителни въпроси как ще Ви бъде приложен този продукт, попитайте



Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, макар че не всеки ги получава. При това лекарство може да възникнат посочените по-долу нежелани реакции.

**Състояния, за които трябва да внимавате**

##### **Алергични реакции:**

- кожен обрив
- възпаление на кръвоносните съдове (*васкулит*), което може да се прояви като повдигнати червени или морави петна по кожата, но може да засегне и други части на тялото
- повишена температура, болки в ставите, подути възли в областта на шията, подмишниците или слабините
- подуване, понякога на лицето или устата (*ангиоедем*), предизвикващо затруднено дишане
- колапс.

**Обърнете се към лекар незабавно, ако получите някой от тези симптоми. Спрете приема на Амоксиклав.**

##### **Възпаление на дебелото черво**

Възпаление на дебелото черво, предизвикващо водниста диария, обикновено с кръв и слуз, болки в стомаха и/или висока температура.

**Консултирайте се възможно най-скоро с Вашия лекар, ако получите тези симптоми.**

##### **Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)**

- млечница (*кандида* – гъбична инфекция на устата, вагината или кожните гънки)
- диария

##### **Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)**

- кожен обрив, сърбеж
- надигнат сърбящ обрив (*копривна треска*)
- неразположение (гадене), особено при прием на високи дози
- повръщане
- нарушено храносмилане
- замаяност
- главоболие.

##### **Нечести нежелани реакции, които могат да се изявят при кръвните изследвания:**

- увеличение на някои вещества (*ензими*) произвеждани от черния дроб

##### **Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)**


- кожен обрив, който може да е на мехури и да изглежда като малки мишени (централни тъмни петна, заобиколени от по-бледа област, с тъмен пръстен около ръба - *еритема мултиформе*)  
Свържете се с лекар незабавно, ако забележите някои от тези симптоми.
- подуване и зачервяване по повърхността на вена, която е силно чувствителна при допир

##### **Редки нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвните Ви изследвания:**

- малък брой на клетките, участващи в съсирването на кръвта
- малък брой на белите кръвни клетки

##### **Други нежелани реакции**

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота





неизвестна.

- Алергични реакции (вж. по-горе)
- Възпаление на дебелото черво (вж. по-горе)
- Възпаление на защитната мембрана, покриваща мозъка (*асептичен менингит*)
- Сериозни кожни реакции:
  - широко разпространен обрив с мехури и белене на кожата, особено в областта на устата, носа и гениталиите (*синдром на Стивънс-Джонсън*), както и по-тежка форма, причиняваща обширно белене на кожата (повече от 30% от повърхността на тялото – *токсична епидермална некролиза*)
  - разпространен червен обрив на кожата с малки гнойни мехурчета (*булозен ексфолиативен дерматит*)
  - червен, люспест обрив с подутина под кожата и мехури (*екзантематозна пустулоза*).
  - грипopodobни симптоми с обрив, повишена температура, подуване на жлезите и резултати от кръвни тестове, които са извън референтните стойности (включително повишени нива на белите кръвни клетки (еозинофилия) и чернодробните ензими) (Лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)).

Обърнете се към лекар незабавно, ако получите някой от тези симптоми.

- възпаление на черния дроб (*хепатит*)
- жълтеница, причинена от увеличение на билирубин в кръвта (вещество, произвеждано в черния дроб), вследствие на което кожата и бялото на очите Ви могат да изглеждат жълти
- възпаление на бъбречните каналчета
- кръвта се съсирва по-дълго време
- гърчове (при хора, приемащи високи дози Амоксиклав или които имат бъбречни проблеми).

Нежелани реакции, които могат да се проявят при изследванията на кръвта или урината Ви:

- сериозно намаляване на броя на белите кръвни клетки
- малък брой на червените кръвни клетки (*хемолитична анемия*)
- кристали в урината.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Амоксиклав**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в картонената опаковка.

Приготвен разтвор:

Химичната и физична стабилност след приготвяне са демонстрирани за готовия разтвор инфузия за 60 минути, съхраняван при 25 °C.

От микробиологична гледна точка, освен ако метода на разтваряне изключва риск от микробно замърсяване, инфузионният разтвор трябва да бъде използван незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение на готовия разтвор са отговорност на ползвателя.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Амоксиклав**

- Всеки флакон съдържа 2000 mg амоксицилин (като натриева сол) и 200 mg клавуланова киселина (като калиева сол).
- Активните вещества са амоксицилин (като натриева сол) и клавуланова киселина (като калиева сол).
- Няма други съставки. Въпреки това, вижте точка 2 за допълнителна важна информация относно натрий и калий, съдържащи се в Амоксиклав.

### **Как изглежда Амоксиклав и какво съдържа опаковката**

#### **Флакони:**

Флакони с обем 20 ml от безцветно стъкло, тип II, със запушалка от халогенирана бутилова гума и алуминиева капачка тип „flip-off“;

Опаковки от 1, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 флакона

#### **Бутилки:**

Бутилки с обем 100 ml от безцветно стъкло тип II, с гумена запушалка от халогениран бутил и обвиваща алуминиева капачка тип „flip-off“.

Опаковки от 1, 5 и 10 бутилки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Sandoz d.d.

Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Словения

### **Производител**

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Австрия

**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП със следните имена:**

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Австрия:     | Curam Intravenös 2000mg/200mg - Pulver z. Herst. e. Infusionslösung |
| Белгия:      | Amoxiclav Sandoz 2000 mg/200 mg                                     |
| Германия:    | Amoxclav Hexal i.v. 2000/200mg                                      |
| Нидерландия: | Amoxicilline/Clavulaanzuur Sandoz 2000/200 i.v.                     |

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

MM/TTTT

**Следната информация е предназначена само за медицински специалисти:**

Амоксиклав 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор

амоксицилин/клавуланова киселина

**Следва откъс от Кратката характеристика на продукта (КХП) в помощ на предлагането на**





**Амоксиклав.** Предписващият лекар трябва да е запознат с КХП когато определя дали продуктът е подходящ за даден пациент.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Амоксиклав 2000 mg/200 mg трябва да се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 30 до 40 минути. Амоксицилин/клавуланова киселина не е подходящ за интрамускулно приложение.

## НЕСЪВМЕСТИМОСТИ С РАЗТВОРИТЕЛИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Амоксиклав 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор не трябва да се смесва с аминокиселинни разтвори, липидни емулсии, кръвни и глюкозни разтвори. Амоксиклав 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор е по-малко стабилен в инфузии, съдържащи декстран или бикарбонат. Следователно приготвеният разтвор не трябва да се добавя към подобни инфузионни разтвори, но може да се инжектира чрез капков метод за период от три до четири минути.

Поради инактивирането на аминогликозидите от амоксицилин трябва да се избягва смесването in-vitro.

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И РАБОТА

Разтворът трябва да се приготвя в асептични условия. Преди прилагане трябва да бъде проверен визуално за наличие на частици. Разтворът трябва да се използва само ако е бистър и без частици. Неизползваното количество от разтвора трябва да бъде изхвърлено. От микробиологична гледна точка, освен ако методът на разтваряне не изключва риск от микробно замърсяване, инфузионните разтвори трябва да се използват веднага. Ако разтворът не се използва веднага, отговорност за времето и условията на съхранението носи потребителят. Само за еднократно приложение

### Приготвяне на интравенозната инфузия:

Флаконите от 2000/200 mg се разреждат с 20 ml вода за инжекции или следните течности: физиологичен разтвор, натриев лактат 167 mmol/l, разтвор на Ringer, разтвор на Hartmann. Разреждането до готов за употреба разтвор за инфузия трябва да се направи на две стъпки, с цел да се достигне необходимия обем на разтвора за инфузия. Флаконът от 2000/200 mg се реконституира с една от съвместимите интравенозни течности в самия флакон. След това този разтвор се прехвърля в подходящ инфузионен сак, съдържащ същата съвместима течност, като тази използвана за началното реконституиране, с обем 100 ml.

Трябва да се спазват контролирани и потвърдено асептични условия.

Бутилките от 2000/200 mg се разреждат със 100 ml вода за инжекции или някоя от следните течности: физиологичен разтвор, натриев лактат 167 mmol/l, разтвор на Ringer, разтвор на Hartmann.

Ако продуктът се разрежда с вода за инжекции, както е посочено, разтворът може да се смесва със следните разтворители: вода за инжекции, физиологичен разтвор, натриев лактат 167 mmol/l, разтвор на Ringer, разтвор на Hartmann

| Флакони от     | Вода за инжекции | Обем след разтваряне * | Концентрация след разтваряне * |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2000 mg        | 20 ml            | 21,6 ml                | 92,6 mg/ml                     |
| 200 mg         | 20 ml            | 21,6 ml                | 9,3 mg/ml                      |
| 2000 mg/200 mg | 100 ml           | 100,9 ml               | 19,8/2,0 mg/ml                 |

\* данни въз основа на лабораторни проучвания



Разтворите за интравенозна инфузия трябва да се прилагат напълно в рамките на 60 минути от приготвянето им.

След разреждане във вода за инжекции може временно да се наблюдава розово оцветяване, след което разтворът бързо се избистря.

