

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Амиодарон Хамелн 50 mg/ml концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор  
Amiodaron Hameln 50 mg/ml concentrate for solution for injection/infusion

Амиодаронов хидрохлорид (Amiodarone hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Амиодарон Хамелн 50 mg/ml
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амиодарон Хамелн 50 mg/ml
3. Как да приемате Амиодарон Хамелн 50 mg/ml
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амиодарон Хамелн 50 mg/ml
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |                |
| Листовка - Приложение 2             |                |
| Към Рег. №                          | 20180278       |
| Разрешение №                        | DE/MS/MP-46410 |
| Одобрение №                         | п 5 -п7- 2019  |

### 1. Какво представлява Амиодарон Хамелн 50 mg/ml и за какво се използва

Амиодарон се използва за лечение на нарушения на сърдечния ритъм, наречени "аритмии". Амиодарон действа, като контролира Вашето сърце, ако то не бие нормално.

Амиодарон Хамелн 50 mg/ml се прилага само, когато е необходим бърз отговор или ако не сте в състояние да приемате таблетки.

Вашият лекар ще Ви даде лекарството и Вие ще бъдете под наблюдение в болница или от специалист.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амиодарон Хамелн 50 mg/ml

#### Не използвайте Амиодарон Хамелн 50 mg/ml:

- ако сте алергични към амиодарон, йод или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- при бавен сърдечен ритъм (синусова брадикардия) или заболяване, което причинява ритъмни нарушения (напр. сино-атриален блок, синдром на болния синусов възел).
- ако имате някакви други сърдечни проблеми и нямате пейсмейкър, например ако страдате от атриовентрикуларен блок (вид проводно нарушение).
- при нарушена функция на щитовидната жлеза. Вашият лекар трябва да изследва щитовидната жлеза, преди да Ви даде това лекарство.
- ако употребявате други лекарства, които могат да предизвикат нарушения на сърдечния ритъм (вижте също "Други лекарства и Амиодарон Хамелн 50 mg/ml").
- при преждевременно родени бебета, кърмачета или деца до 3 години.

#### Амиодарон Хамелн 50 mg/ml не трябва да се прилага:

- при бременност и кърмене (освен при животозастрашаващи обстоятелства).



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Вашият лекар внимателно и редовно трябва да следи Вашите ЕКГ и кръвно налягане, да проверява чернодробната и тиреоидната функция:

- ако имате слабо сърце или сърдечна недостатъчност.
- ако имате ниско кръвно налягане.
- ако имате проблеми с черния дроб.
- ако имате проблеми с белите дробове, включително астма.
- ако имате проблеми с щитовидната жлеза.

*Информирайте Вашия лекар, ако някои от горепосочените предупреждения се отнасят или са се отнасяли за Вас.*

### **Други лекарства и Амиодарон Хамелн 50 mg/ml**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е особено важно при следните лекарства, защото те могат да взаимодействат с амиодарон:

- Антиаритмици (напр. хинидин, прокаинамид, дизопирамид и соталол).
- Лекарства за подобряване на кръвоснабдяването на мозъка (напр. винкамин).
- Лекарства за психични заболявания (напр. султоприд, сулпирид, примозид) и някои видове лекарства, наричани фенотиазини (напр. тиоридазин).
- Лекарства, приемани при храносмилателни проблеми (напр. цизаприд).
- Лекарства за възпаления, антибиотици (напр. моксифлоксацин, еритромицин).
- Инжекционен пентамидин (използван при определени видове пневмония).
- Някои антидепресанти (напр. амитриптилин, кломипрамин, дозулепин, доксерпин, имипрамин, лофепрамин, нортриптилин, тримипрамин, мапротилин).
- Лекарства, приемани при сенна хрема, обриви и други алергии, наричани антихистамини (напр. терфенадин).
- Лекарства за малария (напр. халюфантрин).

### **Не се препоръчва**

Не се препоръчва да приемате следните лекарства едновременно с амиодарон:

- Лекарства за сърдечни заболявания и за понижаване на високо кръвно налягане, наричани бета-блокери (напр. пропранолол).
- Лекарства за стенокардия (гърдна ангина) или за понижаване на високо кръвно налягане, наричани калциеви антагонисти (напр. дилтиазем или верапамил).

### **Предпазливост**

Комбинирането на амиодарон със следните лекарства изисква повишено внимание. Те могат да причинят ниски нива на калций и така да повишат риска от сериозни ритъмни нарушения на сърцето.

- Стимулиращи лаксативи, очистителни – използвани при констипация (напр. бизакодил, сенна).
- Кортикостероиди – използвани при възпаления (напр. преднизолон).
- Тетракозактид – използван за изследване на някои хормонални проблеми.
- Диуретици (отводняващи), например фуросемид.
- Амфотерицин, интравенозно приложение – използван за лечение на гъбични инфекции.

Амиодарон може да увеличи ефекта на следните лекарства:

- Лекарства, използвани за разреждане на кръвта (напр. варфарин). Вашият лекар трябва да коригира дозировката и да следи отблизо лечението.
- Фенитоин – използван за лечение на припадъци.
- Дигоксин – използван при сърдечна недостатъчност. Вашият лекар трябва да следи лечението и може да коригира дозата дигоксин.



- Флекаинид – използван при ритъмни нарушения. Вашият лекар трябва да следи лечението и може да коригира дозата флекаинид.
- Лекарства за лечение на високия холестерол, наричани статини (напр. симвастатин или аторвастатин).
- Циклоспорин или такролимус – използват се за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи.
- Фентанил – използва се като болкоуспокояващо.
- Лидокаин – локален анестетик.
- Силденафил – използва се за лечение на проблеми с ерекцията.
- Мидазолам и триаолоам – използва се за успокояване, напр. преди медицинска процедура.
- Ерготамин – използва се за мигрени.

### **Операция**

Ако ви предстои хирургична интервенция, трябва да информирате Вашите лекуващи лекари, че приемате амиодарон.

### **Амиодарон Хамелн 50 mg/ml с храна и напитки**

Не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство. Това е така, защото пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате амиодарон, може да увеличи шанса Ви да получите нежелани реакции.

### **Бременност и кърмене**

Вашият лекар ще предпише Амиодарон Хамелн 50 mg/ml само ако счита, че ползата от лечението е по-голяма от рисковете по време на Вашата бременност. Амиодарон Хамелн 50 mg/ml може да се използва при бременност само при изключителни обстоятелства.

Не трябва да приемате Амиодарон Хамелн 50 mg/ml, ако кърмите. Ако приемате амиодарон по време на бременност или кърмене, трябва да спрете кърменето.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Амиодарон може да засегне вашата способност за шофиране или работа с машини. Не шофирайте и не работете с машини, ако сте засегнати. В такива случаи се посъветвайте с Вашия лекар.

### **Амиодарон Хамелн 50 mg/ml съдържа бензилов алкохол**

Това лекарство съдържа 22,2 mg бензилов алкохол на всеки ml. Той може да причини алергични реакции. Бензиловият алкохол се свързва с риск от тежки нежелани реакции, включително проблеми с дишането (наречено "синдром на задушаване") при малки деца. Да не се прилага при новородени (на възраст до 4 седмици), освен ако не е препоръчано от Вашия лекар. Да не се използва за повече от една седмица при малки деца (на възраст под 3 години), освен ако не е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.

Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет, ако имате заболяване на бъбреците или черния дроб, ако сте бременна или кърмите (Вижте точка 2 - Бременност и кърмене), защото големи количества бензилов алкохол могат да се натрупат в организма Ви и може да причинят нежелана реакция (наречена „метаболитна ацидоза“).

### **3. Как да приемате Амиодарон Хамелн 50 mg/ml**

Прилагането на Амиодарон е интравенозно, като инжекция или инфузия и се извършва само



болнична среда и под лекарско наблюдение.

### **Доза**

Дневната доза Амиодарон Хамелн 50 mg/ml зависи от Вашето състояние. Дозировката и времетраенето на лечението се определят от Вашия лекар, който ще ги адаптира специално за Вас.

Освен ако Вашият лекар не предпише друго, обичайната доза е 5 mg/kg телесно тегло. Вашето лекарство се инжектира в продължение поне на 3 минути.

### **Когато Амиодарон Хамелн 50 mg/ml се прилага като интравенозна инжекция:**

- не трябва да Ви бъде давана доза, по-висока от 5 mg/kg телесно тегло.
- дозата трябва да бъде приложена бавно в продължение поне на 3 минути (освен ако лекарството не се дава при реанимация).
- лекарят трябва да изчака поне 15 минути, преди да Ви направи още една инжекция.
- многократно или продължително прилагане може да причини възпаление на вената и реакции на мястото на инжектиране (кожата около него може да се усеща топла и чувствителна и може да има зачервяване) и в такива ситуации се препоръчва Вашият лекар да използва "централен венозен катетър".

### **Когато Амиодарон Хамелн 50 mg/ml се прилага като интравенозна инфузия:**

- трябва да Ви бъде дадена доза от 5 mg/kg телесно тегло, разредена в 250 ml глюкоза 5%.
- дозата следва да се приложи за период от 20 минути до 2 часа.
- дозировката може да се повтори 2-3 пъти на ден.

Повечето нежелани реакции при лечението възникват поради твърде висока доза Амиодарон Хамелн 50 mg/ml. Следователно трябва да получите най-ниската възможна доза Амиодарон Хамелн 50 mg/ml. Това ще сведе нежеланите реакции до минимум. Вижте също "Ако сте приели повече от необходимата доза Амиодарон Хамелн 50 mg/ml".

### **Възрастни**

Обичайната доза е 5 mg за всеки килограм от Вашето тегло, приложени за период от 20 минути до 2 часа.

Може да се даде допълнителна доза от 10 до 20 mg на килограм телесно тегло на всеки 24 часа, в зависимост от Вашето заболяване.

В спешен случай Вашият лекар може да приложи доза от 150 mg до 300 mg с бавно инжектиране в продължение на 3 минути.

Вашият лекар ще наблюдава реакцията Ви на Амиодарон Хамелн 50 mg/ml и съответно ще адаптира дозата.

### **Употреба при деца и юноши**


Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността при деца. Вашият лекар ще вземе решение за подходящата доза.

### **Пациенти в напреднала възраст**

Както при всички пациенти е важно да се използва минималната ефективна доза. Вашият лекар внимателно ще изчисли какво количество Амиодарон Хамелн 50 mg/ml следва да получите и ще следи отблизо Вашата сърдечна честота и функцията на щитовидната жлеза.

Вашият лекар ще назначи лечение с таблетки амиодарон възможно най-бързо.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Амиодарон Хамелн 50 mg/ml**  
Тъй като лечението се извършва в болнична среда под лекарски контрол, не е вероятно да получите твърде висока доза.



Но ако сте приели повече от препоръчителната доза, ще бъдете внимателно наблюдавани от Вашия лекар и при необходимост ще получите поддържаща терапия, ако е необходимо. Възможно е да получите следните реакции: да се чувствате зле, да Ви е зле, констипация или потене. Може да имате необичайно бавна сърдечна честота или бързо сърцебиене.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или друг медицински специалист.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Амиодарон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценяването на нежеланите реакции се основава на следната информация за тяхната честота:

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Много често</i>        | засягат повече от 1 на 10 пациенти                  |
| <i>Често</i>              | засягат от 1 до 10 на 100 пациенти                  |
| <i>Нечесто</i>            | засягат от 1 до 10 на 1000 пациенти                 |
| <i>Редки</i>              | засягат от 1 до 10 на 10 000 пациенти               |
| <i>Много редки</i>        | засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти            |
| <i>Неизвестна честота</i> | от наличните данни не може да бъде направена оценка |

Съобщени са следните нежелани реакции:

##### Много често:

- Замъглено зрение или виждане на цветни сияния в заслепяваща светлина

##### Често:

- Забавяне на сърдечния ритъм
- Спадане на кръвното налягане и ускорено сърцебиене. Тези нежелани реакции възникват веднага след инжектиране. Реакциите обикновено са умерени и временни. Те могат да бъдат много сериозни след предозиране или много бързо прилагане на Амиодарон Хамелн 50 mg/ml.
- На мястото на инжектиране са възможни:
  - Болка
  - Зачервяване на кожата или промяна в пигментацията
  - Локално увреждане на меките тъкани
  - Изтичане на течност
  - Подуване, причинено от течност в кожата
  - Възпаление (индикация за флебит)
  - Втвърдяване на мястото на инжектиране
  - Инфекция
- Треперене на пръстите на ръцете и на краката
- Сърбящ, зачервен обрив (екзема)

##### Нечесто:

- Усещане за схващане или отпадналост, усещане за изтръпване или горене в някоя част от тялото

##### Редки:

- Алергични реакции. Симптомите на такива реакции включват:
  - Тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите), придружено от сивкаво-синя итж



- лилава пигментация на кожата и склонност към кървене.
- Увреждания на кръвоносните съдове
- Бъбречни увреждания
- Помощното вещество бензилов алкохол може да причини реакции на свръхчувствителност.

#### Много редки:


- Усещане за прилошаване, объркване или слабост, дискомфорт (гадене), загуба на апетит, раздразнителност. Това може да е заболяване, наречено "Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (АДХ)".
- Главоболие
- Повишено вътречерепно налягане, съпътствано от главоболие, дискомфорт и повръщане
- Забавяне на сърдечния ритъм
- Възникване на ново ритмично нарушение или влошаване на съществуващите ритмични нарушения
- Нарушения на сърдечната проводимост
- Горещи вълни
- Затруднено дишане
- Увреждане на белите дробове
- Дискомфорт
- Аномалии на функцията на черния дроб
- Остри чернодробни нарушения
- Изпотяване
- Загуба на зрението на едното око или замъглено и безцветно зрение. Очите могат да се усещат възпалени или чувствителни и движението им да е болезнено. Това може да е заболяване, наречено "оптична невропатия или оптичен неврит".
- Анафилактичен (алергичен) шок. Симптомите за анафилактичен шок са:
  - Рязко падане на кръвното налягане
  - Бледост
  - Безпокойство
  - Слабо и ускорено сърцебиене
  - Влажна кожа
  - Замъглено съзнание

#### Не са известни:

- Хипертиреозидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза) – може да чувствате силно безпокойство или нервност, по-силно потене и загуба на тегло. Може да не издържате на висока температура. Информирайте Вашия лекар възможно най-бързо, ако имате някои от тези симптоми.
- Хипотиреозидизъм (понижена функция на щитовидната жлеза) – може да се чувствате много изморени, слаби или "изтощени" и да изпитате увеличаване на теглото, констипация и болки в мускулите. Може да не издържате на ниска температура (мръзнене, зиморничавост).
- Внезапно възпаление на панкреаса (панкреатит (остър)); объркване (делириум); животозастрашаващи кожни реакции, характеризиращи се с обриви, мехури, лющене на кожата и болка (токсична епидермална некролиза (TEN), синдром на Стивънс-Джонсън (SJS), булозен дерматит, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS).

#### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна Агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. Как да съхранявате Амиодарон Хамелн 50 mg/ml**

- Вашият лекар или фармацевт отговаря за съхранението на Амиодарон Хамелн 50 mg/ml, също както и за правилното изхвърляне на всяко неизползвано количество Амиодарон Хамелн 50 mg/ml.
- Да не се съхранява над 25°C. Да не се съхранява в хладилник или замразява. Съхранявайте ампулите в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
- Разреденият разтвор трябва да се използва незабавно.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте това лекарство след срока на годност (EXP:), който е посочен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър и съдържа частици, или опаковката е повредена.
- Само за еднократна употреба. Изхвърлете неизползвания разтвор.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Амиодарон Хамелн 50 mg/ml**

Активното вещество е амиодаронов хидрохлорид (amiodarone hydrochloride).

Всеки милилитър концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор съдържа 50 милиграма (mg) амиодаронов хидрохлорид, еквивалентен на 46,9 mg амиодарон.

1 ампула с 3 ml Амиодарон Хамелн 50 mg/ml съдържа 150 mg амиодаронов хидрохлорид.

Една ампула Амиодарон Хамелн 50 mg/ml, разредена съгласно препоръките в 250 ml глюкоза 5%, дава концентрация на амиодарон хидрохлорид от 0,6 mg/ml.

Другите съставки са: полисорбат 80 (E433), бензилов алкохол, вода за инжекции.

### **Как изглежда Амиодарон Хамелн 50 mg/ml и какво съдържа опаковката**

Прозрачен, бледожълт стерилен разтвор, практически без видими частици.

Размери на опаковката:

Амиодарон Хамелн 50 mg/ml се предлага в стъклени ампули от 5 ml, съдържащи 3 ml концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор в опаковки по 5 или 10 ампули.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба:

hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln

Германия

Производител:

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

03680 Martin

Словакия



hameln rds a.s.  
Horná 36  
90001 Modra  
Словакия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрия         | Amiodaron-hameln 50 mg/ml<br>Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung                                                           |
| Чешка република | Amiodaron Hameln                                                                                                                                    |
| България        | Амиодарон Хамелн 50 mg/ml концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор<br>Amiodaron Hameln 50 mg/ml concentrate for solution for injection/infusion |
| Великобритания  | Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml<br>Concentrate for Solution for Injection/Infusion                                                                |
| Германия        | Amiodaron-hameln 50 mg/ml<br>Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung                                                           |
| Дания           | Amiodaron Hameln                                                                                                                                    |
| Норвегия        | Amiodaron Hameln                                                                                                                                    |
| Полша           | Amiodaron Hameln                                                                                                                                    |
| Румъния         | Amiodaronă Hameln 50 mg/ml<br>concentrat pentru soluție injectabilă / perfuzabilă                                                                   |
| Словакия        | Amiodaron Hameln 50 mg/ml                                                                                                                           |
| Словения        | Amiodaron Hameln 50 mg/ml<br>koncentrat za raztopino za injiciranje/infundiranje                                                                    |
| Унгария         | Amiodaron Hameln 50 mg/ml                                                                                                                           |
| Финландия       | Amiodaron Hameln 50 mg/ml<br>injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten                                                                         |
| Холандия        | Amiodaron HCl Hameln 50 mg/ml                                                                                                                       |
| Хърватия        | Amiodaronklorid Hameln 50 mg/ml<br>koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju                                                                      |
| Швеция          | Amiodaron Hameln                                                                                                                                    |

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2019.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

#### УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА:

Амиодарон Хамелн 50 mg/ml концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор  
Amiodaron Hameln 50 mg/ml concentrate for solution for injection/infusion

- Прозрачен бледожълт стерилен разтвор, практически без видими частици.
- рН 3,5-4,5
- За интравенозна употреба

#### Несъвместимости

Амиодарон хидрохлорид е несъвместим с физиологичен разтвор и може да се прилага само в глюкоза 5% разтвор.

При наличието на амиодарон, използването на медицински изделия, съдържащи омекобавещи





вещества като ДЕНР (ди-2-етилхексиллов фталат) може да доведе до отделяне на ДЕНР в инжекционния разтвор. За да се намали излагането на пациента на ДЕНР, се препоръчва разтварянето на амиодарон да става с помощта на медицински изделия, които не съдържат ДЕНР, като полиолефини (полиетилен, полипропилен) или стъкло. Да не се смесва с други препарати в инфузионен разтвор.

Това лекарство не трябва да се смесва с други лекарства, освен посочените по-долу.

Преди употреба стерилният концентрат трябва да се провери визуално за прозрачност, наличие на частици, обезцветяване и цялост на опаковката. Разтворът може да се използва, ако е бистър и опаковката е неповредена.

### **Разреждане**

**Лекарството следва да се разреди с глюкоза 5%.**

За всяка ампула трябва да се използват максимално 250 ml глюкоза 5%. По-високите разреждания са нестабилни. Амиодарон, разреден в глюкоза 5% разтвор до концентрация  $< 0,6 \text{ mg/ml}$ , не е стабилен. Разтвори, съдържащи по-малко от 2 ампули Амиодарон Хамелн 50 mg/ml в 500 ml глюкоза 5%, са нестабилни и не трябва да се използват.

Разреждането трябва да се извърши при асептични условия. Преди приложение разтворът трябва да се провери визуално за наличие на частици и обезцветяване. Разтворът може да се използва само, ако е прозрачен и не съдържа частици.

### **Стабилност в разтвор**

Разреденият продукт е физически и химически стабилен за 24 часа при 25°C. Но от микробиологична гледна точка лекарството трябва да се използва незабавно след разреждане. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да са по-дълги от 24 часа при 2 до 8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

### **Съхранение**

Да не се съхранява над 25°C. Да не се съхранява в хладилник или замразява. Съхранявайте ампулите в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Само за еднократна употреба. Неизползваното лекарство или отпадъчните материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

