

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Амлодипин/Валсартан HCS 5 mg/320 mg филмирани таблетки
Амлодипин/Валсартан HCS 10 mg/320 mg филмирани таблетки
амлодипин/валсартан

Amlodipine/Valsartan HCS 5 mg/320 mg film-coated tablets
Amlodipine/Valsartan HCS 10 mg/320 mg film-coated tablets
amlodipine/valsartan

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го претостъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Амлодипин/Валсартан HCS и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амлодипин/Валсартан HCS
3. Как да приемате Амлодипин/Валсартан HCS
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амлодипин/Валсартан HCS
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Амлодипин/Валсартан HCS и за какво се използва

Амлодипин/Валсартан HCS се използва за лечение на повишено артериално налягане при възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно добре с прием само на амлодипин или валсартан.

Амлодипин/Валсартан HCS таблетки съдържат две вещества, наречени амлодипин и валсартан. И двете вещества спомагат за контрола на високото кръвно налягане.

- Амлодипин принадлежи към групата вещества, наречени "калциеви антагонисти". Амлодипин спира преминаването на калций през калциевите канали в стената на кръвоносните съдове, което предотвратява свиването на кръвоносните съдове.
- Валсартан принадлежи към групата вещества, наречени "ангиотензин-II рецепторни антагонисти". Ангиотензин II се произвежда от организма и предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното налягане. Валсартан действа чрез блокиране на ефекта на ангиотензин II.

Това означава, че и двете субстанции спомагат за спиране на свиването на кръвоносните съдове. В резултат на това кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Амлодипин/Валсартан HCS

Не приемайте Амлодипин/Валсартан HCS



- ако сте алергични към амлодипин или други блокери на калциевите канали. Това може да включва сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.
- ако сте алергични към валсартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако смятате, че сте алергични, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Амлодипин/Валсартан HCS.
- ако имате тежки чернодробни проблеми или проблеми с жлъчката, като билиарна цироза или холестаза.
- ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре да избягвате употребата на Амлодипин/Валсартан HCS през ранната бременност, вижте раздел „Бременност“).
- ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония).
- ако имате стеснение на аортната клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето не е в състояние да достави достатъчно кръв на тялото).
- ако имате сърдечна недостатъчност след инфаркт на миокарда.
- ако имате високи нива на захар в кръвта и страдате от диабет тип 2 диабет (наречен също неинсулинозависим захарен диабет) или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас, не приемайте Амлодипин/Валсартан HCS и се консултирайте с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Амлодипин/Валсартан HCS:

- ако сте били болни (повръщали сте или сте имали диария).
- ако имате чернодробни или бъбречни проблеми.
- ако сте претърпели бъбречна трансплантация или Ви е било казано, че имате стеснение на бъбречните артерии.
- ако имате заболяване, засягащо надбъбречната жлеза, наречено “първичен хипералдостеронизъм”.
- ако сте имали сърдечна недостатъчност или инфаркт. Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар за началната доза. Възможно е също така Вашият лекар да изследва бъбречната Ви функция.
- ако Вашият лекар Ви е казал, че имате стеснение на клапите на сърцето ви (наречено “аортна или митрална стеноза”) или, че дебелината на сърдечния мускул е увеличена над нормата (наречено “обструктивна хипертрофична кардиомиопатия”).
- ако сте имали оток, особено в областта на лицето или гърлото, докато сте приемали други лекарства (включително инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим). Ако развиете такива симптоми, спрете приема на Амлодипин/Валсартан HCS и се свържете незабавно с Вашия лекар. Не трябва никога повече да приемате Амлодипин/Валсартан HCS отново.
- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
 - АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.
 - алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Амлодипин/Валсартан HCS”.

Ако нещо от изброените по-горе се отнася за вас, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Амлодипин/Валсартан HCS.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Амлодипин/Валсартан HCS при деца и юноши (на възраст под 18 години).



Други лекарства и Амлодипин/Валсартан HCS

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да се наложи да спрете приема на едно от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, изброени по-долу:

- лекарства за понижаване на артериалното налягане, наречени АСЕ инхибитор или алискирен;
- диуретици (вид лекарства, наречени още “отводняващи таблетки”, които повишават количеството на отделената урина);
- литий (лекарство, използвано за лечение на някои видове депресия);
- калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий или други вещества, които могат да повишат стойностите на калий;
- някои видове болкоуспокояващи, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или селективни циклооксигеназа 2 инхибитори (COX-2 инхибитори). Вашият лекар може да провери бъбречната Ви функция;
- антиконвулсанти (напр. карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон);
- жълт кантарион;
- нитроглицерин и други нитрати или други вещества, наречени “вазодилатори”;
- лекарства, използвани при ХИВ/СПИН (напр. ритонавир, индинавир, нелфинавир);
- лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции (напр. кетоназол, итраконазол);
- антибиотици (лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции) като рифампицин, еритромицин, кларитромицин, талитромицин;
- верапамил, дилтиазем (лекарства за сърце);
- симвастатин (лекарство, използвано за контрол на високия холестерол);
- дантролен (инфузия при тежки аномалии в телесната температура);
- лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърляне на трансплантат (циклоспорин, такролимус);
- сиролимус, темсиролимус и еверолимус (лекарства, използвани за промяна на начина на функциониране на имунната система).

Амлодипин/Валсартан HCS с храна и напитки

Хората, които приемат Амлодипин/Валсартан HCS, не трябва да консумират грейпфрут или да пият сок от грейпфрут. Причината за това е, че грейпфрутът и сокът от грейпфрут могат да доведат до повишаване на плазмените нива на активното вещество амлодипин, което от своя страна може да доведе до непредвидимо засилване на антихипертензивния ефект на Амлодипин/Валсартан HCS.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременне (или е възможно да забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Амлодипин/Валсартан HCS преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да вземете друго лекарство вместо Амлодипин/Валсартан HCS.


Амлодипин/Валсартан HCS не се препоръчва през ранната бременност (първите 3 месеца) и не трябва да се приема при бременност след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Доказано е, че амлодипин преминава в кърмата в малки количества. Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Амлодипин/Валсартан HCS не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лекарство, ако имате желание да кърмите особено, ако бебето Ви е новородено или е родено през първата трета.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини



Това лекарство може да Ви накара да се чувствате замаяни. Това може да повлияе способността Ви за добра концентрация. Следователно, ако не сте сигурни как ще ви повлияе това лекарство, не шофирайте и не работете с машини, както и не извършвайте други дейности, изискващи концентрация.

Амлодипин/Валсартан HCS съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Амлодипин/Валсартан HCS

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. Това ще Ви помогне да постигнете най-добрите резултати и ще понижи риска от нежелани реакции.

Обичайната доза на Амлодипин/Валсартан HCS е една таблетка дневно.

- За предпочитане е да приемате таблетката по едно и също време всеки ден.
- Приемете таблетката през устата с чаша вода.
- Може да приемате Амлодипин/Валсартан HCS с или без храна. Не приемайте Амлодипин/Валсартан HCS заедно с грейпфрут или сок от грейпфрут.

В зависимост от това как се повлиявате от лечението, Вашият лекар може да предложи повишаване или понижаване на дозата. Не надвишавайте предписаната доза.

Амлодипин/Валсартан HCS и пациенти в старческа възраст (на 65 години и повече)
Вашият лекар трябва да внимава, когато Ви повишава дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амлодипин/Валсартан HCS

Ако сте приели прекалено много таблетки Амлодипин/Валсартан HCS, или ако някой друг е приел Вашите таблетки, консултирайте се с лекар незабавно.

Ако сте пропуснали да приемете Амлодипин/Валсартан HCS

Ако сте пропуснали да приемете това лекарство, приемете го веднага, когато се сетите. След това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако обаче почти е наближило времето за следващата доза, не приемайте дозата, която сте пропуснали. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Амлодипин/Валсартан HCS

Спирането на лечението с Амлодипин/Валсартан HCS може да доведе до влошаване на Вашето заболяване. Не спирайте да приемате Вашето лекарство, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и да изискват незабавна медицинска помощ:

Малко на брой пациенти са изпитали следните сериозни нежелани реакции (*могат да засегнат до 1 на 1 000 човека*). Ако настъпи **някоя** от следните нежелани лекарствени реакции, **информирайте Вашия лекар незабавно:**

Алергична реакция със симптоми като обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните и езика, затруднено дишане, ниско кръвно налягане (усещане за прималяване и световъртеж).

Други възможни нежелани реакции на Амлодипин/Валсартан HCS:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека): Грип; запушен нос, зачервено гърло и дискомфорт при преглъщане; главоболие; подуване на ръцете, дланите, краката, глезените или стъпалата; уморяемост; астения (слабост); зачервяване и усещане за затопляне на лицето и/или врата.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека): Замайност; гадене и болка в корема; сухота в устата; сънливост, тръпнене или мравучкане по дланите или ходилата; световъртеж; ускорена сърдечна дейност, включително сърцебиене; замаяност при изправяне; кашлица; диария; запек; кожен обрив, зачервяване на кожата; подуване на ставите, болки в гърба; болка в ставите.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека): Усещане за безпокойство; шум в ушите (тинитус); прималяване; отделяне на повече урина от нормалното или усещане на повече позиви за уриниране; невъзможност за получаване и поддържане на ерекцията; усещане за тежест; понижаване на кръвното налягане със симптоми като замаяност, прималяване, повишено изпотяване; кожни обриви по цялото тяло; сърбеж; мускулни спазми.

Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна, моля уведомете Вашия лекар.

Нежелани реакции, съобщавани при самостоятелно приложение на амлодипин или валсартан, които не се наблюдават при Амлодипин/Валсартан HCS, или се наблюдават с по-висока честота, отколкото при Амлодипин/Валсартан HCS:

Амлодипин

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно, ако получите някои от следващите много редки, но сериозни нежелани реакции след употребата на това лекарство:

- Внезапно хриптене, болка в гърдите, задух или затруднено дишане.
- Подуване на клепачите, лицето или устните.
- Подуване на езика и гърлото, което причинява затруднено дишане.
- Тежки кожни реакции, включително силен кожен обрив, уртикария, зачервяване на кожата на цялото тяло, силен сърбеж, мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза) или други алергични реакции.
- Инфаркт, абнормен сърдечен ритъм.
- Възпален панкреас, който може да причини силна коремна болка и болка в гърба, придружени от тежко неразположение.

Съобщавани са следните нежелани реакции. Ако някои от тях Ви причиняват проблеми или продължават повече от една седмица, трябва да се свържете с Вашия лекар.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека): Замаяност, сънливост; сърцебиене (усещане биенето на сърцето Ви); зачервяване на лицето, подуване на глезените (оток); коремна болка, неразположение (гадене).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека): Промени в настроението, тревожност, депресия, безсъние, тремор, промени във вкуса, прималяване, загуба на усещане за болка, зрителни нарушения, увреждане на зрението, звънене в ушите; ниско кръвно налягане; кихане/хрема, причинени от възпаление на лигавицата на носа (ринит); нарушено храносмилане, повръщане; косопад, усилено потене, кожен сърбеж, промяна в цвета на кожата,



нарушено уриниране, чести позиви за уриниране през нощта, увеличена честота на уриниране; невъзможност за получаване на ерекция; дискомфорт или нарастване на гърдите при мъжете, болка, общо неразположение, мускулна болка, мускулни крампи; увеличаване или намаляване на телесното тегло.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека): Обърканост.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека): Намален брой бели кръвни клетки, намален брой тромбоцити в кръвта, което може да доведе до необичайна поява на синини или лесно кървене (увреждане на червените кръвни клетки); повишена кръвна захар (хипергликемия); подуване на венците, подуване на корема (гастрит); нарушена чернодробна функция, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (жълтеница), повишение на чернодробните ензими, което може да повлияе някои лабораторни изследвания; повишено напрежение в мускулите; възпаление на кръвоносните съдове, често съпроводено с кожен обрив, чувствителност към светлина.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни): Треперене, вдървена стойка, подобен на маска израз на лицето (масковидно лице), забавени движения и влачене на краката, нестабилна походка.

Валсартан

С неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка на честотата):

Понижаване на броя на червените кръвни клетки, температура, възпалено гърло или образуване на язви в устата в резултат на инфекции; спонтанно кървене или получаване на синини; високи нива на калий в кръвта; отклонения в показателите при изследвания за чернодробната функция; намалена или силно намалена бъбречна функция; подуване, предимно в областта на лицето и гърлото; мускулна болка; обрив, виолетово-червени петна; температура; сърбеж; алергични реакции; образуване на мехури по кожата (признак на заболяване, наречено булозен дерматит).

Ако развиете нещо от това, моля информирайте Вашия лекар веднага.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Амлодипин/Валсартан HCS

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Амлодипин/Валсартан HCS

- Активните вещества са амлодипин (като амлодипинов безилат) и валсартан.
Амлодипин/Валсартан HCS 5 mg/320 mg филмирана таблетка
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg амлодипин като амлодипинов безилат (*amlodipine (as amlodipine besilate)*) и 320 mg валсартан (*valsartan*).
Амлодипин/Валсартан HCS 10 mg/320 mg филмирана таблетка
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg амлодипин като амлодипинов безилат (*amlodipine (as amlodipine besilate)*) и 320 mg валсартан (*valsartan*).
- Другите съставки са
 - *в ядрото на таблетката*: микрокристална целулоза (тип 200), магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, повидон K25, натриев лаурилсулфат, манитол и колоиден безводен силициев диоксид.
 - *във филмовото покритие*: поливинилов алкохол – частично хидролизиран, титанов диоксид (E171), макрогол 3 000, талк, жълт железен оксид (E172) и червен железен оксид (E172) - само в 5 mg/320 mg таблетки. Вижте точка 2 „Амлодипин/Валсартан HCS съдържа натрий“.

Как изглежда Амлодипин/Валсартан HCS и какво съдържа опаковката

Амлодипин/Валсартан HCS 5 mg/320 mg филмирани таблетки (таблетки):

Кафеви, двойноизпъкнали, продълговати филмирани таблетки (размери на таблетката: 16 mm x 8,5 mm, дебелина 5,5 mm – 7,5 mm).

Амлодипин/Валсартан HCS 10 mg/320 mg филмирани таблетки (таблетки):

Кафеникаво- жълти, двойноизпъкнали, продълговати филмирани таблетки (размери на таблетката, на които е възможно да има тъмни петна: 16 mm x 8,5 mm, дебелина: 5,8 mm – 7,8 mm).

Амлодипин/Валсартан HCS е наличен в опаковки:

- 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 и 100 филмирани таблетки в блистери.
- 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1 и 100 x 1 филмирана таблетки в перфорирани еднодозови блистери

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Производители

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия

KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Хърватия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

Страна-членка	Име на лекарствения продукт
Чешка Република	Amlodipine/Valsartan HCS
България	Амлодипин/Валсартан HCS 5 mg/320 mg филмирани таблетки Амлодипин/Валсартан HCS 10 mg/320 mg филмирани таблетки
Естония	Amlodipine/Valsartan HCS
Хърватия	Amlodipin/Valsartan HCS 5 mg/320 mg filmom obložene tablete



	Amlodipin/Valsartan HCS 10 mg/320 mg filmom obložene tablete
Латвия	Amlodipine/Valsartan HCS 5 mg/320 mg apvalkotās tabletes Amlodipine/Valsartan HCS 10 mg/320 mg apvalkotās tabletes
Полша	Amlodipine/Valsartan HCS
Румъния	Amlodipine/Valsartan HCS 5 mg/320 mg comprimate filmate Amlodipine/Valsartan HCS 10 mg/320 mg comprimate filmate
Словения	Amlodipin/valsartan HCS 5 mg/320 mg filmsko obložene tablete Amlodipin/valsartan HCS 10 mg/320 mg filmsko obložene tablete
Словакия	Amlodipin/Valsartan HCS 5 mg/320 mg filmom obalené tablety Amlodipin/Valsartan HCS 10 mg/320 mg filmom obalené tablety
Австрия	Amlodipine/Valsartan Krka 5 mg/320 mg Filmtabletten Amlodipine/Valsartan Krka 10 mg/320 mg Filmtabletten
Германия	Amlo-Valsacor 5 mg/320 mg Filmtabletten Amlo-Valsacor 10 mg/320 mg Filmtabletten

Дата на последно преразглеждане на листовката

