

Листовка: информация за пациента

Бозентан SDZ 125 mg филмирани таблетки

Bosentan SDZ 125 mg film-coated tablets
бозентан (*bosentan*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Бозентан SDZ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозентан SDZ
3. Как да приемате Бозентан SDZ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бозентан SDZ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
SDZ	
Към Рег. №	2016 0216
Разрешение №	- 62973 06-07-2023
BG/MA/MP	/
Одобрение №	/

1. Какво представлява Бозентан SDZ и за какво се използва

Бозентан SDZ таблетки съдържа бозентан, който блокира естествено срещащ се хормон, наречен ендотелин-1 (ЕТ-1), който причинява стесняване на кръвоносните съдове. Бозентан SDZ води до разширяване на кръвоносните съдове и принадлежи към група лекарства, наречени “ендотелин рецепторни антагонисти”.

Бозентан SDZ се използва за лечение на:

- **Белодробна артериална хипертония (БАХ):** БАХ е заболяване с тежко стесняване на кръвоносните съдове в белите дробове, водещо до високо кръвно налягане в кръвоносните съдове (белодробните артерии), които носят кръв от сърцето към белите дробове. Това налягане намалява количеството кислород, което може да влезе в кръвта към белите дробове, затруднявайки физическата активност. Бозентан SDZ разширява белодробните артерии, като по този начин улеснява сърцето да изтласква кръвта през тях. Това понижава кръвното налягане и облекчава симптомите.

Бозентан SDZ се използва за лечение на пациенти с белодробна артериална хипертония (БАХ) клас III за подобряване на капацитета за движение (способността за извършване на физическа активност) и симптомите. “Класът” отразява сериозността на болестта: “клас III” включва отчетливо ограничение на физическата активност. Наблюдавано е известно подобрене и при пациенти с БАХ клас II. “Клас II” включва леко ограничение на физическата активност. БАХ, за която е показан Бозентан SDZ, може да бъде:

- първична (без идентифицирана причина или фамилна);
- причинена от склеродермия (наречена още системна склероза, заболяване, при което има необичаен растеж на съединителната тъкан, поддържаща кожата и другите органи);
- причинена от конгенитални (вродени) сърдечни дефекти с шънтове (обикновено в леглото, пътища), причиняващи необичаен поток на кръвта през сърцето и белите дробове.



- **Дигитални язви** (рани по пръстите на ръцете и краката) при възрастни пациенти, страдащи от състояние, наричано склеродермия. Бозентан SDZ води до намаляване на броя на новопоявилите се язви по пръстите на ръцете и краката.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бозентан SDZ

Не приемайте Бозентан SDZ

- **ако сте алергични към бозентан** или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- **ако имате чернодробни проблеми** (посъветвайте се със своя лекар)
- **ако сте бременна или бихте могла да забременеете**, тъй като не използвате надеждни методи за контрацепция. Моля, прочетете информацията, озаглавена “Контрацептивни средства” и “Други лекарства и Бозентан SDZ”
- **ако приемате циклоспорин А** (лекарство, използвано след трансплантация на органи или за лечение на псориазис)

Ако някое от горните се отнася за Вас, кажете на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Бозентан SDZ.

Изследвания, които Вашият лекар ще Ви назначи преди лечението

- кръвни изследвания, с цел проверка на чернодробната Ви функция
- кръвни изследвания, за да се провери наличието на анемия (нисък хемоглобин)
- тест за бременност, ако сте жена с детероден потенциал

При някои пациенти, приемащи Бозентан SDZ, са установени отклонения в резултатите от изследванията на чернодробната функция и анемия (нисък хемоглобин).

Изследвания, които Вашият лекар ще Ви назначи по време на лечението

По време на лечението с Бозентан SDZ, Вашият лекар ще Ви назначава редовни кръвни изследвания за установяване на промени в чернодробната функция и нивото на хемоглобина.

Относно всички тестове, моля проверявайте Напомняща карта за пациента (вътре в опаковката на таблетките Бозентан SDZ). Важно е да провеждате тези редовни кръвни изследвания, докато приемате Бозентан SDZ. Съветваме Ви да записвате датата на Вашите последни изследвания, както и на следващите изследвания (попитайте Вашия лекар за датата) на Напомняща карта за пациента, за да си помогнете да не забравите кога трябва да направите следващите изследвания.

Кръвни изследвания на чернодробна функция

Тези изследвания ще се правят всеки месец, докато трае лечението с Бозентан SDZ. При повишаване на дозата ще се направи допълнително изследване след 2 седмици.

Кръвни изследвания за анемия

Тези изследвания ще се правят всеки месец през първите 4 месеца от лечението, след това на всеки 3 месеца, тъй като пациентите, приемащи Бозентан SDZ могат да развият анемия.

Ако тези резултати са извън нормалните граници, Вашият лекар може да реши да намали дозата Ви или да прекъсне лечението с Бозентан SDZ и ще направи допълнителни изследвания, за да установи причината.

Деца и юноши



Бозентан SDZ не се препоръчва при педиатрични пациенти със системна склероза и налична дигитална язвена болест. Бозентан SDZ не трябва да се използва при деца с телесно тегло под 31 kg с белодробна артериална хипертония. Вижте също точка 3. Как да приемате Бозентан SDZ.

Други лекарства и Бозентан SDZ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и лекарства без рецепта. Особено важно е да кажете на Вашия лекар, ако приемате:

- циклоспорин А (лекарство, използвано след трансплантация и за лечение на псориазис), което не трябва да се използва заедно с Бозентан SDZ;
- сиролимус или такролимус, които са лекарства, използвани след трансплантация, тъй като не се препоръчват за употреба заедно с Бозентан SDZ;
- глибенкламид (лекарство за лечение на диабет), рифампицин (лекарство за лечение на туберкулоза), флуконазол (лекарство против гъбични инфекции), кетоконазол (лекарство, използвано за лечение на синдром на Кушинг) или невирапин (лекарство за лечение на HIV), тъй като тези лекарства не се препоръчват за употреба заедно с Бозентан SDZ;
- други лекарства за лечение на HIV инфекция, които могат да налагат специално мониториране, ако се използват заедно с Бозентан SDZ;
- хормонални контрацептиви, които не са ефикасни като единствен метод за контрацепция, докато вземате Бозентан SDZ. Вътре в опаковката с таблетки Бозентан SDZ ще откриете Напомняща карта за пациента, която трябва внимателно да прочетете. Вашият лекар и/или гинеколог ще установи какъв метод за контрацепция е подходящ за вас.
- други лекарства за лечение на белодробна хипертония: силденафил и тадалафил
- варфарин (противосъсирващо средство)
- симвастатин (използван за лечение на повишени нива на холестерол в кръвта-хиперхолестеролемия)

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Жени в детеродна възраст


НЕ приемайте Бозентан SDZ, ако сте бременна или планирате бременност.

Тестове за бременност

Бозентан SDZ може да увреди неродените бебета, заченати преди започването или по време на лечението. Ако сте жена, която би могла да забременее, Вашият лекар ще Ви помоли да направите тест за бременност, преди да започнете да приемате Бозентан SDZ и редовно, докато приемате Бозентан SDZ.

Контрацептивни средства

Ако има вероятност да забременеете, използвайте надежден метод за контролиране на раждаемостта (контрацепция), докато приемате Бозентан SDZ. Вашият лекар или гинеколог ще Ви препоръча надеждни контрацептивни методи, докато приемате Бозентан SDZ. Тъй като Бозентан SDZ може да направи хормоналните контрацептиви (например перорални, инжекционни, имплантанти или пластири за кожата) неефективни, този метод сам по себе си не е надежден. Поради това, ако използвате хормонални контрацептиви, трябва заедно с това да прилагате и бариерен метод (например женски кондом, песар, контрацептивна гъбичка или Вашият партньор трябва да използва кондом). Вътре в опаковката с таблетки Бозентан SDZ ще откриете Напомняща карта за пациента, която трябва да попълните и да я занесете на Вашия лекар при следващото посещение, за да може Вашият лекар или гинеколог да прецени дали се нуждаете от допълнителни или алтернативни надеждни методи за контрацепция. Препоръчва се всеки месец да правите тест за бременност, докато приемате Бозентан SDZ и ако сте в детеродна възраст.



Уведомете веднага Вашия лекар, ако забременеете по време на приема на Бозентан SDZ или планирате да забременеете в близко бъдеще.

Кърмене

Уведомете веднага Вашия лекар, ако кърмите. Препоръчва се да прекратите кърменето, ако Ви бъде предписан Бозентан SDZ, тъй като не е известно дали това лекарство преминава в млякото на жените, които го приемат.

Фертилитет

Ако сте мъж и приемате Бозентан SDZ, възможно е това лекарство да намали броя на Вашите сперматозоиди. Не може да се изключи, че това може да се отрази на способността Ви да имате деца. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси или притеснения във връзка с това.

Шофиране и работа с машини

Бозентан SDZ няма или има пренебрежимо малко влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, Бозентан SDZ може да причини хипотония (понижаване на кръвното Ви налягане), от което можете да се почувствате замаяни, да окаже влияние върху зрението Ви и да окаже влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Ако се чувствате замаяни или зрението Ви е замъглено, докато приемате Бозентан SDZ, не шофирайте и не работете с инструменти или машини.

Бозентан съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на филмирана таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Бозентан SDZ

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението с Бозентан SDZ трябва да се започва и наблюдава само от лекар с опит в лечението на БАХ или системна склероза.

Препоръчителна доза

Възрастни

При възрастни, обикновено лечението започва с 62,5 mg два пъти дневно (сутрин и вечер), през първите 4 седмици, а след това обикновено лекарят ще Ви посъветва да приемате по една таблетка от 125 mg два пъти дневно, в зависимост от това как реагирате на Бозентан SDZ.

Деца и юноши

Препоръката за дозировка при деца е само за БАХ. При деца на възраст 1 година и повече, лечението с Бозентан SDZ обикновено започва с 2 mg на килограм телесно тегло два пъти дневно (сутрин и вечер). Въпреки това, някои дози бозентан не са възможни при деца с телесно тегло под 31 kg. Вашият лекар ще Ви даде съвет относно дозата Ви.

Обърнете внимание, че бозентан се предлага и под формата на разтворима таблетка от 32 mg, която може да улесни правилното дозиране за деца и пациенти с ниско телесно тегло или за такива, за които е трудно да преглъщат филмираните таблетки.

Ако имате впечатлението, че ефектът на Бозентан SDZ е доста силен или доста слаб, говорете с Вашия лекар, за да се установи дали дозите Ви трябва да бъдат променени.

Как да приемате Бозентан SDZ

Таблетките трябва да се приемат (сутрин и вечер) с вода. Таблетките могат да се приемат с или без храна.



Ако сте приели повече от необходимата доза Бозентан SDZ

Ако приемете повече таблетки, отколкото Ви е било казано, незабавно се свържете със своя лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Бозентан SDZ

Ако забравите да приемете Бозентан SDZ, вземете дозата веднага, когато се сетите, след това продължете да приемате таблетките в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Бозентан SDZ

Внезапното спиране на лечението с Бозентан SDZ може да доведе до влошаване на Вашите симптоми. Не спирайте приема на Бозентан SDZ, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Вашият лекар може да Ви назначи намаляване на дозата за няколко дни, преди пълното спиране на лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-сериозните нежелани реакции на Бозентан SDZ са

- Абнормни чернодробни функции, които могат да засегнат повече от 1 на 10 души
- Анемия (ниска стойност на хемоглобин в кръвта), която може да засегне до 1 на 10 души.

Анемията може понякога да налага кръвопреливане

Вашите чернодробни и кръвни стойности ще се наблюдават по време на лечението с Бозентан SDZ (вж. точка 2). Важно е да правите тези изследвания според препоръките на Вашия лекар.

Признаците, че черният дроб може би не работи правилно, включват:

- гадене
- повръщане
- треска (висока температура)
- болка в стомаха (корема)
- жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)
- тъмно оцветяване на урината
- сърбеж на кожата
- летаргия или прекомерна умора (необичайна умора или изтощение)
- грипоподобен синдром (ставни и мускулни болки с температура)

Ако забележите някои от тези признаци, **кажете незабавно на Вашия лекар**

Други нежелани реакции

Много чести (могат да засегнат повече от един на 10 души):

- главоболие
- оток (подуване на краката и глезените или други признаци за задръжка на течности)

Чести (могат да засегнат до един на 10 души):

- зачервен вид или зачервяване на кожата
- реакции на свръхчувствителност (включват възпаление на кожата, сърбеж и обрив)
- гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на киселини)
- разстройство (диария)
- синкоп (припадък)
- палпитации (бързо или нередовно сърцебиене)



- ниско кръвно налягане
- запушен нос

Нечести (могат да засегнат до един на 100 души):

- тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити)
- неутропения/левкопения (нисък брой бели кръвни клетки)
- повишени резултати от изследвания на чернодробната функция с хепатит (възпаление на черния дроб), включително възможно обостряне на подлежащ хепатит и/или жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)

Редки (могат да засегнат до един на 1 000 души):

- анафилаксия (обща алергична реакция), ангионевротичен оток (оток, най-често около очите, устните, езика или гърлото)
- цироза (увреждане на тъканта) на черния дроб, чернодробна недостатъчност (сериозни нарушения на чернодробната функция)

Съобщава се също за замъглено зрение с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции, съобщени при деца, лекувани с Бозентан SDZ, са същите като тези при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бозентан SDZ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бозентан SDZ

Активното вещество е бозентан (като монохидрат).

Всяка таблетка съдържа 125 mg бозентан (съответстващ на 129,082 mg бозентанов монохидрат).



Другите съставки в ядрото на една таблетка са царевично нишесте, прежелатинизирано царевично нишесте, натриев нишестен гликолат тип А, повидон К-30, полуксамер 188, силициев диоксид колоиден безводен, глицеролов дибехенат и магнезиев стеарат.

Филмовото покритие съдържа Опадри оранжево 21K23007 (съдържащ хипромелоза, титанов диоксид (E171), етилцелулоза, триацетин (E1518), талк (E553b), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), черен железен оксид (E172)).

Как изглежда Бозентан SDZ и какво съдържа опаковката

Бозентан SDZ 125 mg филмирани таблетки са светло оранжеви, елипсовидни, двойноизпъкнали филмирани таблетки с размери 11x5 mm.

Филмираните таблетки са опаковани в PVC/ PVDC/алуминий и поставени в картонена опаковка

Видове опаковки:

14, 56 или 112 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Sandoz d.d.
Verovskova 57,
1000 Ljubljana
Словения

Производител:

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Словения

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Германия

Това лекарство е одобрено в страните-членки на Европейското Икономическо Пространство със следните наименования:

Нидерландия	Bosentan Sandoz 62,5 mg, filmomhulde tabletten Bosentan Sandoz 125 mg, filmomhulde tabletten
Австрия	Bosentan Sandoz 62.5 mg, Filmtabletten Bosentan Sandoz 125 mg, Filmtabletten
Белгия	Bosentan Sandoz 62,5 mg, filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés/Filmtabletten Bosentan Sandoz 125 mg, filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés/Filmtabletten



България	Бозентан SDZ 125 mg филмирана таблетка
Чешка република	Bosentan Ebewe Bosentan Ebewe
Германия	Bosentan HEXAL 62.5 mg, Filmtabletten Bosentan HEXAL 125 mg, Filmtabletten
Испания	Bosentan Bosentán Sandoz Farmacéutica 62.5 mg, comprimidos recubiertos con película EFG Bosentan Bosentán Sandoz Farmacéutica 125 mg, comprimidos recubiertos con película EFG
Финландия	BOSENTAN SANDOZ 62.5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen BOSENTAN SANDOZ 125 mg, tabletti, kalvopäällysteinen
Франция	BOSENTAN SANDOZ 62.5 mg, comprimé pelliculé BOSENTAN SANDOZ 125 mg, comprimé pelliculé
Италия	Bosentan Sandoz Bosentan Sandoz
Латвия	Bosentan Welding 62.5 mg, apvalkotās tabletes Bosentan Welding 125 mg, apvalkotās tabletes
Норвегия	Bosentan Sandoz 62.5 mg, tablett, filmdrasjert Bosentan Sandoz 125 mg, tablett, filmdrasjert
Полша	Bosentan Sandoz GmbH, 62,5 mg, tabletki powlekane Bosentan Sandoz GmbH, 125 mg, tabletki powlekane
Португалия	Bosentano Sandoz Bosentano Sandoz
Румъния	Bosentan Sandoz 62.5 mg, comprimate filmate Bosentan Sandoz 125 mg, comprimate filmate
Швеция	Bosentan Sandoz 62.5 mg, filmdragerad tablett Bosentan Sandoz 125 mg, filmdragerad tablett
Словакия	Bosentan Sandoz 62.5 mg Bosentan Sandoz 125 mg

Дата на последно преразглеждане на листовката
ММ/ГГГГ



НАПОМНЯЩА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТА

Важна информация за безопасност при пациенти, приемащи Бозентан SDZ.

Тази карта съдържа важна информация за Бозентан SDZ. Моля, прочетете информацията внимателно, преди да започнете лечение с Бозентан SDZ .

Вашето име: _____

Лекуващ лекар: _____

Ако имате въпроси, свързани с Бозентан SDZ, попитайте Вашия лекар.

Прочетете тази страница внимателно, ако сте пациентка в детеродна възраст

Бременност

Лечението с бозентан може да причини увреждане на плода. Затова, не трябва да приемате Бозентан SDZ ако сте бременна, и не трябва да забременявате по време на лечението с Бозентан SDZ.

Освен това, ако страдате от белодробна хипертония, настъпването на бременност може да доведе до тежко влошаване на симптомите на заболяването. Ако подозирате, че сте бременна, уведомете Вашия личен лекар или гинеколог.

Предпазване от забременяване

Хормоналните средства за контрол на забременяването, като перорални противозачатъчни средства или контрацептивни хапчета, хормонални инжекции, противозачатъчни импланти или кожни пластири, не осигуряват надеждно предпазване от забременяване при жени, приемащи Бозентан SDZ.

За целта, освен някои от посочените хормонални средства, трябва да използвате бариерен противозачатъчен метод – презерватив, диафрагма или контрацептивна гъбичка. Обсъдете с Вашия лекуващ лекар или гинеколог всички свои въпроси на тази тема – отбележете отговорите на въпросите, посочени на гърба на тази карта, и я носете със себе си при следващото посещение при Вашия личен лекар или гинеколог.

Преди да започнете да приемате Бозентан SDZ и всеки месец по време на лечението, трябва да правите тест за бременност, дори да смятате, че не сте бременна.

Дата на първия ежемесечен тест: _____

Предпазване от бременност

В момента използвате/ приемате ли противозачатъчни средства?

☐ Да ☐ Не

Ако отговорът е „Да“, посочете наименованията им:

Носете тази карта със себе си при следващото посещение при Вашия личен лекар или гинеколог, за да може той/тя да Ви посъветва, ако се нуждаете от допълнителни или други противозачатъчни мерки.



Кръвни изследвания на чернодробната функция

При някои пациенти, приемащи бозентан, са наблюдавани отклонения в резултатите от чернодробните изследвания. По време на лечението с Бозентан SDZ, Вашият лекар ще Ви назначи редовни кръвни изследвания за проверка на настъпили промени в чернодробната функция.

Помнете, че трябва да преминавате чернодробните изследвания всеки месец.

При повишаване на дозата, 2 седмици по-късно ще бъде направено допълнително изследване.

Дата на първото ежемесечно изследване: _____

Вашият месечен график за кръвни чернодробни изследвания:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Януари | ☐ Май | ☐ Септември |
| ☐ Февруари | ☐ Юни | ☐ Октомври |
| ☐ Март | ☐ Юли | ☐ Ноември |
| ☐ Април | ☐ Август | ☐ Декември |

