

Листовка: информация за пациента
Алпразолам Гриндекс 0,25 mg таблетки
Алпразолам Гриндекс 0,5 таблетки
Алпразолам Гриндекс 1 mg таблетки
алпразолам

Alprazolam Grindeks 0.25 mg tablets
Alprazolam Grindeks 0.5 mg tablets
Alprazolam Grindeks 1 mg tablets

alprazolam

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 20270239/40/41

Разрешение № BG/МА/МР - 66286-8, 15-08-2024

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Алпразолам Гриндекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Алпразолам Гриндекс
3. Как да приемате Алпразолам Гриндекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алпразолам Гриндекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Алпразолам Гриндекс и за какво се използва


Алпразолам Гриндекс е седативно средство и принадлежи към групата на бензодиазепините.

Алпразолам Гриндекс се използва при възрастни за лечение на симптоми на тревожност, които са тежки, инвалидизиращи или причиняват на пациента силен дистрес. Това лекарство е предназначено само за краткосрочна употреба.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Алпразолам Гриндекс

Не приемайте Алпразолам Гриндекс:

- ако сте алергични към алпразолам, други бензодиазепини или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от заболяване, наречено „миастения гравис“, при което имате слаби и уморени мускули;
- ако имате тежки проблеми с гръдния кош или затруднено дишане (например хроничен бронхит или емфизем);
- ако имате „сънна апнея“ - това е състояние, при което дишането Ви става нередовно, дори спира за кратки периоди, докато спите;
- ако имате тежки чернодробни проблеми.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Алпразолам Гриндекс:

- ако злоупотребявате или сте злоупотребявали с алкохол, наркотици или лекарства;
- ако сте приемали алпразолам дълго време, тъй като ефектът може да намалее;
- ако имате влошено общо състояние;
- ако имате проблеми с белите дробове, бъбреците или черния дроб;
- ако приемате други лекарства за лечение на психични заболявания.

Зависимост

Употребата на Алпразолам Гриндекс може да доведе до физическа и психическа зависимост от лекарството.

Рискът от зависимост се увеличава в зависимост от дозата и продължителността на лечението. Поради това продължителността на лечението трябва да бъде възможно най-кратка. Спазвайте препоръките на Вашия лекар относно дозата (вж. точка 3). Забелязвате, че имате психическа зависимост, щом не искате да спрете приема на лекарството. Физическата зависимост означава, че се появяват симптоми на отнемане, когато лечението с това лекарство се спре внезапно.

Рискът е по-голям и при пациенти, които злоупотребяват или са злоупотребявали с алкохол или лекарства (вж. също точка 3. „Ако спрете приема на Алпразолам Гриндекс“). Злоупотребата с лекарства е известен риск при употребата на Алпразолам Гриндекс. Ако с това лекарство се злоупотребява, това може да доведе до предозиране и смърт. Винаги спазвайте препоръките за дозата, дадени от Вашия лекар. Това лекарство може да бъде потърсено от хора, които злоупотребяват с лекарства, отпускани по лекарско предписание, и трябва да се съхранява на недостъпно за други хора място.

Нарушение на паметта

По време на лечението с алпразолам паметта Ви може да бъде нарушена. Това обикновено се случва няколко часа след приема на лекарството. Моля, попитайте Вашия лекар, ако забележите такъв симптом. За да намалите риска, трябва да се уверите, че можете да имате пълноценен сън (7 до 8 часа), докато приемате това лекарство.

Психично заболяване (психоза)

Ако страдате от психоза, тежко психично заболяване, което нарушава Вашето поведение, действия и самоконтрол, то Алпразолам Гриндекс не е подходящо.

Въздействие върху настроението

Употребата на алпразолам може да повиши риска от епизоди на хипомания (по-лека форма на мания) и мания (хиперактивно психично състояние, прекомерна приповдигнатост и енергия) при пациенти с депресия. Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако развиете признаци на хипомания или мания.


Депресия, мисли за нараняване или самоубийство

Лечението с алпразолам може да повиши риска от поява на мисли за нараняване или самоубийство, ако имате депресия. Моля, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с алпразолам.

Ако лечението с алпразолам е необходимо и ако сте депресирани или преди сте имали мисли за самонараняване или самоубийство, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно. Ако по което и да е време се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или **незабавно** отидете в болница.

Хора в старческа възраст

Бъдете особено внимателни при употребата на алпразолам, ако сте в старческа възраст, тъй като той може да предизвика повишена умора и/или мускулна слабост, които могат да увеличат риска от падане.



Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши на възраст под 18 години, тъй като безопасността и ефикасността му не са установени.

Други лекарства и Алпразолам Гриндекс

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ефектът от лечението може да бъде повлиян, ако Алпразолам Гриндекс се използва заедно с други лекарства за лечение на изброените състояния. Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата Ви.

- психични проблеми (антипсихотични лекарства, включително клозапин);
- нарушения на съня (сънотворни таблетки);
- алергии или сенна хрема (някои антихистамини);
- ако сте подложени на голяма операция (анестетици);
- силна болка (наркотични аналгетици, напр. декстропропоксифен);
- терапия срещу наркотична зависимост (субституиращо лечение);
- проблеми като тревожност или депресия, включително някои антидепресанти, съдържащи флуоксетин, флувоксамин, нефазодон или имипрамин;
- сърдечна недостатъчност (дигоксин);
- инфекции (антибиотици, съдържащи еритромицин, кларитромицин или телитромицин);
- гъбични инфекции (итраконазол, флуконазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол);
- лекарства за лечение на ангина пекторис и високо кръвно налягане, като дилтиазем;
- ХИВ и СПИН (наречени HIV-протеазни инхибитори, като ритонавир);
- киселини в стомаха и стомашна язва, като циметидин или омепразол;
- астма и бронхит, като теофилин;
- епилепсия, например карбамазепин;
- лекарства за отпускане на мускулите. При съвместна употреба с алпразолам може да се наблюдава засилване на мускулно релаксиращия ефект и риск от падане.

Едновременната употреба на Алпразолам Гриндекс и опиоиди (силни болкоуспокояващи, лекарства за субституираща терапия и някои средства за лечение на кашлица) увеличава риска от сънливост, затруднено дишане (респираторна депресия), кома и може да бъде животозастрашаваща. Поради това едновременната употреба трябва да се обмисля само когато не са възможни други варианти на лечение.

Въпреки това, ако Вашият лекар все пак предпише Алпразолам Гриндекс заедно с опиоиди, дозата и продължителността на съпътстващото лечение трябва да бъдат ограничени от Вашия лекар.

Моля, информирайте Вашия лекар за всички опиоидни лекарства, които приемате, и следвайте стриктно препоръчаната от Вашия лекар доза. Би могло да е полезно да информирате приятели или роднини, за да са наясно с посочените по-горе признаци и симптоми. Свържете се с Вашия лекар, когато изпитвате такива симптоми.

Възможно е ефектът от лечението с алпразолам да бъде повлиян и от едновременното лечение с някое от следните лекарства: хапче против забременяване, рифампицин (за инфекции) или жълт кантарион (билково лекарство).

Алпразолам Гриндекс и алкохол

Трябва да се въздържате от алкохол по време на лечението с Алпразолам Гриндекс, тъй като алкохолът може да промени и засили ефекта на Алпразолам Гриндекс по непредсказуем начин.



Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Бременност

Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Наблюденията при хора са показали, че алпразолам може да бъде вреден за плода (повишен риск от малформации (цепнатина на небцето)). По време на бременност алпразолам може да се използва само ако лекарят е преценил, че ползите от лечението надвишават риска за нероденото дете и че лекарството е подходящо за Вас.

Ако използвате Алпразолам Гриндекс до раждането, информирайте Вашия лекар, тъй като новороденото Ви бебе може да развие симптоми на отнемане след раждането.

Кърмене

Алпразолам Гриндекс не трябва да се приема, ако кърмите. Алпразолам преминава в кърмата. Ако Вашият лекар е решил, че трябва да приемате това лекарство, ще трябва да спрете кърменето.

Шофиране и работа с машини

Дори когато се използва според указанията, Алпразолам Гриндекс може да промени уменията за реагиране до такава степен, че способността за шофиране или работа с машини да бъде нарушена. Този риск е особено висок в началото на лечението, при всяко повишаване на дозата, ако не спите достатъчно или ако също така консумирате алкохол или приемате други вещества, които действат върху централната нервна система. Поради това трябва напълно да се въздържате от шофиране, използване на машини или извършване на други опасни дейности или поне през първите няколко дни от лечението. Решението във всеки отделен случай се взема от лекуващия лекар.

Алпразолам Гриндекс съдържа лактоза, натрий и натриев бензоат (E211)

Лактоза: Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Натрий: Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Натриев бензоат: Това лекарство съдържа 0,12 mg натриев бензоат във всяка таблетка.

3. Как да приемате Алпразолам Гриндекс

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Освен ако лекарят не е предписал друго, се прилагат следните указания за дозиране


Начална доза: по принцип дозата в началото на лечението е 0,25 до 0,5 mg алпразолам три пъти дневно.

Поддържаща доза: ако е клинично необходимо, Вашият лекар може да увеличи дозата до 3 mg до 4 mg на малки стъпки, разделени на няколко отделни дози.

Пациенти в старческа възраст, чувствителни пациенти или изтощени пациенти

Ако сте по-възрастен и чувствителен пациент и се нуждаете от по-ниска доза, обикновено ще започнете с доза от 0,25 mg два до три пъти дневно. Тази доза може да бъде бавно увеличавана, ако е необходимо и ако не получите никакви нежелани реакции.

Пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми



Ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб, Вашият лекар ще коригира дозата Ви.

Употреба при деца и юноши

Деца и юноши под 18-годишна възраст не трябва да приемат Алпразолам Гриндекс.

Начин на приложение

Алпразолам Гриндекс е предназначен за перорална употреба. Приемайте таблетките с малко течност (например, половин чаша вода).

Таблетките са с делителна черта и могат да се разделят на равни дози.

Продължителност на лечението

Рискът от зависимост и злоупотреба може да се увеличи с дозата и продължителността на лечението. Затова лекарят ще предпише възможно най-ниската ефективна доза и продължителност на лечението и често ще преценява необходимостта от продължаване на лечението.

Максималната продължителност на лечението не трябва да бъде повече от 2-4 седмици. Не се препоръчва продължително лечение. Може да се получи намален ефект на лекарството, ако се използва повече от няколко седмици.

Ако приемате повече от необходимата доза Алпразолам Гриндекс

Ако сте приели твърде много Алпразолам Гриндекс, незабавно се свържете с Вашия лекар или с местната болница.

Признаци на (леко) предозиране могат да бъдат сънливост, замаяност, зрителни нарушения, неясен говор, понижаване на кръвното налягане, нестабилна походка/движения и мускулна слабост. В случаи на тежка интоксикация може да се появи дълбок сън и дори безсъзнание, нарушено дишане и циркулаторен колапс. Наблюдението в интензивното отделение е от съществено значение.

Оценката на степента на интоксикация трябва да бъде направена от лекаря, който ще вземе решение за мерките за лечението ѝ.

Ако сте пропуснали да приемете Алпразолам Гриндекс

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате забравената доза. Ако забравите да приемете дозата си, пропуснете забравената доза и продължете приема на Алпразолам Гриндекс, както е предписано от лекаря.

Ако сте спрели приема на Алпразолам Гриндекс

Винаги говорете с Вашия лекар, преди да спрете приема на Алпразолам Гриндекс, тъй като дозата трябва да се намалява постепенно. Ако спрете да приемате таблетките или намалите дозата внезапно, може да получите ефекти на „отскок“, който може да доведе до временно повишаване на тревожността или неспокойствието Ви или до затруднения със съня. При някои хора може да се появят и ефекти на „отнемане“ (вж. точка 4. „Зависимост и симптоми на отнемане“). Тези симптоми ще изчезнат, когато организъмът Ви се адаптира отново. Ако се притеснявате, Вашият лекар може да Ви каже повече за това. Следователно Вашият лекар ще намали дозата постепенно, когато лечението приключи. Намаляването на дозата се извършва в зависимост от индивидуалните нужди, тъй като постепенното прекратяване на лечението зависи от няколко фактора (например, продължителността на лечението и Вашата дневна доза). Попитайте Вашия лекар за това как да намалите дозата си постепенно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Причини за незабавно посещение при Вашия лекар

Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се обърнете към Вашия лекар, тъй като лечението трябва да бъде прекратено. След това Вашият лекар ще Ви посъветва как да бъде спряно лечението.

- Лечението с алпразолам може да предизвика сериозни поведенчески или психиатрични ефекти - например възбуда, безпокойство, агресивност, раздразнителност, силен гняв, лъжливи убеждения, кошмари и халюцинации или друго неподходящо поведение.
- Внезапна хриптене, затруднено преглъщане или дишане, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено засягащи цялото тяло).

Причини да посетите Вашия лекар възможно най-скоро

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите следните симптоми, тъй като може да се наложи промяна на дозата или лечението Ви:

- Загуба на паметта (амнезия).
- Пожълтяване на кожата и бялото на очите (жълтеница).

Зависимост и симптоми на отнемане

Възможно е да станете зависими от лекарства като алпразолам, докато ги приемате, което увеличава вероятността да получите симптоми на отнемане, когато спрете лечението.

Симптомите на отнемане са по-често срещани, ако Вие:

- спрете лечението внезапно;
- сте приемали високи дози;
- сте приемали това лекарство дълго време;
- имате анамнеза за злоупотреба с алкохол или наркотици.

Това може да доведе до ефекти като главоболие, мускулни болки, силна тревожност, напрежение, безпокойство, объркване, промени в настроението, затруднен сън и раздразнителност.

При тежки случаи на абстиненция може да получите и следните симптоми: гадене (чувство, че Ви се повдига), повръщане, изпотяване, стомашни спазми, мускулни крампи, чувство за нереалност или откъснатост, необичайна чувствителност към звук, светлина или физически контакт, изтръпване и мравучкане на краката и ръцете, халюцинации (виждате или чувате неща, които не съществуват, докато сте в будно състояние), треперене или епилептични пристъпи. Моля, уведомете Вашия лекар, ако някой от симптомите на отнемане се влоши или не изчезне.

Други нежелани реакции, които могат да се появят, са:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души

- Депресия;
- Сънливост и замаяност;
- Отривисти, неkoordinирани движения;
- Невъзможност за запомняне на части информация;
- Неясен говор;
- Замайване, лесна уморяемост;
- Главоболие;
- Запек;
- Сухота в устата;
- Умора;



- Раздразнителност.

Чести: може да засегне до 1 на 10 души

- Загуба на апетит;
- Объркване и дезориентация;
- Промени в сексуалното Ви желание (мъже и жени);
- Нервност или чувство на тревожност или възбуда;
- Безсъние (невъзможност за заспиване или нарушен сън);
- Проблеми с равновесието и нестабилност (подобна на усещането за пиянство), особено през деня;
- Загуба на бдителност или концентрация;
- Невъзможност да останете будни, усещане за отпадналост;
- Разтреперване или треперене;
- Двойно или замъглено зрение;
- Чувство на отпадналост;
- Кожни реакции;
- Промени в телото Ви.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

- Чувство на приповдигнатост или превъзбуда, което води до необичайно поведение;
- Халюцинации (виждане или чуване на несъществуващи неща);
- Чувство на възбуда или гняв;
- Повръщане;
- Мускулни спазми или слабост;
- Незадържане на урина;
- Крампи в долната част на гърба и бедрата, което може да означава менструално разстройство;
- Пристрастяване към наркотици;
- Симптоми на отнемане при лекарства.

С неизвестна честота: честотата не може да бъде оценена от наличните данни

- При жените - нередовна менструация или производство на твърде много пролактин (хормонът, който стимулира производството на мляко);
- Чувство на враждебност или агресивност;
- Необичайни мисли;
- Усукващи се или резки движения;
- Хиперактивност;
- Стомашни разстройства;
- Проблеми с функцията на черния дроб (това се вижда от кръвните изследвания), възпаление на черния дроб (хепатит);
- Дисбаланс на нервната система. Симптомите могат да включват: ускорен сърдечен ритъм и нестабилно кръвно налягане (чувство на замаяност, замаяване или припадък).
- Сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото;
- Подуване на глезените, стъпалата или пръстите;
- Кожна реакция, причинена от чувствителност към слънчева светлина;
- Затруднено уриниране или проблеми с контрола на пикочния мехур;
- Повишено налягане в очите, което може да засегне и зрението;
- Злоупотреба с лекарства.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +35928903417, уебсайт: www.bda.bg.



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Алпразолам Гриндекс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“/ EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не съхранявайте над 25 .

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Алпразолам Гриндекс

Активното вещество е алпразолам.

- Алпразолам Гриндекс 0,25 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,25 mg алпразолам.
- Алпразолам Гриндекс 0,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg алпразолам.
- Алпразолам Гриндекс 1 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1 mg алпразолам.

Другите съставки са лактоза монохидрат; целулоза, микрокристална (E460); царевично нишесте, прежелатинизирано; докусат натрий; натриев бензоат (E211); магнезиев стеарат (E572); силициев диоксид, колоиден безводен (E551), червен железен оксид (E172) (*само за таблетки от 0,5 mg*); индиго кармин лак (E132) (*само за таблетки от 1 mg*).

Как изглежда Алпразолам Гриндекс и какво съдържа опаковката

Алпразолам Гриндекс 0,25 mg таблетка е бяла или почти бяла овална (10 mm x 5 mm) таблетка, с делителна черта от едната страна и вдлъбнато релефно означение “0.25” от другата страна.

Алпразолам Гриндекс 0,5 mg таблетка е светлорозова до розова овална (10 mm x 5 mm) таблетка, с делителна черта от едната страна и вдлъбнато релефно означение “0.5” от другата страна.

Алпразолам Гриндекс 1 mg таблетка е светлосиня до синя овална (10 mm x 5 mm) таблетка, с делителна черта от едната страна и вдлъбнато релефно означение “1” от другата страна.

Алпразолам Гриндекс е наличен в OPA/Alu/PVC//Alu блистери, съдържащи 10, 20, 30, 50, 60 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител
AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия

Phone: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com



Това лекарство е разрешено за употреба в държавите — членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

Германия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Австрия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Белгия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
България	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетки
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Хърватска	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Чехия	Alprazolam Grindeks
Дания	Alprazolam Grindeks
Естония	Ixhalanex
Финландия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Франция	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Гърция	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Унгария	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletta
Ирландия	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Италия	Alprazolam Grindeks
Латвия	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablettes
Литва	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Люксембург	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Нидерландия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Полша	Alprazolam Grindeks
Португалия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Румъния	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Словакия	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Словения	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Испания	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Швеция	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

Дата на последно преразглеждане на листовката май 2024.

