

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Амоксицилин-MIP 500 mg таблетки

Амоксицилин-MIP 750 mg таблетки

Амоксицилин-MIP 1 000 mg таблетки

Амоксицилин

Съглас. № 20120720/21/22

Разрешение № 2372-7 17-10-2013

Събрание №

Amoxicillin-MIP 500 mg tablets

Amoxicillin-MIP 750 mg tablets

Amoxicillin-MIP 1 000 mg tablets

Amoxicillin

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Амоксицилин-MIP и за какво се използва
2. Преди да използвате Амоксицилин-MIP
3. Как да използвате Амоксицилин-MIP
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амоксицилин-MIP
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМОКСИЦИЛИН-MIP И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Амоксицилин е антибиотик. Той принадлежи към групата на антибиотиците наречени пеницилини. Използва се за лечение на инфекции, причинени от бактерии, които са чувствителни към Амоксицилин.

Амоксицилин-MIP се използва за лечение на:

- инфекции на ухото, гърлото, носа и синусите
- инфекции на долната част на дихателния тракт, като например бронхит и пневмония
- инфекции на пикочния мехур
- ранен стадий на Лаймска болест (при ухапване от кърлеж)
- язви на стомаха, причинени от бактерията Хеликобактер пилори (*Helicobacter pylori*)

Амоксицилин-MIP се използва за превенция срещу сърдечни инфекции по време на хирургически операции в устата или гърлото.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АМОКСИЦИЛИН-MIP

Не използвайте Амоксицилин-MIP ако:

- сте алергичен (свръхчувствителен) към амоксицилин, пеницилини, цефалоспорици или към някоя от другите съставки на това лекарство (за допълнителна информация вижте точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на Амоксицилин-MIP ако имате:

- болни бъбреци: може да се наложи Вашият лекар да промени дозата
- инфекциозна мононуклеоза (вирусна инфекция) или левкемия: може да има по-голям риск от реакции на кожата
- припадъци (епилепсия): може да има по-голям риск от пристъпи (припадъци)
- катетър в пикочния мехур; в такъв случай, пийте голямо количество течности, за да предотвратите образуването на кристали в урината

Това лекарство може също да промени резултатите от изследванията на урината или на кръвните тестове за захар. Ако имате диабет и се налагат рутинни изследвания на урината или кръвта ви, уведомете Вашия лекар. Това е необходимо, тъй като може да се наложи да се правят други изследвания.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Някои лекарства могат да предизвикат проблеми, ако ги приемате заедно с Амоксицилин-МІР.

Внимавайте при приемането на следните лекарства:

- алопуринол (за лечение на подагра): може да увеличи риска от реакции на кожата
- метотрексат (за лечение на артрит); токсичността на метотрексат може да се повиши
- дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания): може да се увеличи абсорбцията на дигоксин
- антикоагуланти (за предпазване от съсирване на кръвта) като например варфарин: може да се повиши склонността към кръвоизливи
- контрацептивни хапчета: съществува риск контрацептивните хапчета да нямат максимален ефект
- пробенецид: ако вземате пробенецид (използван за лечение на подагра) Вашият лекар може да реши да промени дозата Ви амоксицилин.

Прием на Амоксицилин-МІР с храна и напитки

Може да вземате Амоксицилин-МІР преди, по време на или след хранене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да вземате каквото и да било лекарство.

Данни от ограничен брой бременности не показват нежелани лекарствени реакции на амоксицилин върху бременността или върху здравето на плода или новороденото дете. Като превантивна мярка, амоксицилин трябва да се използва по време на бременност по преценка на лекаря, само ако потенциалните ползи превишават възможните рискове.

Амоксицилин преминава в кърмата в малки количества, поради което в някои случаи може да се наложи да се спре кърменето.

Шофиране и работа с машини

Амоксицилин не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА АМОКСИЦИЛИН-МІР


Винаги използвайте Амоксицилин-МІР точно според предписанията на Вашия лекар. Ако имате съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките може да се разтворят в питейна вода или да се поглъщат цели с достатъчно количество вода (например една чаша). Таблетките могат също така да бъдат счупени за постигане на желаната доза или за да се улесни гълтането.

Обичайната доза за възрастни и юноши (над 12 години) е 750 mg до 3 000 mg дневно разделено на два до три приема.

Обичайната доза за деца (под 12 години) е 40 до 90 mg/kg телесно тегло дневно разделено на два до три приема.

За превенция на сърдечни инфекции: За възрастни и деца над 12 години се дават 2 000 до 3 000 mg в часа преди хирургическата операция, за деца под 12 години се препоръчва доза от 50 mg/kg телесно тегло;



Вашият лекар ще определи колко време да приемате този лекарствен продукт.

Пациенти с бъбречни заболявания

Може да се наложи Вашият лекар да намали дозата.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амоксицилин-МІР

Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза, уведомете Вашия лекар или отидете веднага в болница и покажете опаковката. Най-вероятните признаци от приемане на свръхдоза са: гадене, повръщане, диария, стомашни болки.

Ако сте пропуснали да приемете Амоксицилин-МІР

Ако сте пропуснали да приемете дозата от този лекарствен продукт, направете го веднага, щом си спомните. Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приемането на Амоксицилин-МІР

Продължете приемането на това лекарство докато приключи курсът на лечение, дори ако се почувствате по-добре. Ако спрете да приемате този лекарствен продукт твърде скоро, инфекцията може да се възобнови. Също така, бактериите може да станат резистентни към това лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Амоксицилин-МІР може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции, уведомете незабавно Вашия лекар или отидете веднага в болница:

Следните сериозни нежелани реакции са редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000):

- Внезапни затруднения в дишането, говора и гълтането
- Болезнено подуване на устните, езика, лицето или шията
- Особено силно гадене или гърч
- Силно изразени кожни обриви или сърбеж, особено при наличието на мехурчета, и с възпаление на очите, устата или гениталите
- Пожълтяване на кожата или бялото на очите, или пък потъмняване на урината и изbledняване на изпражненията: това е признак за чернодробни проблеми.

Следните сериозни нежелани реакции са особено редки (засягат на по-малко от един 1 потребител на 10 000):

- Диария, която е сериозна, трае дълго време или е придружена с кръвене: това представлява знак за сериозно възпаление на червата


Други възможни нежелани реакции по време на лечението:

Следните нежелани реакции са чести (засягат 1 до 10 потребители на 100):

- гадене, повръщане, загуба на апетит, нарушаване на вкуса, често оригване, възпаление на устната лигавица (енантема), газове, диария или меки изпражнения. Тези ефекти в повечето случаи са слаби и изчезват по време на лечението или много скоро след приключването му. Те могат да бъдат намалени чрез поемане на това лекарство по време на хранене.
- уртикария, сърбеж, кожен обрив от типа "пети ден", което наподобява дребна шарка

Следните нежелани реакции са нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000):

- силни инфекции причинени от резистентни микроорганизми или дрожди (като например: орално кандидозен стоматит или вагинална кандидоза)
- умерено повишаване на чернодробните ензими



Следните нежелани реакции са редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000):

- повишаване на някои бели кръвни клетки (езинофилия), разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия)
- лекарствена треска
- световъртеж, свръхактивност, конвулсии
- повърхностно обезцветяване на зъбите, промяната в оцветяването на зъбите може да бъде отстранена чрез измиване с четка за зъби
- хепатит и холестатична жълтеница
- възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит), кристали в урината

Следните нежелани реакции са много редки (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000):

- Промени в кръвната картина (намаляване на червените или белите кръвни клетки и тромбоцитите), удължаване на времето на кръвене. Това може да причини симптоми като например треска, зачервено гърло, обрив, кръвотечение от носа или външни рани, охлузвания. Тези реакции изчезват след спиране на лечението.
- Почерняване на езика

При задълбочаване на нежеланите реакции, или ако бъдат забелязани такива, които не са посочени в настоящата листовка, моля да уведомите Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АМОКСИЦИЛИН-МІР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се използва Амоксицилин-МІР след срока на годност, отбелязан върху бутилката и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или с битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите лекарствата, които вече не са ви необходими. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Амоксицилин-МІР

Активното вещество е амоксицилин (като трихидрат).

Всяка таблетка съдържа 574 mg амоксицилин трихидрат еквивалентен на 500 mg амоксицилин.

Всяка таблетка съдържа 861 mg амоксицилин трихидрат еквивалентен на 750 mg амоксицилин.

Всяка таблетка съдържа 1 148 mg амоксицилин трихидрат еквивалентен на 1 000 mg амоксицилин.

Другите съставки са:

Микрокристална целулоза

Ниско субституирана хидроксипропилцелулоза

Захарин

Кайсиев аромат (ароматни вещества, царевичен малтодекстрин, глицерил триацетат, триетил цитрат)


Магнезиев стеарат

Силициев диоксид, колоиден, безводен

Ванилин

Как изглежда Амоксицилин МІР и съдържание на опаковката

Таблетките са бели или почти бели, продълговати (500 mg: с размер 19 x 7,6 mm, 750 mg: с размер 22,4 x 11,6 mm, 1 000 mg: с размер 24,0 x 12,0 mm) с делителна черта на едната страна.



Таблетките може да бъдат разделени на две равни части.

Таблетките са опаковани в блистери от PVC/алуминий.

Амоксицилин-MIP 500 mg се предлага в опаковки от 8 и 24 таблетки.

Амоксицилин-MIP 750 mg се предлага в опаковки от 8 и 16 таблетки.

Амоксицилин-MIP 1 000 mg се предлага в опаковки от 8 и 16 таблетки.

Не всички опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешителното за употреба

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Straße 41

66440 Blieskastel

Германия

Производител

Chephasaar

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Mühlstraße 50

66386 St. Ingbert

Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия:	Amoxicillin MIP 500 mg Tabletten Amoxicillin MIP 750 mg Tabletten Amoxicillin MIP 1000 mg Tabletten
България:	Амоксицилин-MIP 500 mg Амоксицилин-MIP 750 mg Амоксицилин-MIP 1000 mg
Дания:	Amoxicillin "MIP"
Естония:	Amoxicillin-MIP 500 mg Amoxicillin-MIP 750 mg Amoxicillin-MIP 1000 mg
Финландия:	Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 750 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg
Латвия:	Amoxicillin MIP 500 mg Amoxicillin MIP 750 mg Amoxicillin MIP 1000 mg
Литва:	Amoxicillin MIP 500 mg tabletės Amoxicillin MIP 750 mg tabletės Amoxicillin MIP 1000 mg tabletės
Норвегия:	Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 750 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg
Полша:	Amoxicillin MIP Pharma
Румъния:	Amoxicilină MIP Pharma 500 mg comprimate Amoxicilină MIP Pharma 750 mg comprimate Amoxicilină MIP Pharma 1000 mg comprimate
Швеция:	Amoxicillin MIP

Дата на последно одобрение на листовката
04/2013

