

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml перорален разтвор
Ambroxol hydrochloride Fontane 30 mg/5 ml oral solution

Активно вещество: Амброксолов хидрохлорид (*ambroxol hydrochloride*)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml
3. Как да приемате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



1. **Какво представлява Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml и за какво се използва**

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml съдържа активното вещество амброксолов хидрохлорид и принадлежи към терапевтичната група на лекарствените продукти за кашлица и простуда, муколитици. Амброксолов хидрохлорид се използва за лечение на влажна кашлица при заболявания на белия дроб и бронхите.

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml втечнява бронхиалния секрет (мукус) и позволява по-лесното му отделяне чрез кашлица.

Трябва да се посъветвате с лекар, ако след 4-5 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши.

2. **Какво трябва да знаете преди да приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml**

Не приемайте Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

ако сте алергични към амброксолов хидрохлорид или към някоя от другите съставки на това лекарство (описани в т. 6).

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml не трябва да се използва при деца под две години.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

- ако сте имали много тежки кожни реакции на свръхчувствителност (синдром на Джонсън, синдром на Лайел);

• Синдром на Стивънс-Джонсън е заболяване с висока температура и обрив по кожата и лигавиците с образуване на мехури.



• **Синдром на Лайел** е животозастрашаващо състояние, известно още като синдром на попарената кожа. Симптоми са появата на големи мехури, подобно на изгаряне.

Ето защо, ако забележите промени по кожата и лигавиците, трябва веднага да спрете приема на Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml. Посетете незабавно лекар!

- Ако страдате от нарушена бъбречна функция или от тежко чернодробно заболяване. В този случай Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml може да се прилага само с особено внимание (напр. през по-дълги интервали или в намалена доза – консултирайте се с Вашия лекар за това). При тежко нарушена бъбречна функция може да настъпи натрупване на разпадни продукти на активното вещество на Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml.

- Ако страдате от рядко заболяване на бронхите с повишено образуване на мукус (напр. първична цилиарна дискинезия). Тогава мукусът не може да бъде отделен от белия дроб. В този случай Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml може да се прилага само под лекарско наблюдение.

- Ако сте имали пептична язвена болест, трябва да се посъветвате с Вашия лекар как да приемате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml, защото муколитичите могат да раздразнят стомашната лигавица. Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml.

Други лекарства и Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате или наскоро сте приемали/използвали някакви други лекарства.

Лекарства, подтискащи кашлицата (антитусиви)

По време на приема на Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml не трябва да приемате лекарства, които подтискат кашличния рефлекс (т. нар. антитусиви). Кашличният рефлекс е важен, за да може втечненият бронхиален секрет (мукус) да се откашля и по този начин да се отдели от белите дробове.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, или мислите, че може да сте бременна или планувате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

По време на бременност или кърмене може да приемате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml само според точните указания на Вашия лекар!

До момента няма достатъчно опит при хора по време на бременност и кърмене. При животни обаче е наблюдавано, че активното вещество на Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml преминава в майчиното мляко.

Проучвания при животни не показват вредни ефекти на амброксол върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Няма доказателства за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

Не са провеждани проучвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml съдържа сорбитол

Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че страдате от непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди употребата на този лекарствен продукт.

Всяка мерителна лъжичка с 5 ml перорален разтвор съдържа сорбитол 1,75 g (= 0,15 хлебни единици).

Сорбитол може да има лек разхлабващ ефект.

3. Как да приемате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

Винаги приемайте този лекарствен продукт точно според указанията в тази листовка, както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Освен ако лекар не Ви е предписал друго, трябва да се имат предвид следните указания за Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml. Моля, спазвайте указанията за приложение, защото в противен случай Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml няма да окаже очаквания ефект!

Препоръчителната доза е:

Деца между 2-5 години

¼ мерителна лъжичка с 1,25 ml перорален разтвор 3 пъти дневно (еквивалентно на 3 пъти 7,5 mg амброксолов хидрохлорид = 22,5 mg амброксолов хидрохлорид/ден).

Деца между 6-12 години

½ мерителна лъжичка с 2,5 ml перорален разтвор 2-3 пъти дневно (еквивалентно на 2-3 пъти 15 mg амброксолов хидрохлорид = 30-45 mg амброксолов хидрохлорид/ден).

Юноши над 12 години и възрастни

През първите 2-3 дни по една мерителни лъжички с по 5 ml 3 пъти дневно (еквивалентно на 3 пъти амброксолов хидрохлорид = 90 mg амброксолов хидрохлорид/ден), след това по една мерителна лъжичка с по 5 ml перорален разтвор 2 пъти дневно (еквивалентно на 2 пъти по 30 mg амброксолов хидрохлорид = 60 mg амброксолов хидрохлорид/ден).

Забележка:

Дневната доза може да бъде увеличена до 2 мерителни лъжички, всяка с по 5 ml перорален разтвор, 2 пъти дневно, за да се постигне по-добър ефект.

(еквивалентно на 2 пъти 60 mg амброксолов хидрохлорид = 120 mg амброксолов хидрохлорид/ден)

Начин на приложение

За перорално приложение. Приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml след хранене с помощта на мерителната лъжичка.

Продължителност на приложение

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml не трябва да се прилага повече от 4-5 дни без консултация с лекар.

Ако оплакванията Ви не се повлияват след 4-5 дневно лечение или дори се влошават, посетете веднага лекар!

Моля, споделете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате чувството, че ефектът на Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml е твърде силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

До момента не са наблюдавани сериозни симптоми на интоксикация. Възможни са временно безпокойство, диария.

При много голямо предозиране може да се появи повишено слюноотделяне, гадене, повръщане и спадане на кръвното налягане с нарушения на кръвообращението.

Консултирайте се с Вашия лекар. Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка обикновено не са необходими, освен при много голямо предозиране. Препоръчва се лечение в зависимост от проявените белези на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

или сте приели много малка доза, вземете лекарството в предписаната доза на следващия прием. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате допълнителни въпроси за приложението на този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, този лекарствен продукт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежелани реакции

Чести (може да засегнат до 1 на 10 лица):

- гадене
- промяна във вкуса
- изтръпване на устата и гърлото (хипоестезия)

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 лица):

- повръщане
- сухота в устата
- диария
- проблеми с храносмилането (диспепсия)
- коремна болка
- висока температура

Редки (може да засегнат до 1 на 1000 лица):

- обрив
- копривен обрив (уртикария)

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 лица):

- тежки кожни реакции като синдром на Лайел или синдром на Стивънс-Джонсън (вижте т. 2 “

Предупреждения и предпазни мерки”)

С неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)

- тежки алергични (анафилактични) реакции до шок
- подуване на лицето (ангиоедем)
- сърбеж и друга свръхчувствителност
- сухота в гърлото

Ако забележите, че имате нежелани реакции, включително и такива, неописани в тази листовка, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената кутия след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Срок на годност след първо отваряне

Стабилност след отваряне на бутилка: 6 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml

Активното вещество е амброксолов хидрохлорид. 1 ml перорален разтвор съдържа амброксолов хидрохлорид.

Всяка мерителна лъжичка с 5 ml перорален разтвор съдържа 30 mg амброксолов хидрохлорид.



Другите съставки са:

Сорбитол (Е 420), течен (некристализиращ), бензоена киселина, глицерол 85 процентен, хидроксиметилцелулоза, аромат малина, пречистена вода.

Как изглежда Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml и какво съдържа опаковката

Бистър, безцветен до бледо жълт разтвор.

Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml е в опаковка със 100 ml перорален разтвор.

В опаковката е приложена мерителна лъжичка. Мерителната лъжичка е от полипропилен и има мерителни линии от 1,25 ml, 2,5 ml и 5 ml (ръбът на лъжичката).

Притежател на разрешението за употреба

Fontane Pharma GmbH

Stölperchenweg 37

14109 Berlin

Германия

Производител

Berlin - Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin, Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИИ със следните имена

<i>Bulgaria</i>	<i>Амброксолов хидрохлорид Фонтейн 30 mg/5 ml</i>
<i>Czech Republic</i>	<i>Ambroxol Fontane 30 mg/5 ml</i>
<i>Estonia</i>	<i>Ambroxol Fontane</i>
<i>Finland</i>	<i>Ambroxol Fontane 6 mg/ml</i>
<i>Germany</i>	<i>Ambroxolhydrochlorid Fontane 30 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen</i>
<i>Hungary</i>	<i>Ambroxol-hidroklorid Fontane 30 mg/5 ml</i>
<i>Latvia</i>	<i>Ambroxol Fontane 30 mg/5 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai</i>
<i>Lithuania</i>	<i>Ambroxol Fontane 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas</i>
<i>Poland</i>	<i>Ambroxoli hydrochloridum Fontane</i>
<i>Romania</i>	<i>Ambroxol Fontane 30 mg/5 ml solutie orala</i>
<i>Slovak Republic</i>	<i>Ambroxollumchlorid Fontane 30 mg/5 ml</i>
<i>Slovenia</i>	<i>Ambroksoljev klorid Fontane Pharma 6 mg/ml peroralna raztopina</i>

Дата на последно одобрение на листовката

Юли, 2012 г.

