

Листовка: информация за пациента № 20120108

Алвотирацетам 250 mg филмирани таблетки № 2827  
Alvotiracetam 250 mg film-coated tablets

26-01-2015

Леветирацетам/Levetiracetam

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Алвотирацетам и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Алвотирацетам
3. Как да приемате Алвотирацетам
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алвотирацетам
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Алвотирацетам и за какво се използва

Алвотирацетам 250 mg филмирани таблетки е антиепилептично лекарство (лекарство за лечение на пристъпите при епилепсия).

##### Алвотирацетам се използва

- Самостоятелно при възрастни и юноши на 16 и повече години с новодиагностицирана епилепсия за лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация.
- Като допълнение към други антиепилептични лекарства за лечение на:
  - парциални пристъпи с или без генерализация при възрастни, юноши, деца и кърмачета на един и повече месеца;
  - миоклонични пристъпи при възрастни и юноши на 12 и повече години с ювенилна миоклонична епилепсия;
  - първично генерализирани тонично-клонични пристъпи при възрастни и юноши на 12 и повече години с идиопатична генерализирана епилепсия.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Алвотирацетам

##### **Не приемайте Алвотирацетам**

- Ако сте алергични към леветирацетам или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

##### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар преди да приемете Алвотирацетам.

- Ако имате бъбречни проблеми, следвайте лекарските указания. Вашият лекар може да прецени дали Вашата дозировка трябва да се коригира.
- Ако забележите някакво забавяне на растежа или неочаквано развитие на пубертета на Вашето дете, моля информирайте Вашия лекар.



- Ако забележите повишаване на тежестта на пристъпите (например нарастване на броя им), моля информирайте Вашия лекар.
- Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като Алвотирацетам са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако имате симптоми на депресия и/или мисли за самоубийство, моля обърнете се към Вашия лекар.

#### **Други лекарства и Алвотирацетам**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

#### **Алвотирацетам с храна, напитки и алкохол**

Вие може да приемате Алвотирацетам с или без храна. Като предпазна мярка, не приемайте Алвотирацетам с алкохол.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна моля информирайте Вашия лекар.

Алвотирацетам не трябва да се използва по време на бременност освен в случай на категорична необходимост. Не може да се изключи напълно риска от вродени дефекти на Вашето неродено дете.

Проучванията с Алвотирацетам при животни показват нежелани ефекти върху способността за размножаване, но след приложение на дози, значително по-високи от тези, от които се нуждаете, за да контролирате пристъпите си.

Не се препоръчва кърмене по време на лечението.

#### **Шофиране и работа с машини**

Алвотирацетам може да навреди на способността за шофиране и работа с машини, тъй като Алвотирацетам може да предизвика сънливост. Това е по-вероятно в началото на лечението или след увеличаване на дозата. Не използвайте каквато и да е техника или машини докато не се установи, че способността Ви да изпълнявате тези дейности не е засегната.

### **3. Как да приемате Алвотирацетам**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Алвотирацетам трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, по едно и също време всеки ден.

Приемайте предписания брой таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар.

#### **Монотерапия**

*Дозировка при възрастни и юноши (16 години и повече)*

#### **Обичайна доза**

- Между 1 000 mg (4 таблетки) и 3 000 mg (12 таблетки) всеки ден.

Когато първоначално започнете да приемате Алвотирацетам, Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза в продължение на 2 седмици, преди да Ви даде най-ниската обичайна доза.

#### **Например**



- Ако дневната Ви доза е 1 000 mg, Вие трябва да приемате 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер.

#### Допълващо лечение

*Дозировка при възрастни и юноши (12-17 години) с тегло 50 kg или повече*

#### Обичайна доза

- Между 1 000 mg (4 таблетки) и 3 000 mg (12 таблетки) всеки ден.

#### Например

- Ако дневната Ви доза 1 000 mg, Вие трябва да приемате 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер.

*Дозировка при кърмачета (6-23 месеца), деца (2-11 години) и юноши (12-17 години) с тегло под 50 kg*

Алвотирацетам 250 mg филмирани таблетки не са подходящи за приложение при кърмачета и деца на възраст под 6 години.

#### Обичайна доза

- Между 20 mg/kg телесно тегло и 60 mg/kg телесно тегло всеки ден.

#### Например

- Ако обичайната доза е 20 mg/kg телесно тегло всеки ден, трябва да дадете на Вашето дете, тежащо 25 kg, 1 таблетка сутрин и 1 таблетка вечер.

*Дозировка при кърмачета (1 месец до под 6 месеца)*

Алвотирацетам 250 mg филмирани таблетки не са подходящи за приложение при кърмачета на възраст 1 до 6 месеца.

#### Начин на приложение

Поглъщайте таблетките Алвотирацетам с достатъчно количество течност (например чаша вода).

#### Продължителност на лечението

- Алвотирацетам се прилага за хронично лечение. Вие трябва да приемате Алвотирацетам толкова продължително, колкото Ви е посъветвал Вашият лекар.
- Не спирайте лечението с Алвотирацетам без съвет от Вашия лекар, тъй като това може да увеличи пристъпите Ви. Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с Алвотирацетам, той ще Ви обясни как постепенно да намалите приеманата доза Алвотирацетам.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Алвотирацетам**

Възможните нежелани лекарствени реакции при предозиране на Алвотирацетам са сънливост, тревожност, агресия, намалено внимание, потискане на дишането и кома.

Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки. Вашият лекар ще предприеме най-добрите възможни мерки при предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Алвотирацетам**

Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали една или повече дози.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

#### **Ако сте спрели приема на Алвотирацетам**

При спиране на лечението, както и при другите антиепилептични лекарства, Алвотирацетам трябва да се прекъсва постепенно с цел избягване увеличаване на пристъпите.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои от нежеланите лекарствени реакции като сънливост, умора и замаяност може да се срещат по-често в началото на лечението или при увеличаване на дозата. Тези реакции се очаква да намаляват с времето.

##### **Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)**

- Назофарингит.
- Сомнолентност (сънливост), главоболие.

##### **Чести (могат да засегнат 1 до 10 на 100 пациенти)**

- Анорексия (загуба на апетит).
- Депресия, враждебност или агресивност, тревожност, безсъние, нервност или раздразнителност.
- Конвулсия, нарушение в равновесието (загуба на равновесие), замаяване (чувство на нестабилност), летаргия, тремор (неволно треперене).
- Вертиго (чувство на световъртеж).
- Кашлица.
- Болки в корема, диария, диспепсия (смущение в храносмилането), повръщане, гадене.
- Обрив.
- Астения/умора (изтощение).

##### **Нечести (могат да засегнат 1 до 10 на 1 000 пациенти)**

- Намален брой кръвни плочици, намален брой бели кръвни клетки.
- Намаляване на телото, повишаване на телото.
- Опит за самоубийство и мисли за самоубийство, психични разстройства, необичайно поведение, халюцинации, гняв, объркване, паническа атака, емоционална нестабилност/промени в настроението, безпокойство.
- Амнезия (загуба на памет), нарушения на паметта (забравяне), нарушена координация/атаксия (липса на координация на движенията), парестезия (изтръпване), нарушение на вниманието (загуба на концентрация).
- Диплопия (двойно виждане), замъглено зрение.
- Отклонение от нормалните стойности на резултатите от изследване на черния дроб.
- Косопад, екзема, пруритус.
- Мускулна слабост, миалгия (болка в мускулите).
- Нараняване.

##### **Редки (могат да засегнат 1 до 10 на 10 000 пациенти)**

- Инфекция.
- Намален брой на всички видове кръвни клетки.
- Тежки реакции на свръхчувствителност (DRESS);
- Намаление на концентрацията на натрий в кръвта;
- Самоубийство, личностни нарушения (поведенчески проблеми), промяна в мисленето (забавено мислене, невъзможност за концентрация).
- Неконтролирани мускулни спазми засягащи главата, тялото и крайниците, трудност при контролиране на движенията, хиперкинезия (повишена активност).
- Панкреатит.
- Чернодробна недостатъчност, хепатит.
- Кожен обрив, който може да бъде под формата на мехури и да изглежда като малки „мишени“ (тъмни петна в центъра, заобиколени от по-бледи зони, с тъмен пръстен около



ръба) (*еритема мултиформе*), широко разпространен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън) и по-тежка форма, причиняваща лющене на кожата в повече от 30 % от повърхността на тялото (*токсична епидермална некролиза*).

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Алвотирацетам**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистера след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Алвотирацетам**

- Активното вещество е леветирацетам.  
Всяка таблетка съдържа 250 mg леветирацетам (levetiracetam).
- Другите съставки са:  
Ядро на таблетката  
Царевично нишесте, Повидон, Кроскармелоза натрий, Колоидален силициев диоксид, Магнезиев стеарат  
Филмово покритие  
Хипромелоза бсР, Титанов диоксид (E171), Макрогол 400, Индиго кармин алуминиев лак (E132)

##### **Как изглежда Алвотирацетам и какво съдържа опаковката**

Филмираните таблетки са светлосини, продълговати, двойно изпъкнали, гладки от двете страни.

Алвотирацетам филмирани таблетки са опаковани в блистери и поставени в картонени кутии. Картонените кутии съдържат 30 филмирани таблетки.

##### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

##### Притежател на разрешението за употреба:

Alvogen IP Co S.à.r.l

5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg



Люксембург

Производители:

Pharma Pack Hungary Kft.  
Vasút utca 13., Budaörs, 2040,  
Унгария

S.C. Labormed-Pharma S.A.,  
44B, Theodor Pallady,  
3<sup>rd</sup> district, Bucharest, Румъния

**Дата на последно преразглеждане на листовката: {ММ /ГГГГ}**

