

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2

Идентификационен номер № 20120452

Разрешение № 36916 / 07-02-2017

Бикалутамид Каби 150 mg филмирани таблетки
Bicalutamide Kabi 150 mg film-coated tablets

Листовка: информация за потребителя

Бикалутамид Каби 150 mg филмирани таблетки
Bicalutamide Kabi 150 mg film-coated tablets

Бикалутамид (Bicalutamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Бикалутамид Каби 150 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Бикалутамид Каби 150 mg
3. Как да приемате Бикалутамид Каби 150 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бикалутамид Каби 150 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бикалутамид Каби 150 mg и за какво се използва

Бикалутамид Каби 150 mg филмирани таблетки (наричан Бикалутамид 150 mg в цялата листовка) съдържа лекарство, наречено бикалутамид. То принадлежи към група лекарства, наречени „антиандрогени“. Антиандрогените противодействат на ефектите на андрогените (мъжки полови хормони).

- Той се използва за лечение на рак на простатата.
- Той действа, като блокира ефектите на мъжките хормони като тестостерон.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Бикалутамид Каби 150 mg

Не приемайте Бикалутамид Каби 150 mg:

- ако сте алергични към бикалутамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако вече приемате лекарство, наречено цизаприд или някои антихистаминови лекарства (терфенадин или астемизол).
- ако сте жена.

Не приемайте Бикалутамид 150 mg, ако нещо от горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Бикалутамид 150 mg.

Бикалутамид Каби 150 mg не трябва да се дава на деца.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Бикалутамид 150 mg:

- ако имате проблеми с черния си дроб. Вашият лекар може да направи кръвни изследвания преди и по време на лечението Ви с бикалутамид 150 mg.
- ако имате нещо от следните: някакви състояния от страна на сърцето или кръвоносните съдове, включително проблеми със сърдечния ритъм (аритмия), или се лекувате с лекарства за тези състояния. Рискът от проблеми със сърдечния ритъм може да се повиши, когато се използва Бикалутамид 150 mg.

Ако влезете в болница, кажете на медицинския персонал, че приемате Бикалутамид 150 mg.

Други лекарства и Бикалутамид Каби 150 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, които си купувате без рецепта, и билкови лекарства.

Бикалутамид може да повлияе някои лекарства, използвани за лечение на проблеми със сърдечния ритъм (напр. хинидин, прокаинамид, амиодарон и соталол) или може да повиши риска от проблеми със сърдечния ритъм, когато се използва с някои други лекарства (напр. метадон (използван за облекчаване на болка и като част от детоксикация при лекарствена зависимост), моксифлоксацин (антибиотик), антипсихотици, използвани при сериозни психически заболявания).

Кажете също на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някои от следните лекарства:

- Лекарства, приемани през устата, за предотвратяване на кръвосъсирването (перорални антикоагуланти). Вашият лекар може да направи кръвни изследвания преди и по време на лечението Ви с бикалутамид.
- Циклоспорин (за потискане на имунната система).
- Калциеви антагонисти (за лечение на повишено кръвно налягане или някои сърдечни състояния).
- Циметидин (при стомашни проблеми).
- Кетоконазол (за лечение на инфекции, причинени от гъбички).

Бременност и кърмене

- Бикалутамид Каби 150 mg не трябва да се прилага на жени.

Шофиране и работа с машини

- Малко е вероятно бикалутамид да повлияе способността Ви за шофиране или работа с инструменти или машини. Понякога обаче някои хора може да се чувстват сънливи, докато приемат бикалутамид. Ако това се случи с Вас, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Слънчева или ултравиолетова (UV) светлина

Избягвайте директно излагане на силна слънчева или UV светлина, докато приемате бикалутамид.

Бикалутамид Каби 150 mg съдържа лактоза

Бикалутамид Каби 150 mg съдържа лактоза, която е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост или не можете да храносмилате някои захари,



(имате непоносимост към някои захари), посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3. Как да приемате Бикалутамид Каби 150 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Препоръчителната доза за възрастни е една таблетка всеки ден.
- Преглътнете таблетката цяла с вода.
- Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден.
- Не спирайте приема на това лекарство, дори ако се чувствате добре, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бикалутамид Каби 150 mg

Ако сте приели повече от необходимата доза бикалутамид, говорете с лекар или идете веднага в болница.

Ако сте пропуснали да приемете Бикалутамид Каби 150 mg

Ако сте забравили да приемете една доза, пропуснете забравената доза и вземете следващата както обикновено.

- Не вземайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата доза

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои от тези реакции може да са сериозни и да изискат медицинска помощ.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

Алергични реакции:

- Симптомите може да включват внезапна поява на:
 - Обрив, сърбеж на кожата или уртикария.
 - Подуване на лицето, устните, езика, гърлото или други части на тялото.
 - Недостиг на въздух, хрипове или затруднения в дишането.

Ако това се случи при Вас, спрете да приемате това лекарство и веднага потърсете лекар.

Кажете също веднага на Вашия лекар, ако забележите нещо от следните:

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

- Пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница). Това може да бъде признак на чернодробни проблеми или в редки случаи (засягат по-малко от 1 на 1 000 души) чернодробна недостатъчност.
- Болка в корема.
- Кръв в урината.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души



Сериозен недостиг на въздух или недостиг на въздух, който внезапно се влошава. Той може да се съпровожда от кашлица или висока температура (треска). Това може да бъде признак на възпаление на белите дробове, наречено „интерстициална белодробна болест“.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
Промени в ЕКГ (QT удължаване).

Други възможни нежелани реакции:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

- Кожен обрив.
- Подуване и болезненост на гърдите.
- Чувство на слабост.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

- Топли вълни.
- Позиви за повръщане (гадене).
- Сърбеж.
- Сухота на кожата.
- Невъзможност за получаване на ерекция (еректилна дисфункция).
- Наддаване на тегло.
- Намалено сексуално желание и намалена плодовитост.
- Опадане на косата.
- Повторно покарване на коса или прекомерно окосмяване.
- Ниски нива на червените кръвни клетки (анемия). Това може да бъде причина да се чувствате уморени или да изглеждате бледи.
- Загуба на апетит.
- Депресия.
- Сънливост.
- Нарушено храносмилане.
- Замаяност.
- Запек.
- Отделяне на газове (флатуленция).
- Болка в гърдния кош.
- Подуване.

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

- Повишена кожна чувствителност към слънчева светлина.

Вашият лекар може да направи изследвания на кръвта, за да провери дали са настъпили някакви промени в кръвта Ви.

Не се притеснявайте от този списък с нежелани реакции. Може да не получите нито една от тях.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (посочена по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата



ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Бикалутамид Каби 150 mg

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите никакви видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Бикалутамид Каби 150 mg филмирани таблетки

- Активното вещество е бикалутамид. Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg бикалутамид.
- Другите съставки са:
Сърцевина на таблетката: лактоза монохидрат, натриев нишестен гликолат (тип А), силициев диоксид, колоиден безводен, повидон К30, магнезиев стеарат.

Филмово покритие: Opadry Y-1-7000 бял, съставен от: хипромелоза 5 CP (E464), макрогол 400 и титанов диоксид (E171).

Как изглежда Бикалутамид Каби 150 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката

Бикалутамид Каби 150 mg се предлага като бели до почти бели, кръгли, двойно изпъкнали филмирани таблетки, с гравирани надпис “DB04” от едната страна и гладки от другата страна.

Блистерни ленти, състоящи се от 10 и 14 таблетки, в опаковки от по 28, 30, 50, 60, 90, 98 и 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Fresenius Kabi Oncology Plc.
Lion Court, Farnham Road



Bordon, Hampshire, GU35 0NF
Обединеното кралство

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия	Bicalutamid Kabi 150mg Filmtabletten
България	Bicalutamide Kabi 150 mg film-coated tablets
Унгария	Bicalutamid Kabi 150 mg filmtabletta
Ирландия	Bicalutamide 150 mg film-coated tablets
Полша	Bicalutamid Kabi
Португалия	Bicalutamida Kabi
Словения	Bikalutamid Kabi 150 mg filmsko obložene tablete
Обединеното кралство	Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Дата на последно преразглеждане на листовката

Юни 2016 г.

